




ACETABIOFEN 500mg

Acetaminfen / Paracetamol



BIO-PROSPECTO

ACETABIOFEN

Composición:

Paracetamol (Acetaminofén)..... 500mg

Excipientes..... C.S.

.

Mecanismo de acción:

Se desconoce el mecanismo exacto de la acción del paracetamol aunque se sabe que actúa a nivel central. El ACETABIOFEN también parece inhibir la síntesis y/o los efectos de varios mediadores químicos que sensibilizan los receptores del dolor a los estímulos mecánicos o químicos. Los efectos antihipertróficos Del ACETABIOFEN tienen lugar bloqueando el pirógeno endógeno en el centro hipotalámico regulador de la temperatura inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas. El calor es disipado por vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo periférico y sudoración.

Indicaciones:

ACETABIOFEN es un analgésico y antipirético eficaz para el control del dolor leve o moderado causado por:

- Afecciones articulares.
- Otagias
- Cefaleas
- Dolor odontogénico
- Neuralgias
- Procedimientos quirúrgicos menores etc.

También es eficaz para el tratamiento de la fiebre, como la originada por infecciones virales, la fiebre post-vacunación, entre otras.

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad.
- Debido a que se metaboliza en el hígado, se debe administrar con precaución en pacientes con daño hepático, al igual que en aquellos que están recibiendo medicamentos hepatotóxicos o que tienen nefropatía.
- ACETABIOFEN tampoco se debe administrar por periodos prolongados ni en mujeres embarazadas.
- La ingestión de 3 o más bebidas alcohólicas por periodos prolongados, puede aumentar el riesgo de daño hepático o sangrado del tubo digestivo asociado al uso de ACETABIOFEN, por lo que se deben considerar estas condiciones al prescribir el medicamento.

Embarazo y lactancia: Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento

El paracetamol (acetaminofén) pasa a la leche materna, por lo que las mujeres en período de lactancia deben consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas: La influencia del paracetamol-acetaminofén sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

ACETABIOFEN y alcohol: La utilización de paracetamol en pacientes que consumen habitualmente alcohol (3 o más bebidas alcohólicas cerveza, vino, licor, al día) puede provocar daño en el hígado.

La toma de este medicamento con alimentos no afecta a la eficacia del mismo.

Dosis:

La dosis recomendada es:

Adultos y adolescentes mayores de 15 años:

Tomar 1 comprimido (500 mg de ACETABIOFEN) cada 4-6 horas, según necesidad.

En caso necesario se puede tomar 1 gramo (2 comprimidos) cada 8 horas, 3 veces al día.

No tomar más de 3 g de paracetamol en 24 horas (6 comprimidos).

Se debe evitar el uso de dosis diarias altas de paracetamol durante periodos prolongados de tiempo ya que se incrementa el riesgo de sufrir efectos adversos tales como daño en el hígado.

Pacientes con enfermedades del hígado: antes de tomar este medicamento tienen que consultar a su médico.

Deben tomar la cantidad de medicamento prescrita por su médico con un intervalo mínimo entre cada toma de 8h.

No deben tomar más de 2 gramos de paracetamol en 24 horas, repartidos en varias tomas.

Pacientes con enfermedades del riñón: antes de tomar este medicamento tienen que consultar a su médico.

Tomar como máximo 500 miligramos por toma.

Según su enfermedad su médico le indicará si debe tomar su medicamento con un intervalo mínimo de 6 u 8 horas.

No deben tomar más de 2 gramos en 24 horas repartidos en varias tomas, no sobrepasando en ningún caso los 500 miligramos por toma.

Efectos adversos:

Al igual que todos los medicamentos, ACETABIOFEN puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos adversos raros que pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas son:

- Malestar.
- Hipotensión.
- Aumento de los niveles de transaminasas en sangre.

Efectos adversos muy raros que pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas son:

- Enfermedades del riñón: orina turbia.
- Dermatitis alérgica: (erupción cutánea).
- Ictericia (coloración amarillenta de la piel).
- Alteraciones sanguíneas (agranulocitosis, leucopenia, neutropenia, anemia hemolítica).
- Hipoglucemia (bajada de azúcar en sangre).

Se han notificado muy raramente casos de reacciones graves en la piel.

El ACETABIOFEN puede dañar el hígado cuando se toma en dosis altas o en tratamientos prolongados.

Interacciones medicamentosas:

- ACETABIOFEN puede disminuir la depuración del busulfán.
- La carbamazepina puede aumentar el efecto hepatotóxico de las sobredosis de ACETABIOFEN, pero a dosis habituales esta interacción carece de importancia clínica.
- La administración de ACETABIOFEN y cloranfenicol puede alterar los niveles de este último, por lo que se debe vigilar su dosis.
- La colestiramina reduce la absorción del ACETABIOFEN, por lo que cuando ambos medicamentos se administran de manera simultánea, es necesario, administrar ACETABIOFEN una hora antes o 3 horas después de la colestiramina.
- El diflunisal eleva de manera significativa las concentraciones plasmáticas de ACETABIOFEN, por lo que se debe tener precaución al usar ambos agentes, en especial, en pacientes predispuestos a daño hepático
- Existen reportes aislados de hepatotoxicidad en pacientes que tomaron isoniacida con ACETABIOFEN, por lo que se recomienda restringir el uso de ambos agentes.
- Los pacientes en tratamiento con warfarina no deben ingerir más de 2 g de ACETABIOFEN al día durante unos pocos días, en caso de que no puedan usar otro agente de la misma clase terapéutica.
- Se debe evitar el uso simultáneo de zidovudina y ACETABIOFEN por el riesgo de neutropenia o hepatotoxicidad.

Conservación:

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica

Importado y Distribuido por:

Casa de representaciones BioVenezuela c.a.

Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630

Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio

Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.

www.BioVenezuela.net

**Importado bajo el
No. de Permiso sanitario de Importación 00002809**

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

