



BIOALERCET 10mg

Cetirizina Clorhidrato



BIO-PROSPECTO

COMPOSICIÓN:

Cada tableta recubierta contiene:
Cetirizina Clorhidrato BP..... 50mg
Excipientes C.S..

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

MECANISMO DE ACCIÓN::

Antagonista H1 selectivo. Inhibe la fase inicial de la reacción alérgica, y reduce la migración de células inflamatorias y la liberación de mediadores asociados a respuesta tardía.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Alivia síntomas nasales y oculares de rinitis alérgica estacional y perenne, y síntomas de urticaria crónica idiopática, en adultos y niños > 6 años..

ANTES DE EMPEZAR A TOMAR BIOALERCET

NO TOME BIOALERCET

-Si tiene una enfermedad renal grave (insuficiencia renal grave con aclaramiento de creatinina por debajo de 10 ml/min).
-Si es alérgico a Cetirizina clorhidrato o alguno de los demás componentes de este medicamento.

-Hipersensibilidad a Cetirizina, Hidroxizina u otro derivado de Piperazina.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Consulte con su médico antes de empezar a tomar BIOALERCET. Si es un paciente con insuficiencia renal, consulte a su médico; si es necesario, tomará una dosis más baja. Su médico determinará la nueva dosis.

-Si tiene problemas para orinar (como problemas de médula espinal o de próstata o vejiga), consulte a su médico.

-Si es un paciente epiléptico o un paciente con riesgo de convulsiones, consulte a su médico. No se han observado interacciones clínicamente significativas entre el alcohol (con un nivel en sangre de 0,5 por mil (g/l), correspondiente a un vaso de vino) y el uso de BIOALERCET a la dosis recomendada. Sin embargo, no hay disponibles datos de seguridad cuando se toman juntas dosis mayores de BIOALERCET y alcohol. Por lo tanto, como en el caso de todos los antihistamínicos, se recomienda evitar tomar BIOALERCET con alcohol.

Si tiene previsto que le realicen una prueba de alergia, consulte a su médico si debe interrumpir la toma de BIOALERCET unos días antes de la misma. Este medicamento puede afectar los resultados de sus pruebas de alergia.

Niños: No administre este medicamento a niños menores de 6 años, ya que esta formulación no permite el ajuste necesario de la dosis.

Otros medicamentos y BIOALERCET

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente, o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

BIOALERCET CON ALIMENTOS:

La comida no afecta a la absorción de BIOALERCET.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Bioalercet se excreta por la leche materna.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los siguientes efectos adversos son raros o muy raros, pero debe interrumpir la toma del medicamento y comentárselo inmediatamente a su médico si nota alguno de ellos:

-Reacciones alérgicas, incluyendo reacciones graves y angioedema (reacción alérgica grave que produce hinchazón de la cara o garganta). Estas reacciones pueden comenzar pronto después de tomar por primera vez el medicamento, o pueden comenzar más tarde.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes). Somnolencia (adormecimiento), Mareo, dolor de cabeza, Faringitis, rinitis (en niños), Diarrea, náusea, sequedad de boca, Fatiga.

SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Se recomienda llevar el prospecto y el envase al profesional sanitario.

No utilice BIOALERCET después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de EXP. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese a una temperatura ambiente inferior a 30o Centígrados.

No use BIOALERCET si observa signo visible de deterioro. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica

PRESENTACIÓN:

BIOALERCET 10mg. Tabletas recubiertas empacadas en 10 blister de 10 tabletas cada blister.

Importado y Distribuido por:

Casa de representaciones BioVenezuela c.a.

Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630

Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio

Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.

www.BioVenezuela.net

Importado bajo el No. de Permiso sanitario de Importación 00002444

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

