



BIOLTAREN Gel



BIO-PROSPECTO

BIOLTAREN Gel

Composición:

Diclofenac dietilamina
Equivalente a Diclofenac sódico..... 1%
Excipientes..... C.S

Indicaciones:

Este medicamento se utiliza en adultos y adolescentes mayores de 14 años para el alivio local del dolor y de las inflamaciones leves y ocasionales y pequeñas contusiones, golpes, distensiones, tortícolis u otras contracturas, lumbalgias y esguinces leves (torcedura)

Contraindicaciones:

evite el uso de BIOLTAREN:

- Si es alérgico a diclofenaco o a alguno de los demás componentes de este medicamento.
- Si ha sufrido reacciones alérgicas después de tomar medicamentos que contienen ácido acetilsalicílico (aspirina) u otros antiinflamatorios no esteroideos. Las reacciones pueden incluir asma (dificultad para respirar), urticaria, inflamación de la cara o lengua o rinitis aguda (inflamación de la mucosa nasal).
- Si tiene menos de 14 años.
- No aplicar sobre heridas, lesiones ezcetomatosas, quemaduras o mucosas.

Embarazo y lactancia:

Debido a que la administración de medicamentos de este tipo se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible. En el tercer trimestre la administración del medicamento está contraindicada. No está recomendado el uso de este medicamento durante la lactancia.

En período de lactancia no use este gel, excepto que se lo haya indicado su médico.

Conducción y uso de máquinas:

No se ha descrito ningún efecto del medicamento sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas.

Dosis:

Adultos y adolescentes mayores de 14 años: Aplicar 3 o 4 veces al día una pequeña cantidad de gel sobre la zona inflamada o dolorida. La cantidad de gel variará dependiendo del tamaño de la zona afectada (normalmente, será suficiente aplicar una cantidad similar al tamaño de entre una cereza y una nuez) (una cantidad de 2 a 4 gramos). Utilice la menor cantidad durante el menor tiempo necesario. Aplicar sólo en superficies de la piel intactas y sanas (sin heridas abiertas o lesiones). Debe evitarse que entre en contacto con los ojos o con membranas mucosas.

Lávese las manos tras aplicar el gel, a menos que el tratamiento sea para sus manos.

Efectos adversos:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

- Inflamación de la piel, con ampollas (signos de dermatitis ampollosa).
- Urticaria, con ampollas purulentas (signo de erupción pustular). Reacciones alérgicas como erupción con picor o pitidos en el pecho, dificultad al respirar o tragar, mareo (signos de hipersensibilidad).
- Hinchazón en la cara, labios, boca, lengua o garganta que puede causar dificultad al tragar, respirar o hablar (signos de angioedema).
- Dificultad repentina para respirar y sensación de opresión en el pecho con pitidos o tos (signos de asma).
- Erupción cutánea (signos de dermatitis o rash).
- Enrojecimiento de la piel (signos de eritema).
- Picor y quemazón en la piel (signos de prurito y eczema).
- Aumento de la sensibilidad de la piel al sol (signos de reacciones de fotosensibilidad).

Advertencias y precauciones:

- Aplique este gel únicamente sobre superficies de piel intacta y sana.
- Este medicamento es solo para uso externo. No debe ingerirse, ni aplicarse sobre mucosas.
- No utilizar vendajes oclusivos o herméticos.
- No debe aplicarse el medicamento en los ojos. Si accidentalmente sucede, lave los ojos con agua limpia y consulte a su médico o farmacéutico.
- No debe exponer al sol la zona tratada (aun estando nublado) ni a lámparas de radiaciones ultravioleta (rayos UVA).
- Evite aplicarlo en zonas extensas, o durante espacios prolongados de tiempo, salvo indicación médica.
- No utilizar de forma conjunta sobre la misma zona, otros medicamentos de uso tópico.
- Debe interrumpir el tratamiento si se produce erupción cutánea tras la aplicación del medicamento.

Conservación:

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. No conservar a temperatura superior a 25°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Importado y Distribuido por:

Casa de representaciones BioVenezuela c.a.

Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630

Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio

Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.

www.BioVenezuela.net

Importado bajo el No. de Permiso sanitario de Importación

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

