



# BIOTIOFEN

Tiocolchicósido 4 mg + Ibuprofeno 400 mg



## BIO-PROSPECTO

### Composición:

Cada Tableta Recubierta Contiene:

Ibuprofeno. .... 400mg

Tiocolchicósido. .... 4mg

Excipientes. .... C.S.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

BIOTIOFEN, es un medicamento combinado de Ibuprofeno (clasificado como un AINEs) y Tiocolchicósido. El ibuprofeno es un inhibidor de la síntesis de mediadores de inflamación, fiebre y dolor (prostaglandinas) a nivel periférico. El Tiocolchicósido es un relajante muscular que inhibe las contracciones musculares.

### Indicaciones:

Analgésico – Relajante Muscular

### Posología:

1 Tableta cada 8 horas

### ¿Para qué sirve el BIOTIOFEN?

- Alteraciones musculoesqueléticas y traumáticas con dolor e inflamación.
- Tratamiento sintomático del dolor muscular leve a moderado.
- Contracturas musculares dolorosas asociadas a patología vertebral aguda en adultos y adolescentes.

### Efectos Secundarios:

- Úlcera péptica, perforación y hemorragia gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, estreñimiento, malestar abdominal, dolor abdominal, heces oscuras (casi negras, contacte a su médico si esto aparece), vómitos con sangre (contacte a su médico si esto aparece), úlceras bucales.
- Exacerbación de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.
- Cansancio o somnolencia (sueño), dolor de cabeza, mareos, vértigo, erupción.

### Contraindicaciones y Advertencias:

- Reacciones alérgicas a los componentes del medicamento o a otros AINEs.
- Historial de reacciones alérgicas como broncoespasmo, asma, rinitis, angioedema o urticaria asociada con el consumo de AAS (ácido acetilsalicílico) u otros AINEs.
- Mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos adecuados.
- No debe usarse en niños menores de 16 años.
- Antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con AINEs.
- Úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal o sus antecedentes, enfermedad inflamatoria intestinal activa, insuficiencia renal grave, insuficiencia hepática grave, insuficiencia cardíaca grave, trastornos de la coagulación, hemorragias cerebrovasculares u otras hemorragias activas.
- En casos de parálisis flácida o hipotonía muscular.

### Embarazo y Lactancia:

No se administre durante el embarazo o cuando sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo / beneficio sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia.

### Interacciones:

- Incremento del riesgo de úlcera gastrointestinal y hemorragias con AINEs, anticoagulantes orales, antiagregantes plaquetarios del tipo AAS (ácido acetilsalicílico), corticoides orales e ISRS.
- Reduce la eficacia de furosemida y diuréticos tiazídicos.
- Reduce el efecto hipotensor de  $\beta$ -bloqueantes, IECA, antagonistas de la angiotensina II.
- Riesgo de hiperpotasemia con diuréticos ahorradores de potasio.
- Aumenta niveles plasmáticos de digoxina, fenitoína y litio.
- Aumenta toxicidad de metotrexato, hidantoínas, sulfamidas, baclofeno.
- Aumenta efecto de hipoglucemiantes orales e insulina.
- Riesgo de hemorragia aumentado con ginkgo biloba.
- Potencia el efecto nefrotóxico de aminoglucósidos.

### Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
- Úlcera gastrointestinal.
- Dengue

### Presentación

- Caja con 10 Tableta Recubiertas 400 mg + 4 mg

Importado y Distribuido por:

**Casa de representaciones BioVenezuela c.a.**

**Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630**

**Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio**

**Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.**

[www.BioVenezuela.net](http://www.BioVenezuela.net)

**Importado bajo el No. de Permiso sanitario de Importación 00002444**

## CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

