

## ESCITABIOPRAM 20mg Escitalopram



### BIO-PROSPECTO

#### Composición de ESCITABIOPRAM

El principio activo es *escitalopram*.

Cada comprimido de ESCITABIOPRAM contiene 20 mg de escitalopram.

Los demás componentes son: celulosa microcristalina, sílice coloidal, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, hipromelosa, macrogol 6000, dióxido de titanio (E-171) y talco.

#### INDICACIONES:

ESCITABIOPRAM contiene escitalopram y está indicado para el tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores) y trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo-compulsivo).

Escitalopram pertenece a un grupo de antidepresivos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRSs). Estos medicamentos actúan sobre el sistema serotoninérgico en el cerebro aumentando el nivel de serotonina. Las alteraciones del sistema serotoninérgico se consideran un factor importante en el desarrollo de la depresión y enfermedades relacionadas.

#### CONTRAINDICACIONES:

No tome ESCITABIOPRAM si:

- Usted es alérgico (hipersensible) al escitalopram o a cualquiera de los demás componentes de Escitabiopram.
- Usted toma otros medicamentos que pertenecen al grupo denominado inhibidores de la MAO, incluyendo selegilina (utilizada para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson), moclobemida (utilizada para el tratamiento de la depresión) y linezolidina (un antibiótico).
- Padece desde el nacimiento algún tipo de alteración del ritmo del corazón o ha sufrido alguna vez algún episodio de este tipo (esto se observa con el electrocardiograma, una prueba que sirve para evaluar cómo funciona el corazón).
- Está tomando medicamentos para alteraciones del ritmo cardiaco o que pueden afectar al ritmo cardiaco.

#### Tenga especial cuidado con ESCITABIOPRAM

Por favor, informe a su médico si padece algún otro trastorno o enfermedad, ya que su médico puede necesitar tenerlo en cuenta. En concreto, informe a su médico:

- Si padece epilepsia.
- Si padece insuficiencia hepática o insuficiencia renal.
- Si padece diabetes
- Si tiene un nivel disminuido de sodio en la sangre.
- Si tiende fácilmente a desarrollar hemorragias o cardenales.
- Si está recibiendo tratamiento electroconvulsivo.
- Si padece una enfermedad coronaria.
- Si padece o ha padecido algún problema de corazón o ha sufrido recientemente un infarto cardiaco.

Toma de ESCITABIOPRAM con alimentos y bebidas: Escitalopram puede tomarse con o sin alimentos. Como con muchos medicamentos, no se recomienda la combinación de Escitalopram y alcohol, aunque no se espera que Escitalopram interacte con alcohol.

**Embarazo y lactancia:** Informe a su médico si está embarazada o prevé estarlo. No tome ESCITABIOPRAM si está embarazada a menos que usted y su médico hayan analizado los riesgos y beneficios implicados.

**Conducción y uso de máquinas:** Se aconseja que no conduzca o utilice maquinaria hasta que conozca cómo le puede afectar Escitalopram.

**Posología:** Siga exactamente las instrucciones de administración de ESCITABIOPRAM indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

#### Adultos

##### Depresión

La dosis normalmente recomendada de ESCITABIOPRAM es de 10 mg tomados como dosis única al día. Su médico puede aumentarla hasta un máximo de 20 mg al día.

##### Trastorno de angustia

La dosis inicial de ESCITABIOPRAM es de 5 mg como dosis única al día durante la primera semana antes de aumentar la dosis a 10 mg al día. Su médico puede aumentarla posteriormente hasta un máximo de 20 mg al día.

##### Trastorno de ansiedad social

La dosis normalmente recomendada de ESCITABIOPRAM es de 10 mg tomados como dosis única al día. Su médico puede disminuir su dosis a 5 mg al día o aumentar la dosis hasta un máximo de 20 mg al día, dependiendo de cómo usted responde al medicamento.

##### Trastorno de ansiedad generalizada

La dosis normalmente recomendada de ESCITABIOPRAM es de 10 mg tomados como dosis única al día. La dosis puede ser aumentada por su médico hasta un máximo de 20 mg al día.

##### Trastorno obsesivo-compulsivo

La dosis normalmente recomendada de ESCITABIOPRAM es de 10 mg tomados como dosis única al día. La dosis puede ser aumentada por su médico hasta un máximo de 20 mg al día.

#### Advertencias

Si usted toma más dosis de ESCITABIOPRAM que las recetadas, contacte inmediatamente con su médico, vaya al servicio de urgencias del hospital más cercano o consulte al Servicio de Información Toxicológica. Hágalo incluso cuando no observe molestias o signos de intoxicación. Algunos de los signos de sobredosificación pueden ser mareos, temblor, agitación, convulsión, coma, náuseas, vómitos, cambios en el ritmo cardíaco, disminución de la presión sanguínea y cambios en el equilibrio hidrosalino corporal.

#### Efectos adversos

Los efectos adversos normalmente desaparecen después de pocas semanas de tratamiento. Por favor sea consciente de que muchos de los efectos pueden ser síntomas de su enfermedad y por tanto mejoraran cuando usted empiece a encontrarse mejor. Entre ellos están: sangrados inusuales, incluyendo sangrados gastrointestinales, hinchazón de la piel, lengua, labios o cara, o tiene dificultades respiratorias o de deglución (reacción alérgica), contacte con su médico o vaya al hospital enseguida; dificultades para orinar, convulsiones (ataques), piel amarillenta y blanqueamiento en los ojos, son signos de alteración de la función hepática; náuseas.

#### Aspecto del producto y contenido del envase

ESCITABIOPRAM 20 mg se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película.

ESCITABIOPRAM 20 mg comprimidos son comprimidos de color blanco o casi blanco, redondos, biconvexos, ranurados y serigrafiados que se presentan en envases de 30 comprimidos.

Importado y Distribuido por:

**Casa de representaciones BioVenezuela c.a.**

**Rif: J-413246040**


**Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio**

**Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.**

[www.BioVenezuela.net](http://www.BioVenezuela.net)

**Importado bajo el  
No. de Permiso sanitario de Importación 00002122**

### CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL



Si usted toma más dosis de ESCITABIOPRAM que las recetadas, contacte inmediatamente con su médico, vaya al servicio de urgencias del hospital más cercano o consulte al Servicio de Información Toxicológica. Hágalo incluso cuando no observe molestias o signos de intoxicación. Algunos de los signos de sobredosisificación pueden ser mareos, temblor, agitación, convulsión, coma, náuseas, vómitos, cambios en el ritmo cardíaco, disminución de la presión sanguínea y cambios en el equilibrio hidrosalino corporal.

## **Efectos adversos**

Los efectos adversos normalmente desaparecen después de pocas semanas de tratamiento. Por favor sea consciente de que muchos de los efectos pueden ser síntomas de su enfermedad y por tanto mejoraran cuando usted empiece a encontrarse mejor. Entre ellos están: sangrados inusuales, incluyendo sangrados gastrointestinales, hinchazón de la piel, lengua, labios o cara, o tiene dificultades respiratorias o de deglución (reacción alérgica), contacte con su médico o vaya al hospital enseguida; dificultades para orinar, convulsiones (ataques), piel amarillenta y blanqueamiento en los ojos, son signos de alteración de la función hepática; náuseas.

## **Aspecto del producto y contenido del envase**

ESCITABIOPRAM 20 mg se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película.

ESCITABIOPRAM 20 mg comprimidos son comprimidos de color blanco o casi blanco, redondos, biconvexos, ranurados y serigrafiados que se presentan en envases de 30 comprimidos.

Importado y Distribuido por