

BioVenezuela



FERROBIOL

200mg

Sulfato Ferroso



BIO-PROSPECTO

Composición:

Cada Tableta recubierta contiene:
Sulfato Ferroso BP. 200mg.
(equivalente a 65mg de Hierro elemental)
Excipientes. C.S.

Clasificación:

Suplemento Vitamínico.

Indicaciones:

Se utiliza para prevenir y tratar estados de deficiencia de hierro, como es el caso de la anemia ferropénica o ferropriva.

Modo de administración:

Vía oral. Los comprimidos no se deben chupar, masticar o dejar en la boca, sino que se tragarán enteros, con agua. Tomar antes o durante las comidas.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad; sobrecarga de hierro (ej. hemocromatosis, hemosiderosis); transfusiones sanguíneas repetidas; terapia parenteral concomitante con hierro anemias no relacionadas con déficit de hierro, tales como anemia aplásica, hemolítica y sideroblástica; pancreatitis y cirrosis hepática.

Advertencias y precauciones:

No administrar FERROBIOL a niños con p.c. < 28 kg (entre 9 y 10 años); no responde al tratamiento la hiposideremia asociada a síndrome inflamatorio; aparición de heces de color oscuro; en ancianos y pacientes con trastornos de la deglución, mayor riesgo de lesiones esofágicas, granuloma bronquial y/o necrosis que pueden conducir a broncostenosis.

Interacciones:

- Riesgo de lipotimia o shock con: sales de Fe por vía parenteral. Disminuye la absorción de: bifosfonatos; tetraciclinas y derivados tetraciclínicos; metildopa, levodopa, carbidopa; fluoroquinolonas; penicilamina, hormonas tiroideas/tiroxina. Espaciar dosis mín. 2 h.
- Absorción disminuida con: antiácidos con Ca, Al, Mg (trisilicato de Mg) y productos con Zn (espaciar dosis mín. 2 h); colestiramina (administrar Fe 1-2 h antes o 4-6 h después).
- Absorción aumentada con: ácido ascórbico.
- Respuesta retardada con: cloranfenicol.
- Absorción inhibida por: ácidos fíticos (cereales integrales), polifenoles (té, café, vino tinto), Ca (leche, productos lácteos) y algunas proteínas (huevos).
- Espaciar dosis mínimo 2 h.
- No administrar con: agentes quelantes (p.ej. EDTA sódico).

Embarazo FERROBIOL:

Compatible. Están disponibles una gran cantidad de datos (más de 1.000 resultados expuestos) que no indican ni malformación ni toxicidad fetal/neonatal, aunque no hay estudios específicos en mujeres embarazadas.

Lactancia FERROBIOL:

Las sales de hierro se excretan en la leche materna, pero a dosis terapéuticas, no se prevén efectos para el recién nacido/bebé. Puede usarse durante la lactancia.

Reacciones adversas:

Estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, cambios en el color de las heces, náuseas.

Sobredosificación:

En caso de intoxicación mayor, la terapia de referencia para la intoxicación por hierro es la deferoxamina IV.

Importado y Distribuido por:

Casa de representaciones BioVenezuela c.a.

Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630

Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio

Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.

www.BioVenezuela.net

**Importado bajo el
No. de Permiso sanitario de Importación**

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

