

BIOSTRIZO 1mg Anastrozol



BIO-PROSPECTO

medicamentos denominados "inhibidores de la aromatasa". Biostrizol se utiliza para tratar el cáncer de mama en mujeres que se encuentran en la menopausia. Biostrizol actúa reduciendo la cantidad de hormonas denominadas estrógenos que son producidas por su organismo, mediante el bloqueo de una sustancia corporal natural (una enzima) llamada "aromatasa". El Biostrizol es un inhibidor de aromatasa, lo que significa que interrumpe un

Contiene una sustancia llamada anastrozol y pertenece a un grupo de

rios requieren estrógeno para crecer, esos cánceres tienen receptores de estrógenos (REs), y son llamados RE-positivos; al eliminar el estrógeno se suprime su crecimiento. **ADVERTENCIAS:** Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Biostrizol.

paso crítico en la síntesis de estrógenos del cuerpo. Algunos cánceres mama-

- Si todavía tiene los periodos menstruales y no presenta la menopausia.

- Si está tomando un medicamento que contiene tamoxifeno o medicamentos que contengan estrógeno.

- Si alguna vez ha padecido alguna alteración que afecte a la fortaleza de sus huesos (osteoporosis).
- Si padece algún problema de hígado o de riñones. EMBARAZO Y LACTANCIA:
- de lactancia. Interrumpa Biostrizol si se queda embarazada y consulte a su médico.

No tome Biostrizol si está embarazada o en periodo

BIOSTRIZOL: Contiene lactosa, Este medicamento contiene lactosa, que es un tipo de azúcar. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a cier-

Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado re-

Conducción y uso de máquinas Es improbable que anastrozol afecte a su

capacidad para conducir o utilizar cualquier herramienta o máquina.

tos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

cientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. Esto incluye medicamentos adquiridos sin receta y plantas medicinales. Esto

que contienen tamoxifeno.

INTERACCIONES

se debe a que anastrozol puede afectar a la actividad de otros medicamentos, y algunos medicamentos pueden presentar un efecto sobre Biostrizol. NO TOME ANASTROZOL SI YA ESTÁ EN TRATAMIENTO CON CUAL-QUIERA DE LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS: - Ciertos medicamentos empleados para tratar el cáncer de mama (modu-

ladores selectivos del receptor estrogénico), por ejemplo, medicamentos

- Medicamentos que contengan estrógenos, como la terapia hormonal de

sustitución (THS). Esto se debe a que estos medicamentos pueden ha-

cer que anastrozol deje de actuar adecuadamente. CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO SI ESTÁ TOMANDO LO SIGUIENTE: - Un medicamento conocido como un "análogo LHRH". Esto incluye gona-

dorelina, buserelina, goserelina, leuprorelina y triptorelina. Estos medica-

mentos se utilizan para tratar el cáncer de mama, algunas alteraciones

Si olvida tomar una dosis, simplemente tome la próxima dosis normalmente. No tome una dosis doble (dos dosis al mismo tiempo) para compensar una dosis olvidada.

- Aumento o elevados niveles de un compuesto graso en sangre conocido

- Cambios en las pruebas sanguíneas que muestran en qué medida su hí-

como colesterol, que sería observado en un análisis de sangre.

de salud femeninas (ginecológicas) y la infertilidad.

- Erupción cutánea. - Dolor o rigidez en las articulaciones.

- Inflamación de las articulaciones (artritis).

- Sensación de mareo (náuseas).

- Síndrome del túnel carpiano (hormigueo, dolor, sensación de frío, debilidad en zonas de la mano). - Diarrea.

- Dolor óseo.

- Sequedad vaginal.

- Dolor muscular.

de tratamiento.

- Vómitos.

- Somnolencia.

EFECTOS ADVERSOS:

- Dolor de cabeza.

- Sofocos.

- Debilidad.

- gado está funcionando de forma adecuada. - Debilitamiento del pelo (pérdida de cabello).
- Reacciones alérgicas (hipersensibilidad) incluyendo cara, labios o lengua.
- Hemorragia vaginal (normalmente en las primeras semanas de tratamiento - si la hemorragia continúa, hable con su médico).
- nas. Efectos sobre sus huesos: Biostrizol disminuye los niveles de las hormonas
- denominadas estrógenos presentes en su organismo. Esto puede reducir el contenido mineral de sus huesos. Estos pueden ser menos fuertes y hacer

gún las directrices de tratamiento del estado de los huesos

Estos efectos son muy frecuentes, afectan a una (1) de cada diez (10) perso-

que las fracturas sean más probables. Su médico controlará estos riesgos se-

postmenopáusicas. Debe hablar con su médico sobre los riesgos y opciones

Importado y Distribuido por: Casa de representaciones BioVenezuela c.a.

Importado bajo el

No. de Permiso sanitario de Importación 00001182

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

Rif: J-413246040 / Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio

Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela. www.BioVenezuela.net

Tabletas USP

MANTENGASE FUERA DEL ALCALCE DE LOS NIÑOS

BioVenezuela





Fabricado por: Kawality Pharmaceuticals Ltd. Nag Kalam, Majhita Road, Amritsar 143601 India. Importado y Distribuido por: Casa de representaciones BioVenezuela c.a. Rif: J-413246040 Av. Americo Vespucio, Marina Americo Vespucio Local 1, Puerto la Cruz edo Anzoátegui 6023 Venezuela. bajo el No. de Permiso sanitario de Importación 00000087

MANTENGASE FUERA DEL ALCALCE DE LOS NIÑOS

Tabletas USP

Lote: Fab: Exp:

Anastrozol

1 Mg. 10 x 10 Tabletas

1 Mg.

10 x 10 Tabletas

Fab. lic. No.: 1804-B

