



# BIOPLATELET 75mg

## Clopidogrel



## BIO-PROSPECTO

### COMPOSICIÓN:

Cada tableta recubierta contiene:  
Clopidogrel Bisulfato USP equivalente a Clopidogrel..... 75mg  
Excipientes..... C. s.

### Vía de Administración: Oral

### INDICACIONES:

Tratamiento preventivo de los eventos isquémicos vasculares en pacientes con historial de enfermedades arteroscleróticas sintomáticas. Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, asociado con Ácido acetilsalicílico con o sin tratamiento de trombolíticos.

El clopidogrel es un agente antiplaquetario, que inhibe la formación de coágulos en la enfermedad arterial coronaria, enfermedad vascular periférica, y enfermedad cerebrovascular. Actúa mediante la inhibición reversible de un receptor llamado P2Y<sub>1</sub>, el cual es importante en la agregación plaquetaria y la unión de las plaquetas por medio de la fibrina.

### POSOLOGIA: (dosis recomendada)

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 tableta recubierta de 75mg al día.

### ADVERTENCIAS:

Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No exceda la dosis prescrita. En Pacientes que van a ser intervenidos en algún procedimiento quirúrgico, se debe suspender el uso de este producto por lo menos siete (7) días antes de la intervención. Si se requiere una rápida corrección en el tiempo de sangrado, se puede utilizar una transfusión de plaquetas para revertir los efectos de BIOPLATELET.

BIOPLATELET CONTIENE LACTOSA. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares (lactosa), consulte con él antes de tomar este medicamento. EMBARAZO Y LACTANCIA: Es preferible no utilizar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

### CONDUCCIÓN Y USO DE MÁQUINAS:

Es poco probable que BIOPLATELET altere su capacidad de conducir o manejar maquinarias.

### CONTACTE CON SU MÉDICO INMEDIATAMENTE SI EXPERIMENTA:

Fiebre, signos de infección o cansancio grave. Estos síntomas pueden deberse a un raro descenso de algunas células de la sangre. Signos de problemas del hígado, tales como coloración amarilla de la piel y/o los ojos (ictericia), asociada o no a hemorragia que aparece bajo la piel como puntos rojos y/o confusión. Hinchazón de la boca o trastornos de la piel tales como sarpullidos y picores, ampollas en la piel. Estos pueden ser signos de una reacción alérgica.

### CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad al principio activo, al aceite de soja, al aceite de maní o a alguno de los excipientes.
- Insuficiencia hepática grave.
- Hemorragia patológica activa, como por ejemplo ulcera péptica o hemorragia intracranial.

### INTERACCIONES:

- Algunos medicamentos pueden influir en el uso de Clopidogrel o viceversa.
- No se recomienda la administración conjunta de Clopidogrel con anticoagulantes orales (medicamentos utilizados para disminuir la coagulación sanguínea).
  - Debe informar expresamente a su médico si está tomando antiinflamatorios no esteroideos, fármacos utilizados generalmente para tratar el dolor y/o la inflamación de músculos o articulaciones, o si está tomando heparina, o cualquier otro medicamento utilizado para disminuir la coagulación sanguínea, o si está tomando un inhibidor de la bomba de protones (p.ej. omeprazol) para las molestias de estómago, o si está tomando antirretrovirales (medicamentos para tratar la infección por el VIH).
  - Debe informar expresamente a su médico si está tomando ticlopidina, otro agente antiagregante plaquetario.
  - Si usted ha sufrido dolor torácico grave (angina inestable o infarto de miocardio), quizás le han prescrito Clopidogrel en combinación con ácido acetilsalicílico, sustancia presente en muchos medicamentos utilizados para aliviar el dolor y bajar la fiebre. Una dosis de ácido acetilsalicílico administrada esporádicamente (no superior a 1.000 mg en 24 horas) no debe causar ningún problema, pero el uso prolongado en otras circunstancias debe consultarse con su médico.
  - Otros tratamientos en conjunto al clopidogrel: dado que el clopidogrel se metaboliza a su metabolito activo en parte mediante CYP2C19, debe esperarse que la utilización de medicamentos que inhiben la actividad de esta enzima de lugar a unos niveles reducidos del metabolito activo de clopidogrel. Como precaución debe evitarse la utilización concomitante de inhibidores CYP2C19 fuertes o moderados. Entre los medicamentos que son inhibidores potentes o moderados se incluyen, por ejemplo, omeprazol y esomeprazol, fluvoxamina, fluoxetina, moclobenamida, voriconazol, fluconazol, ticlopidina, carbamazepina y efavirenz.

### PRESENTACION:

BIOPLATELET 75mg. Tabletas recubiertas color rojo de 10mm empacadas en 10 blíster de 10 tabletas cada blíster.

**No utilice BIOPLATELET** después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de EXP. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

**Conservar por debajo de 30°C.**

**No use BIOPLATELET si observa signo visible de deterioro.**

Importado y Distribuido por:

**Casa de representaciones BioVenezuela c.a.**

**Rif: J-413246040**

**Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio**

**Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.**

[www.BioVenezuela.net](http://www.BioVenezuela.net)

**Importado bajo el No. de Permiso sanitario de Importación 00001182**

## CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

