



REVISTA DIGITAL 2025



CÁNCER CERVICOUTERINO



Amor | Prevención




INTRODUCCIÓN

El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado y proliferación anormal de las células. De los diferentes tipos de cáncer que afectan a las mujeres, el de cuello uterino (CCU) es una de las enfermedades más frecuentes (Bermudez 2005). Esta patología aparece en la unión escamocelular entre el epitelio columnar del endocervix y el epitelio escamoso de la ectocervix, donde ocurren los cambios metaplásicos.

En la población general, se presenta como el séptimo cáncer más común, ocupando el tercer lugar dentro de los cánceres femeninos. Para el año de 2008 fueron reportados cerca de 530,000 casos nuevos y 275,000 muertes por esta causa (Figura 1) (Ferlay et al. 2010). Del total de casos reportados, el 85% (453,000 casos y 242,000 muertes) se observan en los países en vías de desarrollo del África, Asia Sur-Central, Melanesia, América Latina y el Caribe. En el 2008, los países latinoamericanos reportaron una incidencia de 68,220 casos


CÁNCER CERVICOUTERINO

El cáncer cervicouterino, también conocido como cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años.



CÁNCER

ESTADÍSTICAS




El cáncer cervicouterino es el padecimiento más frecuente en mujeres mexicanas.


Revísate anualmente.



Es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz.

Al inicio las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y duran así varios años.






Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso.




INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO



Esta infección viral, que es mucho más frecuente en mujeres menores de 30 años, puede causar una displasia cervical.

Esta es una lesión precancerosa, que si no se trata y se deja evolucionar, puede llegar a causar un cáncer en un periodo de 10 años o menos.




FACTORES DE


CÁNCER CERVICOUTERINO FACTORES DE RIESGO




Sistema
inmunológico bajo



Dar a luz a varios hijos



Contagio con
virus del VPH



Anticonceptivos
orales



Fumar

R I E S G O



SÍNTOMAS



Sangrado vaginal



Relaciones sexuales dolorosas



Problemas al orinar




Hinchazón en las piernas

Los síntomas de la infección viral o de la displasia cervical, son irritación, ardor y dolor en la vagina por aumento del flujo. Puede tener mal olor, que no se quita a pesar de los tratamientos.



¿CÓMO DETECTAR LA INFECCIÓN?

La forma más fácil es con el papanicolaou, que se debe realizar 1 vez al año. Es un estudio que se deben hacer todas las mujeres que ya iniciaron relaciones sexuales o que tienen más de 25 años.



Consiste en la introducción de un espejo vaginal que permite ver el cuello de la matriz y tomar una muestra de células, que son analizadas para identificar si son normales o presentan alguna alteración.



PAPANICOLAOU

El papanicolaou es la prueba que se usa para detectar los cambios prematuros en las células del útero, las cuales pueden derivar en un cáncer.

EL PATÓLOGO ES EL MÉDICO que se especializa en interpretar análisis del laboratorio y evaluar células, tejidos y órganos para diagnosticar el cáncer cervicouterino.



Es posible que algunas de las células obtenidas del cuello úterino durante la prueba de papanicolaou se analice para detectar el VPH, este es un gran factor de riesgo de cáncer de cuello úterino.



RECOMENDACIONES:

- SIN SANGRADO.
- 5 ANTES O 5 DÍAS DESPUÉS DE TERMINAR TU PERIODO MENSTRUAL.
- 3 DÍAS SIN RELACIONES SEXUALES.
- COPIA DE CREDENCIAL.

EL ESTUDIO SE TIENE QUE REALIZAR CADA AÑO A PARTIR DE COMENZAR UNA VIDA SEXUAL ACTIVA



PAPANICOLAOU

En nuestra Institución colabora con nosotros la Dra. Patóloga Ana Patricia quien da el diagnóstico y resultado del estudio de papanicolaou que te realizas en el PATRONATO LUPE GÒMEZ DE DEL MORAL A.C.



Carrera: Médico Cirujano :
UNAM (1995–2000)

Título y Cédula Profesional:
3309838

Postgrado: Especialidad en
Anatomía Patológica.

Subespecialidad: Patología Pediátrica en el
Instituto Nacional de Pediatría

Diplomado en Criminología y Criminalística.

Reecertificado en 2015. Examen del Consejo
Mexicano de Anatomía y Patológica.



¿CÓMO CUIDARSE?



Haciendo uso del preservativo o condón. También puede aplicarse la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas entre los 10 y 12 años o antes de que inicies tu vida sexual activa.



ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Las ETS son enfermedades que se pasan de una persona a otra a través del contacto sexual. Estas incluyen la clamidia, la gonorrea, los herpes genitales, el virus del papiloma humano (VPH), la sífilis y el VIH. Muchas de estas enfermedades no tienen síntomas por un largo tiempo. Incluso sin síntomas, aún pueden hacer daño y transmitirse durante las relaciones sexuales.



ESTAMOS PARA AYUDARTE



PatronatoLupeGomez



@patronato_lupegomez



www.patronatolupegomez.org



plupegomezde_delmoral@hotmail.com



Calle Manuel Doblado#229 A, Zona
Centro, San Francisco del Rincón, Gto.



(476) 7430853

