



**VETERİNER PARAZİTOLOJİSİ ALANINDA
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR**

Editör: Prof. Dr. Mehmet YAMAN

yaz
yayınları

Veteriner Parazitolojisi Alanında Bilimsel Arařtırmalar

Editör

Prof. Dr. Mehmet YAMAN

yaz
yayınları

2026

**Veteriner Parazitolojisi Alanında Bilimsel
Arařtırmalar**

Editör: Prof. Dr. Mehmet YAMAN

© YAZ Yayınları

Bu kitabın her türlü yayın hakkı Yaz Yayınları'na aittir, tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı Kanun'un hükümlerine göre, kitabı yayınlayan firmanın önceden izni alınmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz, depolanamaz.

E_ISBN 978-625-8574-98-2

Mart 2026 – Afyonkarahisar

Dizgi/Mizanpaj: YAZ Yayınları

Kapak Tasarım: YAZ Yayınları

YAZ Yayınları. Yayıncı Sertifika No: 73086

M.İhtisas OSB Mah. 4A Cad. No:3/3
İscehisar/AFYONKARAHİSAR

www.yazyayinlari.com

yazyayinlari@gmail.com

İÇİNDEKİLER

Köpeklerde Cryptosporidiosis	1
<i>İpek ERDEM</i>	
Köpeklerde <i>Anaplasma platys</i> ve <i>Ehrlichia canis</i>	
Enfeksiyonları ve İlişkili Risk Faktörleri.....	16
<i>Fatma Nuray ŞİMŞEK</i>	

"Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluk da yazarlara aittir."

KÖPEKLERDE CRYPTOSPORIDIOSIS¹

İpek ERDEM²

1. GİRİŞ

Paraziter hastalıklar özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüksek oranda morbidite ve mortalite ile seyrederek. *Cryptosporidium* spp. zorunlu, hücre içi ve ekstrasitoplazmik bir protozondur. Parazit bağırsak mikrovilluslarına yerleşip enfeksiyona neden olan enterik bir patojen olmasına rağmen kanatlılarda ayrıca solunum sistemine, bursa fabriciuslarına ve trakea epitellerine, insanların solunum sistemlerine ve maymunların safra keseleri ile pankreaslarına da yerleşebilir (Fayer 2007, Sevinç ve Dik 2015).

Cryptosporidium soyuna ait tür sayısı moleküler çalışmaların ilerlemesi ile birlikte her geçen gün artmaktadır. Güncel raporlara göre geçerli olan en az 45 *Cryptosporidium* türü ve 120’den fazla genotipi mevcuttur (Huang ve ark. 2023).

Cryptosporidiosisite bulaşma genel olarak *Cryptosporidium* spp. ookistlerinin fekal-oral yolla alınması ile olur. Nadir olarak da inhalasyon yoluyla bulaşma söz konusudur.

Enfeksiyonun klinik bulgusu diğer gastroenteritis etkenlerinin oluşturduğu hastalık tablosu ile benzerlik gösterdiği için tanıda yetersiz kalır. Bunun için etkenin teşhisinde dışkı

¹ Bu bölüm, yazarın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “Hatay Yöresi Köpeklerinde *Cryptosporidium* spp. Yaygınlığının Mikroskopik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir. (Proje No: 22.D.001)

² Dr. Öğr. Üyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Parazitolojisi Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-0086-8294.

numunesinin çeřitli boyalarla boyanması, serolojik olarak test edilmesi ve farklı moleküler tanı yöntemleri kullanılır.

Tedavide sıvı-elektrolit uygulamaları yapılırsa da enfeksiyonun kanıtlanmış etkili bir tedavisi yoktur (Lucio-Forster ve ark. 2010). Bu sebeple korunmada, temizlik ve hijyen şartlarına dikkat etmek gerekir.

Günümüzde köpekler aile fertlerinden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla insan-köpek yaklaşması ile köpeklerdeki bazı hastalıkların insanlara bulaşma riski doğmuştur. Cryptosporidiosis immunsupresif kişiler için hayatı tehlikeye atabilecek en yaygın fırsatçı hastalıklardan biridir. Dünya çapında beş yaşın altındaki çocuklarda ishale bağlı ölümlerin ilk ikisi Rotavirüs ve Shigella'dan kaynaklanırken, üçüncü sırada ise *Cryptosporidium* yer almaktadır (Taghipour ve ark. 2020). Cryptosporidiosisli köpekler genelde hastalığı asemptomatik geçirirler ve bu süreçte etrafa ookist saçmaya devam ederler. (Scorza ve Tangtronsup 2010). Bu yüzden bir an önce tanı konup rezervuar köpeklerin tespit edilerek uygun korunma yöntemleri ile ookist saçmalarının önüne geçilmesi gerekir.

2. KÖPEKLERDE CRYPTOSPORIDIOSIS

2.1. Tarihçesi

Köpeklerde *Cryptosporidium* enfeksiyonundan ilk bahsedenler Tzipori ve Campbell olmuştur. Arařtırıcılar 1981 yılında inceledikleri 20 adet köpek serumunun 16'sında *Cryptosporidium* antikorlarını tespit etmişlerdir (Tzipori ve Campbell 1981). İki yıl sonrasında akut diyareli bir haftalık köpekte ilk klinik cryptosporidiosis vakası tanımlanmıştır (Wilson ve ark., 1983). *Cryptosporidium* enfeksiyonu tür spesifik değildir ancak köpeklerde yaygın olarak görülen tür *C. canis*'tir. İnsanlardaki cryptosporidiosis vakalarının çoğu *Cryptosporidium*

parvum ve *C. hominis* tarafından oluřturulurken bazen *C. canis* tarafından da oluřturulabilmektedir (Xiao ve ark. 2007). HIV pozitif bir kiřide ilk kez *C. canis* tespit edildikten sonra (Pieniazek ve ark. 1999) benzer birok alıřma yayınlanmıř ve immün sistemi baskılanmıř insanlarda bu parazite karřı dikkat ekilmiřtir (Cama ve ark. 2003, Sannella ve ark. 2019). Bunun yanı sıra *C. canis* immünkompetan kiřilerde de grlmřtir (Pedraza-Diaz ve ark. 2001). Aynı evde yařayan 32 aylık bir kız ocuęu ile altı buuk yařındaki erkek ocuęunda *Cryptosporidium* spp. tespit edilmiřtir. Kardeř olan bu ocukların evinde ayrıca civciv, tavuk, tavřan ve kpek olmak zere drt eřit hayvanın mevcut olduęu, bu hayvanlardan alınıp incelenen numunelerden sadece kpeęe ait olanda cryptosporidiosisin teřhis edildięi bildirilmiřtir. Yapılan sekans analizinde ise hem ocuklarda hem de kpekte grlen trn *C. canis* olduęu rapor edilmiřtir. Kız ocuęunda geici olarak (iki gn) ishal grlrken, kpekte herhangi bir klinik semptom gzlenmemiřtir. Su kaynaklı cryptosporidiosis salgınını ekarte etmek amacıyla komřu evlerde de tarama yapılmıř ancak bu parazite rastlanmamıřtır. ocukların birbirini ve sonrasında kpeęi mi, yoksa kpeęin ocukları mı enfekte ettięi net olarak anlařılamasa da *C. canis* yaygın olarak kpeklerde grldę iin, etkenin kpekten ocuklara getięi dřnlmřtir. Dolayısıyla uygun kořullar altında kpeklerden insanlara *C. canis*'in geebileceęi ifade edilmiřtir (Xiao ve ark. 2007).

2.2. *Cryptosporidium*'un Morfolojisi

Cryptosporidium spp. ookisti yuvarlaęa yakın oval řekildedir. Byklkleri trlere gre deęiřmekle birlikte 3.2 μ m ile 8.3 μ m arasında seyreder (Plutzer ve Karanis 2009, Cui ve ark. 2018, Huang ve ark. 2023). Ookistler kalın ve ince cidarlı olarak ikiye ayrılır. Ookistlerin %80'i kalın cidarlı, %20'si ise ince cidarlı olarak řekillenir (Current ve Navin 1986). Kalın cidarlı olanlar sindirim sistemini geerek dıřkıyla dıř ortama atılır. İnce

cidarlı olanlar ise sindirim sisteminde aılarak otoenfeksiyona neden olabilirler (Barlık 2023). Ookist iinde drt adet enfektif sporozoit bulunur. Sporozoitler yaklaşık 5x1 µm boyutunda virgl Őeklinde yapılarıdır ve apikal oluřmaları sayesinde konaęa tutunmayı saęlarlar. Sporozoitlerden sonra oluřan trofozoitler yuvarlak-oval Őekilli olup 2x2.5 µm boyutundadır. Trofozoitler bir geiř ařaması olup bir dięer geliřim Őekli ise merozoitlerdir. Bunlar yuvarlak ya da yarım ay Őeklinde olup 1x5 µm byklęindedir. Merozoitlerin farklılařması sonucu ise makro ve mikrogametosit adı verilen eřey hcreler oluřur. Bunların birleřimi ile de zigot (ookist) meydana gelir (ner 2019).


2.3. *Cryptosporidium*'un Biyolojisi

Cryptosporidium trleri birbirini takip eden eřeysiz ve eřeyli oęalma dngleri ile biyolojisini devam ettirir. Monoksen geliřim gsterdikleri iin yařam dnglerinde herhangi bir ara konak yoktur (Yılmaz 2015).

Parazitin yařam dngs enfektif formdaki kalın duvarlı ookistlerin genellikle fekal oral yolla vcuda alınması sonucunda bařlar (Barlık 2023).

Cryptosporidium ookistlerinin yařam dngs (Őekil 1) (URL-1, modifiye edilerek alınmıřtır) ve geliřim evreleri altı ařamadan oluřur bunlar sırasıyla;

- Ekskistasyon (ookistin aılması) dnemi
- Merogoni (eřeysiz oęalma) dnemi
- Gametogoni (eřeyli oęalma) dnemi
- Fertilizasyon (dllenme) dnemi
- Ookist (ookist oluřumu) dnemi
- Sporogoni dnemi



řekil 1. *Cryptosporidium* spp. ookistinin biyolojik dongüsü

2.4. Cryptosporidiosisin Epidemiyolojisi

Cryptosporidium turlerinin epidemiyolojisini etkileyen onemli faktorler arasında, ookistlerin aside, kloro, fiziksel ve kimyasal ajanlara olduka dayanıklı olmaları, kucuk boyutta olmaları, duřuk enfektif doza sahip olmaları, konak vucudunda sporlanmaları ve dıřkı ile atıldıđı an enfektif olmaları ile zoonotik (*C. parvum*) potansiyelleri sayılabilmektedir (Dillingham ve ark. 2002).

Cryptosporidiosis insanlarda; yetiřkinlerden daha ok, gen ve bađıřıklık sistemi zayıf yařlılarda gorulur. ocuklarda ozellikle beř yařın altındakilerde gerek hijyen konusunda ok

becerikli olmamaları gerekse immun sistemlerinin yeterince kuvvetli olmayıřından dolayı sıklıkla rastlanır (Yılmaz 2015, Cacciò ve Chalmers 2016). Hastalıđın hayvanlarda görölme olasılıđı insanlardakine benzerdir. Konađın direnci, ookistlerin konaktaki yerleřim yerleri gibi bir takım faktörlere bađlı olarak deđiřmesine rađmen genel olarak yařlı hayvanlardan ziyade, bađıřıklık sistemi zayıf genç hayvanlarda görölür (Fayer ve ark. 1999).

Genel olarak cryptosporidiosisin mevsimsel dađılımına bakıldıđında, bol yađıřlı havalarda ookistlerin ime sularına karıřma olasılıklarının artmasından dolayı Türkiye’de özellikle ilkbahar aylarında cryptosporidiosis olgularının arttıđı Eylül-Ekim aylarında ise pik yaptıđı ifade edilmiřtir (Yılmaz 2015, Aynur 2020).

Köpeklerde *Cryptosporidium* spp. ile ilgili epidemiyolojik alıřmalarda, prevalansın cođrafi bölgeye göre deđiřiklik gösterdiđi (Taghipour ve ark. 2020), ancak yař, cinsiyet ya da yařam kořulları (ev ortamı, sokak ortamı) yönünden istatistiki bir deđiřiklik olmadıđı (Huber ve ark. 2005, Mundim ve ark. 2007, Taghipour ve ark. 2020) ifade edilmesine rađmen, cryptosporidiosisin genç köpeklerde (altı aylıktan küçük), yařlı köpeklere göre daha yüksek oranda görölüdüđü (Yoshiuchi ve ark. 2010, Jian ve ark. 2014, Itoh ve ark. 2014) ve dıř ortam ile iliřkisi olan köpeklerin ev ortamındakilere göre (Wang ve ark. 2012, Itoh ve ark. 2014), erkeklerin de diřilere göre (Chukwu ve ark. 2019) daha yüksek oranda enfekte olduđu da belirtilmiřtir. Ayrıca köpeklerde görölün cryptosporidiosisin mevsimle iliřkili olmadıđı rapor edilmiřtir (Tangtrongsup ve ark. 2020).

2.5. Cryptosporidiosisin Patojenitesi

Cryptosporidiosiste patojenite hastalık etkeni olan türün virulansına, konađın almıř olduđu ookist sayısına, konađın genetik yapısı ve immünolojik durumuna bađlı olarak

değişmektedir. Patojen sindirim kanalının her bölgesine yerleşmesine rağmen genel olarak ince bağırsağın alt kısımları ve kolonun üst bölgelerini tercih eder ve en ağır patojeniteyi jejunuma yerleştiği zaman oluşturur. Patolojik bulgulara dair çalışmalar mevcut olsa da etkenin hastalık oluşturma mekanizması (patogenez) henüz anlaşılamamıştır (Yılmaz 2015).

Cryptosporidiosisde görülen diyarenin sebebi tam olarak bilinmese de ince bağırsak epitel hücrelerinin hasarı ya da ölümü, villusların atrofiye olması ve lamina propriada meydana gelen hücresel yangı olabileceği ifade edilmiştir. Bunlar dışında henüz tanımlanmamış bir *Cryptosporidium* toksininin neden olabileceği de ileri sürülen görüşler arasındadır (Barlık 2023, Pardy ve ark. 2024).

Deneyssel olarak immun sistemi baskılanmış yedi haftalık köpeklerde oluşturulan cryptosporidiosis modelinde duodenum ve jejunumda histopatolojik değişiklikler gözlenirken, mide, ileum, sekum ve kolonda herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu değişiklikler duodenum mukoza epitelinin orta ve alt kısımlarında ve jejunum mukoza epitelinin ise üst ve orta kısımlarında daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Patolojik olarak epitelyal metaplazi ve dilatasyon görülmüş, bağırsak mukozal epitel hücrelerinin bütünlüğü ise silia tabakalarının tamamının dökülmesi sonucu belirgin olarak hasar görmüştür (Cui ve ark. 2018).

2.6. Cryptosporidiosisin Klinik Bulguları

Cryptosporidium canis ile enfekte köpekler genelde klinik semptom göstermezler ancak ookist saçılımına devam ederek bir anlamda rezervuar konak görevi görürler. Bazen hastalık ciddi diyare, malabsorbsiyon ve kilo kaybıyla seyredebilir. Diyare genellikle suludur ve mukus, kan, melena içermez ayrıca dışkılamada herhangi bir zorluk görülmez. Semptomlar genellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hayvanlardan rapor edilir.

Cryptosporidiosisli kpeklerde hemogram ve serum biyokimyasal parametreler normaldir ancak diyare var ve ok Őiddetli ise elektrolit kaybı lmlere yansiyabilir (Scorza ve Tangtronsup 2010).

Cryptosporidiosisde klinik bulgu grlp grlmemesi ya da grlse bile Őiddeti konađın bađıŐıklık durumuna bađlıdır. Deneysel olarak kpeklere *Cryptosporidium* spp. ookistleri verildiđinde kontrol ve immunkompetan gruplarda herhangi bir klinik semptom gzlenmezken, immunsupresif grupta tylerde parlaklık kaybı, evreye karŐı ilgisizlik, letarji ve diyare saptanmıŐtır. İlk ookist ıkıŐı inokulum verilmesinden sonraki nc gnde gerekleŐmiŐtir. Ookist atılımı 10. ve 17. gn olmak zere iki kere pik yapmıŐtır (Cui ve ark. 2018).

2.7. Cryptosporidiosisin TeŐhisi

Cryptosporidiosis tanısını mikroskopik yntemler, serolojik yntemler, molekler yntemler, histopatolojik yntemler ve kltr yntemleri olarak alt baŐlıklar halinde incelemek mmkndr. Mikroskopik yntemlerde, boyalı ya da boyasız preparatlarda (teŐhis materyali olarak genellikle dıŐkı kullanılırken bazen balgam ve bronŐiyal aspiratlar da kullanılabilir) ıŐık veya floresan mikroskobu yardımıyla *Cryptosporidium* spp. ookistleri incelenir. Serolojik yntemlerde *Cryptosporidium*'a karŐı oluŐan antikorlar ya da parazite zg antijenlerin varlıđı eŐitli testler aracılıđı ile araŐtırılır. Molekler yntemlerde aralarında bir takım farklılıklar bulunan bazı metotlar ile hastalık etkeninin DNA'sı aranır ve ayrıca tr, genotip gibi bilgilere ulaŐılır. Histopatolojik yntemlerde biyopsi materyali (ođunlukla duodenumdan, bazen de karaciđer, akciđer, safra kesesi gibi organlardan alınan biyopsi rneđi) boyanarak ookist varlıđı ynnden incelenir. Kltrel yntemlerde in vivo ya da in vitro olarak parazit ođaltılır, bu

yöntem teřhisten daha çok bilimsel arařtırmalar, ařı alıřmaları gibi durumlarda tercih edilir.

2.8. Cryptosporidiosisin Tedavisi

Cryptosporidiosis tedavisi üzerine 30 yılı ařkın süredir alıřılmasına ve neredeyse 1000 kemoterapotik ajanın deęerlendirilmesine raęmen bunların hibiri klinik belirtileri tam ve sürekli olarak kontrol altına alamamıř veya enfeksiyonu daimi olarak ortadan kaldıramamıřtır (Scorza ve Tangtrongsup 2010, Cacciò ve Chalmers 2016). Bu durum *Cryptosporidium* türlerinin hastalık oluřtırma mekanizmasının (patogenez) tam anlařılamaması ve *Toxoplasma gondii*, *Eimeria spp.*, *Plasmodium spp.* gibi akrabalarının aksine konak hücre içinde farklı bir yerleřim yeri (parazitofor vakuol) göstermesi ile açıklanabilir (Clark 1999).

Kedi ve köpek gibi pet hayvanlarında cryptosporidiosisite temel hedef ishali durdurmaktır. Bu amaçla destek tedavi olarak sindirilebilirlięi yüksek besinler diyete eklenebilir. řiddetli ishal durumunda parenteral sıvı takviyesi önerilmektedir. Sekonder enfeksiyonları önlemek için antibiyotik verilebilir. Epitelyum oluřumunda rol alan glutamin, bozulan baęırsak yüzey epitelinin onarmak için oral yolla verilebilir. Bunlar dışında kimyasal ajan olarak azitromisin, tylosin ve paromomisin'in tedavi etkinlięi kedi ve köpeklerde denenmiř, optimal tedavi süresi bilinmemekle birlikte (yaklařık bir-iki hafta) ishalde iyileřme gözlendięi bildirilmiřtir. Paromomisin sistemik olarak emildięi, renal toksisite ve ototoksisiteye neden olabildięi bu sebeple asla kanlı ishali olan kedi ve köpeklere verilmemesi gerektięi vurgulanmıřtır. Eęer ilacın uygulandıęı ilk hafta tedaviye yanıt alınmıyor ve toksisite geliřmediyse, ishal ortadan kalksa bile tedaviye bir hafta daha devam edilmesinin faydalı olacaęı ifade edilmiřtir. Nitazoksanid günde 25 mg/kg dozda ve beř gün boyunca uygulandıęında ishalde iyileřme gözlendięi ancak

gastrointestinal kanalı tahriř edici özelliđi ve sıklıkla kusmaya neden olmasından dolayı dikkatle kullanılması gerektiđi bildirilmiřtir (Scorza ve Tangtrongsup 2010). Etkili bir ila ya da ařı bulunana kadar klinisyenlerin uygulayacađı tek yol destekleyici, semptomatik tedavidir (Current ve Navin 1986).

2.9. Cryptosporidiosisin Korunma ve Kontrol Yolları

Kedi ve köpeklere iđ et yerine piřmiř yiyecekler verilebilir. Dıřkı üzerinde gezmiř ve ayaklarına *Cryptosporidium* spp. ookistleri bulařmıř sinek, böcek gibi paratenik konakların kedi-köpek gibi canlılar tarafından mümkün ise yenmelerinin önüne geilmelidir. Mama ve su kaplarının kaynar su ile temizlenmesi faydalı olacaktır. Toplu yařam alanlarında eđer imkan dahilinde ise ishalleri köpekler sađlıklı olan diđer hayvanlardan ayrılmalıdır (Scorza ve Tangtrongsup 2010).

3. SONU

Cryptosporidiosis, özellikle genç ve immunsupresif konaklarda ciddi sađlık sorunlarına yol aabilen, zoonotik potansiyele sahip bir paraziter hastalıktır. Köpeklerde genellikle asemptomatik seyretmesine rađmen, etkeni evreye yayarak insan sađlıđı için potansiyel risk oluřturur. Hastalıđın klinik belirtilerinin konak özelliklerine bađlı olarak deđiřkenlik göstermesi, tanının güçleřmesine ve tedavi seeneklerinin sınırlı olmasına neden olmaktadır. Güncel bulgular, *Cryptosporidium* türlerinin biyolojik döngüsünün, morfolojik özelliklerinin ve epidemiyolojik davranıřlarının anlaşılmasının, hem hayvan hem de insan sađlıđının korunmasında kritik öneme sahip olduđunu göstermektedir. Bu nedenle, etkili koruyucu önlemler, hijyen ve evresel kontrol stratejileri ile destekleyici tedavi yaklařımları, enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve hem insan hem de hayvan sađlıđını güvence altına almak için temel aralar olarak kabul edilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aynur, Z. E. (2020). *Trichomonas vaginalis* ve *Cryptosporidium parvum* parazitlerinde bulunan sistein proteaz genlerinin klonlanması ve rekombinant olarak üretilmesi (Doktora Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın).
- Barlık, F. (2023). *Ağrı yöresinde insan ve buzağılardan elde edilen dışkı örneklerinde Cryptosporidium türlerinin mikroskopi ve moleküler yöntemlerle araştırılması* (Doktora Tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van).
- Cacciò, S. M., & Chalmers, R. (2016). Human cryptosporidiosis in Europe. *Clinical Microbiology and Infection*, 22(6), 471–480.
- Cama, V. A., Bern, C., Sulaiman, I. M., Gilman, R. H., Ticona, E., & et al. (2003). Cryptosporidium species and genotypes in HIV-positive patients in Lima, Peru. *Journal of Eukaryotic Microbiology*, 50, 531–533.
- Chukwu, V. E., Daniels, O. O., Olorunfemi, J. C., & Opara, M. N. (2019). Cryptosporidium oocysts: prevalence in dogs in Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria. *Annals of Parasitology*, 65(4), 321–327.
- Clark, D. P. (1999). New insights into human cryptosporidiosis. *Clinical Microbiology Reviews*, 12, 554–563.
- Cui, Z., Dong, H., Wang, R., Jian, F., Zhang, S., & et al. (2018). A canine model of experimental infection with *Cryptosporidium canis*. *Experimental Parasitology*, 195, 19–23.
- Current, W. L., & Navin, T. R. (1986). *Cryptosporidium*: its biology and potential for environmental transmission.

Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 17(1), 21–51.

- Dillingham, R. A., Lima, A. A., & Guerrant, R. L. (2002). Cryptosporidiosis: epidemiology and impact. *Microbes and Infection*, 4(10), 1059–1066.
- Fayer, R. (2007). Cryptosporidium and Cryptosporidiosis. In *General Biology* (pp. 1–42). CRC Press.
- Fayer, R., Lewis, E. J., Trout, J. M., Graczyk, T. K., Jenkins, M. C., & et al. (1999). Cryptosporidium parvum in oysters from commercial harvesting sites in the Chesapeake Bay. *Emerging Infectious Diseases*, 5(5), 706–710.
- Huber, F., Bomfim, T. C. B., & Gomes, R. S. (2005). Comparison between natural infection by Cryptosporidium sp., Giardia sp. in dogs in two living situations in the West Zone of the municipality of Rio de Janeiro. *Veterinary Parasitology*, 130(1–2), 69–72.
- Huang, J., Chen, M., He, Y., Chen, H., Huang, M., & et al. (2023). Cryptosporidium equi n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae): biological and genetic characterisations. *International Journal for Parasitology*, 53(10), 545–554.
- Itoh, N., Oohashi, Y., Ichikawa-Seki, M., Itagaki, T., Ito, Y., & et al. (2014). Molecular detection and characterization of Cryptosporidium species in household dogs, pet shop puppies, and dogs kept in a school of veterinary nursing in Japan. *Veterinary Parasitology*, 200(3–4), 284–288.
- Jian, F., Qi, M., He, X., Wang, R., Zhang, S., & et al. (2014). Occurrence and molecular characterization of Cryptosporidium in dogs in Henan Province, China. *BMC Veterinary Research*, 10(1), 1–4.

- Lucio-Forster, A., Griffiths, J. K., Cama, V. A., Xiao, L., & Bowman, D. D. (2010). Minimal zoonotic risk of cryptosporidiosis from pet dogs and cats. *Trends in Parasitology*, 26, 174–179.
- Mundim, M. J. S., Rosa, L. A. G., Hortencio, S. M., Faria, E. S. M., Rodrigues, R. M., & et al. (2007). Prevalence of *Giardia duodenalis* and *Cryptosporidium* spp. in dogs from different living conditions in Uberlândia, Brazil. *Veterinary Parasitology*, 144(3–4), 356–359.
- Öner, G. (2019). *Ege bölgesindeki köpeklerde Cryptosporidium spp. 'nin prevalansı* (Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın).
- Pardy, R. D., Wallbank, B. A., Striepen, B., & Hunter, C. A. (2024). Immunity to *Cryptosporidium*: insights into principles of enteric responses to infection. *Nature Reviews Immunology*, 24(2), 142–155.
- Pedraza-Diaz, S., Amar, C., Iversen, A. M., Stanley, P. J., & McLaughlin, J. (2001). Unusual *Cryptosporidium* species recovered from human faeces: first description of *Cryptosporidium felis* and *Cryptosporidium* dog type from patients in England. *Journal of Medical Microbiology*, 50(3), 293–296.
- Plutzer, J., & Karanis, P. (2009). Genetic polymorphism in *Cryptosporidium* species: an update. *Veterinary Parasitology*, 165(3–4), 187–199.
- Pieniazek, N. J., Bornay-Llinares, F. J., Slemenda, S. B., da Silva, A. J., Moura, I. N., & et al. (1999). New *Cryptosporidium* genotypes in HIV-infected persons. *Emerging Infectious Diseases*, 5(3), 444–449.

- Sannella, A. R., Suputtamongkol, Y., Wongsawat, E., & Cacciò, S. M. (2019). A retrospective molecular study of *Cryptosporidium* species and genotypes in HIV-infected patients from Thailand. *Parasites & Vectors*, *12*, 1–6.
- Scorza, A. V., & Tangtrongsup, S. (2010). Update on the diagnosis and management of *Cryptosporidium* spp. infections in dogs and cats. *Topics in Companion Animal Medicine*, *25*(3), 163–169.
- Sevinç, F., & Dik, B. (2015). *Veteriner Protozooloji*. 2. baskı. Medisan Yayınevi.
- Taghipour, A., Olfatifar, M., Bahadory, S., Godfrey, S. S., Abdoli, A., & et al. (2020). The global prevalence of *Cryptosporidium* infection in dogs: a systematic review and meta analysis. *Veterinary Parasitology*, *281*, 109093.
- Tangtrongsup, S., Scorza, A. V., Reif, J. S., Ballweber, L. R., Lappin, M. R., & et al. (2020). Seasonal distributions and other risk factors for *Giardia duodenalis* and *Cryptosporidium* spp. infections in dogs and cats in Chiang Mai, Thailand. *Preventive Veterinary Medicine*, *174*, 104820.
- Tzipori, S., & Campbell, I. (1981). Prevalence of *Cryptosporidium* antibodies in 10 animal species. *Journal of Clinical Microbiology*, *14*, 455–456.
- Wang, A., Ruch-Gallie, R., Scorza, V., Lin, P., & Lappin, M. R. (2012). Prevalence of *Giardia* and *Cryptosporidium* species in dog park attending dogs compared to non-dog park attending dogs in one region of Colorado. *Veterinary Parasitology*, *184*, 335–340.
- Wilson, R. B., Holscher, M. A., & Lyle, S. J. (1983). Cryptosporidiosis in a pup. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, *183*, 1005–1006.

- Xiao, L., Cama, V. A., Cabrera, L., Ortega, Y., Pearson, J., & et al. (2007). Possible transmission of *Cryptosporidium canis* among children and a dog in a household. *Journal of Clinical Microbiology*, 45(6), 2014–2016.
- Yoshiuchi, R., Matsubayashi, M., Kimata, I., Furuya, M., Tani, H., & et al. (2010). Survey and molecular characterization of *Cryptosporidium* and *Giardia* spp. in owned companion animal, dogs and cats, in Japan. *Veterinary Parasitology*, 174, 313–316.
- Yılmaz, A. (2015). *İshalli immünsüpresif ve immünkompetan olgularda makroskopik, serolojik ve moleküler yöntemlerle Cryptosporidium spp.'nin araştırılması* (Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum).
- URL-1. (2024). *Cryptosporidium* spp. ookistlerine ait yaşam döngüsü. Eriřim: https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Life_cycle_of_Cryptosporidium_Credit_Image_courtesy_of_Gino_Barzizza.png (Eriřim tarihi: 08.11.2024).

KÖPEKLERDE ANAPLASMA PLATYS VE EHRlichia CANIS ENFEKSİYONLARI VE İLİŐKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ¹

Fatma Nuray ŐİMŐEK²

1. GİRİŐ

Kene kaynaklı riketsiyal ve protozoal enfeksiyonlar, vektörlerin coğrafi dağılımına baėlı olarak dünyanın birçok yerinde köpekleri etkilemekte ve her yařtan köpekte hastalık oluşturabilmektedir. Bu enfeksiyonlar çoėunlukla subklinik seyretmeleri ve zoonoz özellikte olmaları sebebiyle insan ve hayvan saėlığını tehdit etmektedir (Düzlü ve ark., 2020). *Anaplasma platys* ve *Ehrlichia canis* köpeklere kene yolu ile bulařan önemli parazitlerdir. *Anaplasma platys* trombositleri enfekte ederek tekrarlayıcı trombositopeniye, *E. canis* ise monosit veya makrofajlara yerleřerek monositik ehrlichiosise neden olur. Her ikisinin de *Rhipicephalus sanguineus* ile aktarıldığı göz önüne alındığında, köpekler her iki etkenle eő zamanlı veya ardışık olarak enfekte olabilir (Gaunt ve ark., 2010). *Anaplasma platys* ile enfekte köpekler hafif ile orta derecede klinik belirtiler göstermesine raėmen, özellikle ciddi trombositopeniye yol açabilen *E. canis* gibi diėer patojenlerle eő zamanlı enfeksiyon durumunda oldukça Őiddetli seyredebilmektedir (Piratae ve ark., 2019). Köpeėin yaő, cinsiyet, ırk gibi karakteristik özellikleri yanısıra yařam koőulları, kene enfestasyonu gibi deėiőkenler bu enfeksiyonlar ile iliőkili olası

¹ Bu bölüm yazarın 'Hatay Yöresi Köpeklerinde *Anaplasma platys* ve *Ehrlichia canis* Yaygınlığı' baėlıklı doktora tezinden üretilmiőtir.

² Dr., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Saėlık Bilimler Enstitüsü, Veterinerlik Parazitolojisi A.B.D., ORCID: 0000-0002-2021-3930.

risk faktörleri olarak deęerlendirilmektedir (Selim ve ark., 2021; Aziz ve ark., 2023)

Türkiye coęrafik konumu itibariyle halk saęlığı açısından bölgesel öneme sahip bazı zoonotik hastalıkların epidemiyolojisini etkilemektedir. Son zamanlarda ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden insanlarda bildirilen sporadik *A. platys* ve *E. canis* vakaları toplum saęlığı açısından risk oluşturmaktadır (Düzlü ve ark., 2020).

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Tarihçe

Anaplasma platys ilk olarak 1978'de Florida'da trombositopenik bir köpeğin trombositlerinde bazofilik inklüzyon cisimciklerinin gözlenmesiyle tanımlanmıştır (Harvey ve ark., 1978). *Ehrlichia* cinsine fenotipik benzerlięi nedeniyle önceleri *Ehrlichia platys* olarak tanımlanan bu parazit 2001 yılında yapılan filogenetik çalışmalar sonucu *Anaplasma* soyuna ait olduęu belirlenerek *Anaplasma platys* olarak yeniden adlandırılmıştır (Dumler ve Walker, 2001).

Ehrlichia canis, Donatien ve Lestoquard tarafından 1935'de Cezayir'de ateş ve kansızlık görülen, kenelerle enfeste köpeklerde saptanmıştır (Harrus ve Waner, 2011). Vietnam Savaşı sırasında, 1970'li yıllarda, ABD ordusundaki Alman Çoban köpeklerinin ölümüyle farkına varılan Tropikal köpek pansitopenisi adı verilen hastalık, daha sonra Kanin monositik ehrlichiosis olarak yeniden isimlendirilmiştir (Sainz ve ark., 2015).

2.2. Sınıflandırma

Ehrlichia ve *Anaplasma* soyları *Alphaproteobacteria* sınıfı, *Rickettsiales* takımı, *Anaplasmataceae* familyasında yer

almakta olup filogenetik olarak yakın akrabadır (Battilani ve ark., 2017).

2.3. Bakteriyoloji

Anaplasma platys ve *E. canis*; gram-negatif, kokoid, hareketsiz, zorunlu intraselüler bakterilerdir. Bu bakterilerin ikiye bölünerek çoğalmaları sonucu meydana gelen morula adı verilen büyük inklüzyon cisimcikleri türlere göre farklı hücrelere yerleşirler (Harrus ve ark., 2016).

Anaplasma platys trombositlerde yerleşim gösteren bir mikroorganizmadır. Yuvarlak-oval şekilli, 0.3–1.2 µm çapa sahip olup çift zarla çevrilidir. Kültüre alınmadığı için bakteriyolojik karakterizasyonu ile ilgili bilgiler sınırlı olup trombosit zarlarına nasıl bağlandığı ve nüfus ettiği henüz bilinmemektedir (Harrus ve ark., 2016).

Ehrlichia canis dalgalı ince bir dış zarla çevrili, 1.315.030 nükleotid içeren tek bir dairesel kromozomdan meydana gelen pleomorfik bir bakteridir (Harrus ve Waner, 2011). Makrofajlar, lökositler ve monositler olmak üzere bağışıklık sistemi hücrelerine saldırarak morula adı verilen sitoplazmik zarla çevrili bir bakteri kümesi geliştirir (Harrus ve ark., 2016; Mylonakis ve Theodorou, 2017). Hücre duvarında peptidoglikan ve lipopolisakkarit içermediğinden konağın bağışıklığından kolaylıkla kaçabilir ve hücre vakuollerde hayatta kalma şansını artırır (Alcón-Chino ve De-Simone, 2025).

2.4. Biyoloji

Anaplasma ve *Ehrlichia* soyuna ait türlerin yaşam döngüsü benzer olup mera keneleri ve omurgalılar arasında seyrederek (Gray ve ark. 2013). Bu türlerin bilinen vektörü kahverengi köpek kenesi *R. sanguineus* olup etkenler sıklıkla transtadial olarak taşınmakla birlikte nadiren de intrastadial

olarak bulařmaktadır. (Stich ve ark., 2008; Battilani ve ark., 2017).

2.4.1. Omurgalı Konakta Geliřim

Köpeklere bulařma, enfekte kenelerin kanla beslenmesi ile gerekleřir. Bu esnada kene, *E. canis*'in enfeksiyöz formunun alınmasını ve iletimini kolaylařtıran moleküller ieren tükürük salgılarını konaęa aktarır (Alc3n-Chino ve De-Simone, 2025).

Enfekte bir kene konaktan kan emerken mononükleer hücreler kenenin tutunduęu bölgeye hareket eder. Kenenin tükürük salgısı, konak baęıřıklıęını düzenleyerek hedef hücrelerde enfeksiyonunun geliřmesini destekler. Bakteriler, bu hücrelerin iinde zarla evrili sitoplazmik vakuollerde veya morula olarak bilinen modifiye parazitofor endozomlarda bulunur (Ferrolo ve ark., 2025).

Anaplasmataceae ailesindeki riketsiyal etkenlerin enfektif formlarını temsil eden yoęun ekirdekli hücre, fagozom iinde oęalan retiküler hücrelere (hücre ii enfektif olmayan form) dönüşür. Bu hücreler fagosite edilerek, lizozomların paralayamadıęı vakuoller iinde kalırlar. Böylece morula (vegetatif form) meydana gelir. Daha sonra retiküler hücreler, konak hücre zarının paralanmasıyla veya ekzositozla serbest kalan yoęun ekirdekli hücrelere dönüşürler (enfektif form) ve sitoplazmadan salınarak yeni hücreleri enfekte ederler (Pruneau ve ark., 2014).

2.4.2. Vektör Kenede Geliřim

Rhipicephalus sanguineus üç konaklı kenelerden olup her beslenme ařamasında konaktan kan emer (Dantas-Torres, 2008). Kenelerin enfekte konaktan kan emmeleri esnasında aldıkları etkenler ilk replikasyonu orta baęırsak epitellerinde (vegetatif form), ikinci replikasyonu ise daha sonra gö ettikleri kene tükürük bezi epitellerinde (enfektif form) geçirirler. Saęlıklı bir

omurgalıdan kan emen enfekte kenenin riketsiyal patojenleri konaęa tutunmasını takip eden 3 saat içinde aktarabildięi tespit edilmiřtir (Gray ve ark., 2013).

Vektörler etkenleri transtadial ve nadiren intrastadial olmak üzere iki farklı řekilde aktarırlar. Transtadial nakil řu řekilde gerçekteřir; larva döneminde beslenme ařamasında etkeni alarak geliřtiren kene bir sonraki nimf döneminde, nimf döneminde etkeni alarak geliřtiren kene ise bir sonraki ařama olan ergin döneminde konaęa bulařtırır. Bazı nadir durumlarda ergin erkek kenelerin konak deęiřtirmesine baęlı bulařma da bildirilmiřtir. Bu çeiřit bulařtırmaya intrastadial nakil adı verilmektedir (Bremer ve ark., 2005; Stich ve ark., 2008).

2.5. Epidemiyoloji

Köpeklerde anaplasmosis ve ehrlichiosis küresel öneme sahip olup bu hastalıkların yaygınlıęı, hayvanın yař, cins, yařam kořulları gibi özelliklerinin yanı sıra vektör daęılımı, habitat, kontrol yöntemleri, iklim kořulları gibi epidemiyolojik faktörlere göre deęiřmektedir (Atif ve ark., 2021).

Anaplasma platys Amerika, Afrika, Asya, Orta Doęu, Avrupa, Afrika ve Avustralya dahil olmak üzere geniř bir coęrafi daęılıma sahiptir (De Tommasi ve ark. 2014; Sainz ve ark. 2015). Özellikle Akdeniz havzasının çeiřitli ölkelerinde *A. platys*'in daha virulent suřlarına iliřkin raporlar bulunmaktadır. Yunanistan, Fransa ve İspanya'dan bildirilen *A. platys* suřlarının Kuzey Amerika ve dięer ölkelerdeki suřlardan daha yüksek virülansa sahip olduęu düşünölmektedir (Aguirre ve ark., 2006). Köpekler haricinde kedi, deve, sığır, kızılgeyikte de tespit edilmiřtir (Sainz ve ark., 2015). Özellikle develerin köpeklerdeki *A. platys* ve benzeri suřları önemli ölçüde barındırdıęı, bu etkenin bulařmasındaki epidemiyolojik rolünün belirlenmesi gerektięi vurgulanmaktadır (Atif ve ark., 2021). Zoonotik potansiyele sahip olan *A. platys*'in sınırlı sayıda insan enfeksiyonu raporları

vardır (Arraga-Alvarado ve ark., 2014; Emirođlu ve elebi, 2019; Atif ve ark., 2021).

Ehrlichia canis Avustralya hari her kıtada endemiktir. Evcil kpeklerde, tilkilerde ve akallarda en yaygın tespit edilen patojen olup bu omurgalılar etkenin dođal rezervuarları olarak kabul edilirler (P rez-Macchi ve ark., 2019). Kedilerin lkositlerinde *Ehrlichia* benzeri morulalar ve hem evcil hem de vahři kedilerde *E. canis* antijenine karřı reaktif serum antikorları tespit edilmiřtir ancak bu patojenin kedilerde enfeksiyon potansiyeli henz tam olarak aıklanamamıřtır (Harrus ve ark., 2016). Klinik belirtiler patojenin keneden alınmasından yıllar sonra ortaya ıkması, hastalıđın klinisyenler tarafından ayırıcı tanı listelerine dahil edilmemesi ve hastalıđın kronik dođası nedeniyle dođru cođrafi dađılım belirlenememektedir (Aziz ve ark., 2023).

Anaplasmosis ve ehrlichiosisin grlme sıklıđı, kene aktivitesine bađlıdır. Kene aktivitesi ve poplasyonu ise iklimle iliřkilidir. Kenelerin yumurtlaması 17°C'nin altındaki sıcaklıklarda yavařlayarak nesil sayısının azalmasına neden olur (Costa-J nior ve ark., 2013). *Rhipicephalus sanguineus* tr keneler sıcak mevsimde bol miktarda bulunduđundan akut monositik ehrlichiosis vakalarının ođu bu dönemde ortaya ıkar (Dantas-Torres, 2008). Kpeklerde kronik ehrlichiosis yılın herhangi bir zamanında ortaya ıkabilse de akut form vakaları kene aktivitesinin yksek olduđu ilkbahar ve yaz aylarında daha sık bildirilmektedir (Little, 2017).

2.5.1. Risk faktrleri

Kpeklerde anaplasmosis ve ehrlichiosis ile ilgili risk faktrlerinin anlařılması, kontrol ve koruma nlemlerinin ynetimi ve srdrlmesi iin nemlidir. Kpeđin karakteristik zellikleri, davranıřı, yařam řekli gibi pek ok faktr enfeksiyon ile iliřkili olabileceđi gibi evresel kořullar da hastalıđın ortaya

çıkmasında etkili olabilir. Bu deęişkenler ile enfeksiyon arasındaki iliřki bölgesel ve metodolojik farklılıklar göstermekle birlikte bulgular halk saęlığı açısından ve klinisyenler için tanısal olarak önemlidir.

2.5.1.1. Irk

Kanın monositik ehrlichiosisin ırk duyarlılıęındaki farklılıklar, ırkların yeterli hücresel veya humoral baęıřıklık tepkileri oluřturma yeteneęindeki farklılıklar ile iliřkilendirilmektedir (Harrus ve ark., 1999). Bütün köpek ırklarında görülmekle birlikte Sibiry kurdu ve Alman çoban köpeklerinde klinik belirtiler ve hastalıęın seyri daha řiddetlidir (Aziz ve ark., 2023). Melez ırkların safkan köpeklere kıyasla *E. canis*'e daha yatkın olduęu tespit edilmiřtir (Facile ve ark., 2024). *Anaplasma platys* ile ilgili risk faktörlerinin incelendięi çalıřmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiřtir (Sainz ve ark., 2015; Selim ve ark., 2021) Ayrıca melez ırklarda seroprevalans oranı daha yüksek bulunmuřtur (Acosta-Jamett ve ark., 2020).

2.5.1.2. Yař

Ehrlichia canis ve *A. platys*'in genç köpeklere kıyasla yařlı köpeklerde daha yaygın görüldüęü ifade edilmektedir (Angelou ve ark., 2019). Bu durum köpeklerin yařam boyunca enfeksiyona daha fazla maruz kalması nedeniyle olabileceęi gibi yařlı köpeklerin baęıřıklık sisteminin daha zayıf olması veya enfeksiyon riskini artıran kanser gibi hastalıkların ortaya çıkmasıyla da iliřkili olabilir (Costa-Júnior ve ark., 2013).

2.5.1.3. Cinsiyet

Cinsiyetin *Anaplasma* spp. ve *Ehrlichia* spp. enfeksiyonları için bir risk faktörü olmadıęı, erkek köpeklerin kenelelere daha fazla maruz kalmalarına neden olan davranıřlarıyla iliřkili hafif bir yatkınlık olduęu bildirilmiřtir (Sainz ve ark., 2015; Facile ve ark., 2024).

2.5.1.4. Yařam kořulları

Dıřarıda yařayan ve kenelerin bulunduęu alanlara yakın olan kpeklerin, kapalı alanda yařayan sahipli kpeklere kıyasla, ehrlichiosis'e yakalanma riski daha fazladır. *Ehrlichia* spp.'nin en yaygın patojen olması ve dolayısıyla bulařma olasılıęının dięer kene kaynaklı patojenlere gre muhtemelen daha yksek olması mmkndr (Angelou ve ark., 2019).

Aynı evde birden fazla kpeęin varlıęı *A. platys* ve *E. canis* pozitiflięi ile nemli lde iliřkilendirilmiřtir (Costa-Jnior ve ark., 2013, Angelou ve ark., 2019).

Av kpekleri yabani ve simpatrik hayvan poplasyonlarıyla ortak yařam alanlarını paylařmaları nedeniyle kene kaynaklı bu patojenlerin epidemiyolojisinde nemli bir role sahiptir. Av kpeklerinin tavřan, tilki, yaban domuzu gibi krkl hayvanların avlanması *E. canis* ve *Anaplasma* spp. ile iliřkili bir risk faktr olarak saptanmıřtır (Piantedosi ve ark., 2017). Av kpeklerinin, cinsten ziyade birok risk faktrne maruz kalmaları nedeniyle enfeksiyona yakalanmaya yatkın oldukları dřnlmektedir (Facile ve ark., 2024).

Endemik blgelerde yařayan ve endemik blgelere seyahat eden kpekler enfeksiyonun yayılımı aısından potansiyel adaylar olarak deęerlendirilmektedir (Harrus ve ark., 2016).

2.5.1.5. Veteriner bakımı ve korunma

Yetersiz veteriner bakımı *E. canis* iin bir risk faktr olmakla birlikte bu durum kpeklerin saęlık kontrollerinin ihmalinin daha yksek enfeksiyon riskiyle iliřkili olduęunu gstermektedir (Prez-Macchi ve ark., 2019).

Ektoparazitler ilaların dzenli kullanımını kpeklerde ehrlichiosis ve anaplasmosis riskini dřrmekle birlikte koruma yntemlerinin kullanılmaması risk faktr olarak

deęerlendirilmektedir (Angelou ve ark., 2019; Jeréz-Sulvarán ve ark., 2024). Düzeli antiparaziter kullanılmayan köpekler düzenli olarak tedavi gören hayvanlara kıyasla *Ehrlichia* spp. ve *Anaplasma* spp. seropozitif olma eğilimindedir. Yetersiz ve düzensiz insektisit uygulanan hayvanların kene enfestasyonu olasılıęının daha yüksek olduęu ve bu nedenle ektoparazitlere karşı önlem alınmasının gereklilięi vurgulanmaktadır (Angelou ve ark., 2019).

2.5.1.6. Kene varlıęı

Kene enfestasyonunun *A. platys* ve *E.canis* enfeksiyonu ile iliřkili bir risk faktörü olduęu ifade edilmesinin yanısıra (Piantedosi ve ark., 2017; Acosta-Jamett ve ark., 2020; Selim ve ark., 2021), Pérez-Macchi ve ark. (2019)'na göre kene varlıęı ile enfeksiyon arasında bir iliřki bulunmamaktadır. Bu durum *R. sanguineus*'un enfekte köpekten her kan emdięinde patojeni almadıęı ile açıklanmaktadır (Pérez-Macchi ve ark., 2019).

2.5.1.7. Çevresel faktörler

Vektörlerin gelişimini kolaylařtıran yüksek sıcaklık ve düşük nem gibi çevresel faktörler hastalığın yaygınlığında önemli rol oynamakta, bulařma riskini daha da artırmaktadır (Aziz ve ark. 2023). Breziya'da yüksek sıcaklık ve nem olan bölgelerde *A. platys* hem kuru hem de yaęmurlu mevsimlerde yayılırken, düşük sıcaklık ve nem olan bölgelerde bulařma çoęunlukla kuru mevsimde gerçekteşmektedir (Costa-Junior ve ark., 2013). Benzer şekilde Yunanistan'da yıllık yaęıř miktarı düşük olan kuru bölgelerde yařayan köpeklerdeki *Ehrlichia* sp. seroprevalansı yaęıřlı bölgelerdeki köpeklere kıyasla daha yüksektir. Bu durum *R. sanguineus*'un, dięer kene türlerine kıyasla kuru iklimlere daha iyi adapte olmuş olmasıyla iliřkili olabilir (Angelou ve ark. 2019).

2.5.2. Bulařma

Anaplasma ve *Ehrlichia* soylarındaki etkenler, mera keneleriyle bulařmaktadır. Ixodidae familyasındaki kene turleri kozmopolit olup kırsal ve kentsel eřitli yařam alanlarında grlebilmektedir. Vektrleri *Ixodes*, *Amblyomma*, *Dermacentor* ve *Rhipicephalus* cinsi keneler olmakla birlikte, *Anaplasma platys* ve *E. canis*'in bilinen vektr kahverengi kpek kenesi *R. sanguineus* trdr (Harrus ve ark., 2016). Akut evrede enfekte konaktan beslenen bir kene konaktan ayrıldıktan sonra ortalama beř ay boyunca etkeni bulařtırabilir (Dantas-Torres, 2008, Aziz ve ark., 2023).

Anaplasma platys ve *E. canis*'in gebelik ile vertikal bulařma potansiyeli arařtırılmaktadır (Latrofa ve ark., 2016; Matei ve ark., 2017). Ayrıca *A. platys* ve *E. canis* enfekte kan transfzyonu ile de bulařabilmektedir. zellikle enfekte olmuř kpeklerden alınan kan transfzyonu yoluyla 5 yıla kadar bulařabildięi bildirilmektedir (Little, 2010).

2.6. Patogenez ve klinik bulgular

2.6.1. Kanin monositik ehrlichiosis

Kanin monositik ehrlichiosis, solunum, dolařım, bbrek, karacięer, dalak ve kılcal damarların endoteli gibi birden fazla sistem organını etkileyen multisistemik bir hastalıktır (Mylonakis ve Theodor 2017). 8-20 gnlk bir inkubasyon dneminin ardından akut, subklinik ve kronik formlarda seyreder. Tm kpekler akut belirtileri gsterir, ancak hemorajik belirtiler ile karakterize olan řiddetli kronik form yalnızca bazı hayvanlarda, ateřli dnemden 2-4 ay sonra ortaya ıkar ve oęunlukla lmlle sonulanır (Huxsoll ve ark., 1970). Akut fazda bakterilerin dolařımında ve doku monositleri iinde oęalarak karacięer ve dalaęı da ieren tm lenf sistemine yayılması sonucu splenomegali, hepatomegali ve lenfadenopati meydana gelir (Huxsoll ve ark., 1970). Hastalıęın subklinik fazı, ilk

enfeksiyondan 6-9 hafta sonra gerekleřir. Bu evre klinik veya laboratuvar deęiřikliklerinin olmamasıyla karakterizedir. Etkili bir baęıřıklık yanıtı geliřtirebilen kpekler enfeksiyonu atlatırken geliřtiremeyenlerde kronik evre geliřir (Harrus ve ark., 1999). Bu evrede kemik ilięi aplazisi, septisemi, kanama diyatezi veya Őiddetli kanamaya baęlı lm meydana gelebilir (Mylonakis ve Theodor 2017).

Klinik belirtiler bakterilerin doęrudan hasarından ziyade, konaęın enfeksiyona verdięi inflamatuvar yanıtından kaynaklanmaktadır. Belirtiler hastalęın evrelerine baęlı olarak farklılık gsterir. Hastalık depresyon, uyuřukluk, kilo kaybı, anoreksi, ateř, lenfadenomegali, splenomegali ve kanama eęilimleri ile karakterizedir (Little, 2017) . Bařlıca hematolojik anormallikler arasında trombositopeni olup akut evrede hafif anemi ve hafif lkopeni, subklinik evrede hafif trombositopeni ve Őiddetli kronik evrede pansitopeni meydana gelir. Bařlıca biyokimyasal anormallikler arasında hipoalbminemi, hiperglobulinemi ve hipergamaglobulinemi bulunur (Stich ve ark., 2008).

2.6.2. Enfeksiyz kanin siklik trombositopeni

Anaplasma platys'in patogenezi hakkında bilinenler sınırlıdır. Suřlarındaki coęrafi farklılıklar, patojenite ve klinik belirtilerde eřitlilięe neden olabilir. *Anaplasma platys*'in kuluka dnemi 1-2 haftadır. En karakteristik zellikleri 3-4 gnlk siklik trombositopeni atakları ve ardından 7-21 gn sren asemptomatik dnemlerdir (Little, 2010). Trombositopenin, dalakta trombosit tutulumu, oęalan organizmalar tarafından doęrudan trombositlere verilen hasar ve sonraki trombositopenik ataklarda baęıřıklık aracılı mekanizmalar (antitrombosit antikruları) nedeniyle geliřtięi dřnlmektedir (De Tommasi ve ark., 2014). Eřlik eden bir enfeksiyon olmadıęı durumlarda trombositopeni genellikle kendilięinden dzelmektedir (Sainz ve ark., 2015).

Kanin siklik trombositopeni ve monositik ehrlichiosisin klinik belirtileri olduka benzerdir (Harrus ve ark., 1997). *Anaplasma platys* ile enfekte olmuş kpeklerin oęunluęunda dngsel trombositopeniye raęmen klinik belirti grlmez. Enfeksiyon oęunlukla asemptomatik seyreder. Klinik belirti gsteren vakalarda trombositopeni en yaygın bulgudur. Kpeklerde ateř, uyuřukluk, iřtah azalması, kilo kaybı, mukozada solgunluk, deride ve aęız mukozasında peteřiyal kanamalar, epistaksis, veit, artrit, lenfadenomegali gibi belirtiler grlebilmektedir (Dantas-Torres ve Otranto, 2017). Deneysel alıřmalar, *A. platys* ve *E. canis* ile miks enfeksiyonun daha řiddetli anemi ve trombositopeniye yol atıęını gstermiřtir (Little, 2010).

2.7. Teřhis

Bu hastalıkların kesin tanısı, oęunlukla subklinik seyretmeleri veya spesifik olmayan klinik bulgularla ortaya ıkmaları nedeniyle karmařıktır. Endemik bir blgede yařama veya seyahat etme, daha nce kene maruziyeti, tipik klinik belirtiler ve karakteristik hematolojik ve biyokimyasal anormallikler mevcut olduęunda hastalıktan řüphelenilmelidir (Harrus ve Waner 2011).

Kpeklerde monositik ehrlichiosis ve siklik trombositopenide laboratuvar bulguları deęiřken olup spesifik deęildir. Bununla birlikte en yaygın grlen bulgu trombositopenidir (Harrus ve ark., 2016). Dřk trombosit deęerleri enfeksiyon ile iliřkilendirilmektedir (Piratae ve ark. 2019; Chakraborty ve ark., 2024; Aryal ve ark., 2025). Kanin siklik trombositopeniyi monositik ehrlichiosisten ayıran dngsel trombositopenik ataklardır (Jerz-Sulvarn ve ark., 2024). Ayrıca orta derecede rejeneratif olmayan anemi, hipergamaglobulinemi, hipoalbminemi ve hipokalsemi grlebilir (Harrus ve ark., 2016, Dantas-Torres ve Otranto,

2017). *Ehrlichia canis* enfeksiyonunda akut dönemde hafif anemi, büyük granüler lenfositozla birlikte orta-řiddetli trombositopeni görölmektedir (Little, 2017). Hiperproteinemi, hiperglobulinemi, hipoalbuminemi ve hafif yükselmiş alkalen fosfataz ve alanin aminotransferaz aktiviteleri görölen diđer biyokimyasal anomalilerdir (Mylonakis ve Theodorou, 2017).

Mikroskopik incelemenin duyarlılıđı řiddetli döngüsel trombositopenik nöbetler ve kronik enfeksiyonlar sırasında görölen düşük parazitemi seviyeleri sebebiyle düşüktür (Harrus ve ark., 2016). Bu yöntemde Giemsa, Diff-quick, Wright's gibi Romanovsky boyaları ile boyanmış kan yaymaları enfekte trombositler ve monositler içindeki koyu mavi-mor renkli morulalar yönünden incelenir (Harrus ve ark., 2016). Kan yaymalarında morululaların saptanması oldukça nadir olup vakaların yalnızca %4-6'sında tespit edilmektedir (Sainz ve ark., 2015). Buffy coat tabakasından yapılan preparatların incelemesiyle başarı oranı artırılabilir (Aziz ve ark., 2023).

Serolojik testler enfeksiyonun ileriki aşamalarında daha etkilidir. Çünkü patojenlere karşı üretilen antikorların enfeksiyondan sonra tespit edilebilir hale gelmesi birkaç hafta sürebilir (Facile ve ark., 2024). IFAT (Immunofluorescence antibody test) ile son antikor titresini, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) ile optik yoğunluđu belirlemek mümkündür (Sainz ve ark., 2015). Ayrıca serum örneklerinde spesifik antikorları tespit etmek için ELISA tabanlı hızlı tanı testleri mevcuttur (Facile ve ark., 2024). IFAT, konakta *E. canis*'e karşı oluşmuş IgG antikorlarının saptanmasında altın standart olarak kabul edilir. Ancak diđer *Ehrlichia* türlerinin endemik olduđu yerlerde çapraz reaksiyon tanıyı zorlařtırabilir (Harrus ve ark., 2016). *Anaplasma platys* için geliřtirilen IFAT'ın kullanılabilirliđi, antijen substratının olmaması nedeniyle sınırlıdır. Ayrıca *A. phagocytophilum* ile çapraz reaksiyon göstermektedir (Harrus ve ark., 2016). Ticari olarak satılan çeřitli

hızlı tanı testleri mevcuttur. Bu hızlı tanı testlerindeki *E. canis* analiti, bazı *E. chaffeensis* suşlarına, *A. phagocytophilum* analiti ise *A. platys* türüne karşı oluşturulan antikorlarla da reaksiyona girer (Harrus ve Waner, 2011).

Anaplasmosise ve ehrlichiosise sebep olan etkenlerin tespit edilmesinde Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) temelli testler sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek hassasiyete sahip olan bu yöntemle aktif olarak devam eden enfeksiyonu değerlendirmek mümkündür (Sainz ve ark., 2015). *Anaplasma platys* teşhisinde *gltA*, 16s rDNA, 16s sRNA *groEL*, *cs*, majör yüzey proteinleri ve 23S rDNA gen bölgeleri hedeflenir. *Ehrlichia canis* için hedeflenen gen bölgeleri (16S rRNA, p28, p30, *dsb*, *VirB9*, *trp 36*) oldukça çeşitli olup en yaygın olarak 16S rRNA ve p30 gen bölgeleri hedeflenmektedir (Harrus ve Waner, 2011; Atif ve ark. 2021).

Anaplasma platys izole edilemediği için hücre kültürü mümkün olmamaktadır. *Ehrlichia canis*, köpek makrofaj ve kene hücre hatlarında kültür edilmiş olsa da (Ferroloho ve ark., 2016) uzun zaman alması, pahalı ekipman ve eğitimli personel gerektirmesi sebebiyle bu prosedür rutin tespit için kullanılmaz. Ancak özel araştırma laboratuvarlarında tercih edilmektedir (Harrus ve ark., 2016).

2.8. Tedavi ve kontrol

Doksisiklin köpeklerde anaplasmosis ve ehrlichiosis tedavisinde ortak olarak kullanılmaktadır. Güncel bilimsel literatür, doksisiklin (birinci basamak tedavi), minosiklin ve rifampisin (ikinci basamak tedavi) olmak üzere yalnızca üç ajanın etkinliğini desteklemektedir (Mylonakis ve ark., 2019). Akut vakaların çoğu tedaviye yanıt vererek 24-72 saat içinde klinik iyileşme gösterir. Tedaviden sonra, *E. canis* antikor titreleri aylar veya yıllar boyunca devam edebilir. Ancak bu antikorlar yeni bir enfeksiyona karşı koruma sağlamaz. Köpekler tamamen

iyileřtikten sonra bile yeniden enfeksiyona karřı duyarlıdır (Harrus ve ark. 2016; Atif ve ark. 2021).

řiddetli veya kronik vakalarda kan transfüzyonu, sıvı tedavisi, ateř düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar gibi destekleyici tedaviler uygulanabilir (Little, 2010; Mylonakis ve ark. 2019).

Ehrlichiosis ve anaplasmosis ile mücadelede en etkili yöntem kene kontrolüdür. Köpeklerin yaşam alanları kenelerin barınamayacağı şekilde düzenlenmelidir. Kene varlığından şüphelenilen alanlara veya endemik bölgelere seyahat planı iyi yönetilmelidir. (Harrus ve ark. 2016). *Rhipicephalus sanguineus* çoğunlukla iç mekanlarda bulunur ancak kenenin diđer popülasyonları Akdeniz bölgesinde bahçelerde, meralarda ve tarlalarda yaygın olabilir. Bunun için düzenli aralıklarla akarisit ürünlerin uygulanması ve kenelerin günlük olarak dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi ve çıkarılması önerilmektedir. Avrupa'da köpeklere reçete edilebilen çeşitli insektisitler (piretroidler veya diazinonun bazı preparatları) kene mücadelesinde kullanılmaktadır (Sainz ve ark., 2015). Ürüne bađlı olarak bir ay veya daha fazla kalıcı etkinliğe sahip sprey, spot-on veya tasma formülasyonları mevcuttur (Sykes and Foley, 2013). Ancak, hayvan sahipleri bu ilaçlara karřı direnç gelişimi konusunda eğitilmeli ve farklı akarisitlerin alternatif kullanımı teşvik edilmelidir (Aziz ve ark., 2023).

Kene ařıları kimyasal kontrole kıyasla uygun maliyetli ve çevreyle uyumludur. Risk altında veya rezervuar olan hayvan ve insanların ařılanması kene kaynaklı patojenin dağılımını sınırlamak için önemlidir. Subolesin içerikli ařılar erkek kenelerde kısırılıđa ve sindirim sisteminin dejenerasyonuna yol açarak enfeksiyona karřı koruyucu etki sađlar (Atif ve ark., 2021).

Ehrlichia canis veya *A. platys* enfeksiyonlarına karřı aşı geliřtirmede umut verici stratejiler ortaya konmaktadır. *Anaplasma platys*'in tüm genom dizilenmesi tamamlanmış olup

ařı üretimi için potansiyel aday olabilecek birçok yeni genin keřfedilebileceęi düşünölmektedir (Atif ve ark., 2021). Bařka bir alıřmada ise farede hem humoral hem de hücre aracılı baęıřıklık yanıtlarını manipöle ederek *E. canis*'i ortadan kaldırabilen rGP19'a dair kanıtlar sunulmaktadır (Nambooppha ve ark., 2022).

3. SONU

Köresel iklim deęiřiklięi, řehirleřme, hayvan hareketlerinin artması kene ile bulařan bu parazitlerin coęrafi ve epidemiyolojik daęılımlarını hızla deęiřtirmektedir. Bu nedenle bu hastalıkların meydana gelmesinde etkili olan mekanizmaların anlaşılması, koruma ve kontrol stratejilerinin iyileřtirilmesi oldukça önemlidir.

Köpeklerde *A. platys* ve *E. canis*'in teřhisi, genellikle subklinik seyretmeleri ve spesifik olmayan klinik belirtileri nedeniyle zordur. Teřhiste laboratuvar bulguları ile eř zamanlı olarak mikroskobik veya serolojik yöntemler kullanılsa da kesin tanı için moleköler analizler gereklidir. Trombositopenik köpekler enfeksiyon yönünden deęerlendirilmelidir. Enfeksiyon ile iliřkili risk faktörleri klinisyenler ve toplum saęlığı uzmanları tarafından dikkate alınmalıdır.

İnsanlarda bildirilen sporadik vakalar sebebiyle bu etklenlerin zoonotik potansiyeli göz ardı edilmemelidir. İnsanlarla yakın iliřki içerisinde olan köpekler, kene kaynaklı bu patojenler için aynı zamanda rezervuar konumundadır. Özellikle bařboř köpeklerin bakım, barınma ve beslenme kořullarının olmaması onları enfeksiyona açık hale getirmektedir. Enfeksiyonu asemptomatik olarak taşıyan hayvanlar toplum saęlığı açısından risk oluřturmaktadır. Bu nedenle sahipsiz hayvanların kořullarının iyileřtirilmesi, kontrol ve koruma programlarının uygulanması elzemdir. Ayrıca köpek sahiplerinin

kene muayenesi ve dzenli veteriner kontrol konularında farkındalık geliřtirmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Acosta-Jamett, G., Weitzel, T., López, J., Alvarado, D., & Abarca, K. (2020). Prevalence and Risk Factors of Antibodies to *Anaplasma* spp. in Chile: A Household-Based Cross-Sectional Study in Healthy Adults and Domestic Dogs. *Vector-Borne and Zoonotic Diseases*, 20(8), 572-579.
- Aguirre, E., Tesouro, M. A., Ruiz, L., Amusatogui, I., & Sainz, A. (2006). Genetic characterization of *Anaplasma* (*Ehrlichia*) *platys* in dogs in Spain. *J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health*, 53(4), 197-200.
- Alcón-Chino, M., & De-Simone, S. G. (2025). Understanding the Diagnosing of Canine Ehrlichiosis: A Comprehensive Review. In S. G. De-Simone & G. C. Lechuga (Eds.), *Exploring the World of Parasites*. London: IntechOpen.
- Angelou, A., Gelasakis, A. I., Verde, N., Pantchev, N., Schaper, R., Chandrashekar, R., & Papadopoulos, E. (2019). Prevalence and risk factors for selected canine vector-borne diseases in Greece. *Parasites & Vectors*, 12(1), 283.
- Arraga-Alvarado, C. M., Qurollo, B. A., Parra, O. C., Berrueta, M. A., Hegarty, B. C., & Breitschwerdt, E. B. (2014). Case report: Molecular evidence of *Anaplasma platys* infection in two women from Venezuela. *Am J Trop Med Hyg*, 91(6), 1161-1165.
- Aryal, S., Bhattarai R. K., Thapa K. (2025). Comprehensive study of ticks and tick-borne diseases in dogs in Nepal: Molecular identification, risk analysis and hematological alterations. *BMC Veterinary Research*, 21(1), 309.
- Atif, F. A., Mehnaz, S., Qamar, M. F., Roheen, T., Sajid, M. S., Ehtisham-ul-Haque, ve ark. (2021). Epidemiology, Diagnosis, and Control of Canine Infectious Cyclic

Thrombocytopenia and Granulocytic Anaplasmosis: Emerging Diseases of Veterinary and Public Health Significance. *Veterinary Sciences*, 8(12), 312.

Aziz, M. U., Hussain, S., Song, B., Ghauri, H. N., Zeb, J., & Sparagano, O. A. (2023). Ehrlichiosis in Dogs: A Comprehensive Review about the Pathogen and Its Vectors with Emphasis on South and East Asian Countries. *Vet Sci*, 10(1).

Battilani, M., De Arcangeli, S., Balboni, A., & Dondi, F. (2017). Genetic diversity and molecular epidemiology of Anaplasma. *Infect Genet Evol*, 49, 195-211.

Bremer, W. G., Schaefer, J. J., Wagner, E. R., Ewing, S. A., Rikihisa, Y., Needham, G. R., ve ark. (2005). Transstadial and intrastadial experimental transmission of Ehrlichia canis by male Rhipicephalus sanguineus. *Vet Parasitol*, 131(1-2), 95-105.

Chakraborty A., Rath P.K., Panda S.K., Mishra B.P., Dehuri M., ve ark. (2024). Molecular Confirmation, Epidemiology, and Pathophysiology of Ehrlichia canis Prevalence in Eastern India. *Pathogens* 13(9), 803.

Costa-Júnior, L. M., Rembeck, K., Passos, L. M. F., & Ribeiro, M. F. B. (2013). Factors associated with epidemiology of Anaplasma platys in dogs in rural and urban areas of Minas Gerais State, Brazil. *Preventive Veterinary Medicine*, 109(3), 321-326.

Dantas-Torres, F. (2008). The brown dog tick, Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) (Acari: Ixodidae): from taxonomy to control. *Vet Parasitol*, 152(3-4), 173-185.

Dantas-Torres, F., & Otranto, D. (2017). Anaplasmosis. In M. C. B. (Ed.), *Arthropod Borne Diseases* (pp. 215-222). Brazil: Springer.

- De Tommasi, A. S., Baneth, G., Breitschwerdt, E. B., Stanneck, D., Dantas-Torres, F., Otranto, D., & de Caprariis, D. (2014). Anaplasma platys in bone marrow megakaryocytes of young dogs. *J Clin Microbiol*, 52(6), 2231-2234.
- Dumler, J. S., & Walker, D. H. (2001). Tick-borne ehrlichioses. *The Lancet Infectious Diseases*, 1, 21-28.
- Düzlü, Ö., İnci, A., Yıldırım, A., Doğanay, M., Özbel, Y., & Aksoy, S. (2020). Vector-borne Zoonotic Diseases in Turkey: Rising Threats on Public Health. *Turkiye Parazitol Derg*, 44(3), 168-175.
- Emirođlu, M., & Çelebi, B. (2019). First report of human ehrlichiosis in Turkey. *Turk J Pediatr*, 61(2), 267-270.
- Facile, V., Sabetti, M. C., Balboni, A., Urbani, L., Tirolo, A., Magliocca, M., ve ark. (2024). Detection of Anaplasma spp. and Ehrlichia spp. in dogs from a veterinary teaching hospital in Italy: a retrospective study 2012-2020. *Vet Res Commun*, 48(3), 1727-1740.
- Ferrolho, J., Antunes, S., Vilhena, H., Anastácio, S., Ramalho de Sousa, S., Frouco, G., ve ark. (2025). The Complexities of Canine Monocytic Ehrlichiosis: Insights into Ehrlichia canis and Its Vector Rhipicephalus sanguineus. *Microbiology Research*, 16(4), 85.
- Gaunt, S., Beall, M., Stillman, B., Lorentzen, L., Diniz, P., Chandrashekar, R., & Breitschwerdt, E. (2010). Experimental infection and co-infection of dogs with Anaplasma platys and Ehrlichia canis: hematologic, serologic and molecular findings. *Parasit Vectors*, 3(1), 33.
- Gray, J., Dantas-Torres, F., Estrada-Peña, A., & Levin, M. (2013). Systematics and ecology of the brown dog tick,

- Rhipicephalus sanguineus. *Ticks Tick Borne Dis*, 4(3), 171-180.
- Harrus, S., Aroch, I., Lavy, E., & Bark, H. (1997). Clinical manifestations of infectious canine cyclic thrombocytopenia. *Vet Rec*, 141(10), 247-250.
- Harrus, S., & Waner, T. (2011). Diagnosis of canine monocytotropic ehrlichiosis (*Ehrlichia canis*): an overview. *Vet J*, 187(3), 292-296.
- Harrus, S., Waner, T., & A., B. (2016). Ehrlichiosis and Anaplasmosis. In M. J. Day (Ed.), *Arthropod-borne Infectious Diseases of the Dog and Cat* (pp. 167-188): CRC Press.
- Harrus, S., Waner, T., Bark, H., Jongejan, F., & Cornelissen, A. W. (1999). Recent advances in determining the pathogenesis of canine monocytic ehrlichiosis. *J Clin Microbiol*, 37(9), 2745-2749.
- Harvey, J. W., Simpson, C. F., & Gaskin, J. M. (1978). Cyclic Thrombocytopenia Induced by a Rickettsia-Like Agent in Dogs. *The Journal of Infectious Diseases*, 137(2), 182-188.
- Huxsoll, D. L., Hildebrandt, P. K., Nims, R. M., & Walker, J. S. (1970). Tropical canine pancytopenia. *J Am Vet Med Assoc*, 157(11), 1627-1632.
- Jeréz-Sulvarán, I. A., Martínez-Herrera, D. I., Vivanco-Cid, H., Villagómez-Cortés, J. A., Contreras-López, H. A., Muñoz-Muñoz, L. A., ve ark. (2024). Frequency of *Anaplasma platys* in dogs from the municipality of Veracruz, Mexico. *Vet Res Forum*, 15(12), 697-700.
- Latrofa, M. S., Dantas-Torres, F., de Caprariis, D., Cantacessi, C., Capelli, G., Lia, R. P., ve ark. (2016). Vertical transmission of *Anaplasma platys* and *Leishmania*

- infantum in dogs during the first half of gestation. *Parasit Vectors*, 9(1), 269.
- Little, S. E. (2010). Ehrlichiosis and anaplasmosis in dogs and cats. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*, 40(6), 1121-1140.
- Little, S. E. (2017). Ehrlichiosis. In M. C. B. (Ed.), *Arthropod Borne Diseases* (pp. 205-214). Brazil: Springer.
- Matei, I. A., Stuen, S., Modrý, D., Degan, A., D'Amico, G., & Mihalca, A. D. (2017). Neonatal Anaplasma platys infection in puppies: Further evidence for possible vertical transmission. *Vet J*, 219, 40-41.
- Mylonakis, M. E., & Theodorou, K. N. (2017). Canine Monocytic Ehrlichiosis: An Update on Diagnosis and Treatment. *Acta Veterinaria*, 67(3), 299-317.
- Namboopha, B., Rittipornlertrak, A., Muenthaisong, A., Koonyosying, P., Chomjit, P., Sangkakam, K., ve ark. (2022). Recombinant Ehrlichia canis GP19 Protein as a Promising Vaccine Prototype Providing a Protective Immune Response in a Mouse Model. *Veterinary Sciences*, 9(8), 386.
- Pérez-Macchi, S., Pedrozo, R., Bittencourt, P., & Müller, A. (2019). Prevalence, molecular characterization and risk factor analysis of Ehrlichia canis and Anaplasma platys in domestic dogs from Paraguay. *Comp Immunol Microbiol Infect Dis*, 62, 31-39.
- Piantedosi, D., Neola, B., D'Alessio, N., Di Prisco, F., Santoro, M., Pacifico, L., ve ark. (2017). Seroprevalence and risk factors associated with Ehrlichia canis, Anaplasma spp., Borrelia burgdorferi sensu lato, and D. immitis in hunting dogs from southern Italy. *Parasitol Res*, 116(10), 2651-2660.

- Piratae, S., Senawong, P., Chalermchat, P., Harnarsa, W., & Sae-Chue, B. (2019). Molecular evidence of Ehrlichia canis and Anaplasma platys and the association of infections with hematological responses in naturally infected dogs in Kalasin, Thailand. *Vet World*, 12(1), 131-135.
- Pruneau, L., Moumène, A., Meyer, D. F., Marcelino, I., Lefrançois, T., & Vachiéry, N. (2014). Understanding Anaplasmataceae pathogenesis using “Omics” approaches. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, Volume 4 - 2014.
- Sainz, Á., Roura, X., Miró, G., Estrada-Peña, A., Kohn, B., Harrus, S., & Solano-Gallego, L. (2015). Guideline for veterinary practitioners on canine ehrlichiosis and anaplasmosis in Europe. *Parasites & Vectors*, 8(1), 75.
- Selim, A., Almohammed, H., Abdelhady, A., Alouffi, A., & Alshammari, F. A. (2021). Molecular detection and risk factors for Anaplasma platys infection in dogs from Egypt. *Parasit Vectors*, 14(1), 429.
- Stich, R. W., Schaefer, J. J., Bremer, W. G., Needham, G. R., & Jittapalapong, S. (2008). Host surveys, ixodid tick biology and transmission scenarios as related to the tick-borne pathogen, Ehrlichia canis. *Vet Parasitol*, 158(4), 256-273.

VETERİNER PARAZİTOLOJİSİ ALANINDA BİLİMSEL
ARAŞTIRMALAR

yaz
yayınları

YAZ Yayınları
M.İhtisas OSB Mah. 4A Cad. No:3/3
İscehisar / AFYONKARAHİSAR
Tel : (0 531) 880 92 99
yazyayinlari@gmail.com • www.yazyayinlari.com