

Broncoxil®

Acéphylline pipérazine + Diphénhydramine

Broncoxil®

Acéphylline pipérazine + Diphénhydramine

FORME ET PRESENTATION : Broncoxil- Sirop. Flacon de verre de 120 ml, couleur ambrée.

COMPOSITION: Chaque 5 ml de Broncoxil sirop contient : Acéphylline pipérazine 45 mg, Diphénhydramine hydrochloride 8 mg. Excipient qsp 5 ml: Sucrose 3g, glycérine pure 0,05 ml, benzoate de sodium 20 mg, citrate de sodium 1 mg, méthylparaben 3 mg, acide citrique (monohydrate) 2,3 mg, aspartame 1,5 mg, saccharinate de sodium 2,75 mg, propylbaraben 1 mg, arôme Tutifruiti 0,008 ml, colorant vert pomme 0,5mg, eau neutre qsp 5 ml.

PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : L'acéphylline est un dérivé de la théophylline à effet bronchodilatateur. La diphénhydramine est un antihistaminique H1, de structure éthanolamine, qui se caractérise par un effet sédatif et anticholinergique (effets antisécrétoire et décongestionnant au niveau des muqueuses nasale et bronchique). Broncoxil- est efficace sur les symptômes du rhume tels que : obstruction nasale, rhinorrhée, blocage sinusien, larmoiement, congestion du conduit auditif. Broncoxil- élimine le bronchospasme et lève l'obstruction bronchique pour une bonne ventilation pulmonaire.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES : - Toux associée aux bronchopneumopathies de formes spastiques. - Toux productive ou grasse. - Troubles respiratoires associés à une hypersécrétion muqueuse (asthme, bronchite chronique, emphysème, bronchectasie). - Toux et rhume associés à une congestion des muqueuses nasale et bronchique.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : Se conformer à la prescription du médecin. La dose journalière doit être fractionnée en 3 ou 4 prises. Poursuivre le traitement jusqu'à la disparition des symptômes. La posologie usuelle est représentée dans le tableau suivant :

Age	Nbre de cuill.café/prise	Nbre de prises/jour
Adultes	1 à 2	3 à 4
Enfants	1/2 à 1	3 à 4
Nourrissons (4-12 mois)	1/4	3

CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la théophylline et aux antihistaminiques.

PRECAUTION D'EMPLOI : Pas d'effets secondaires graves à la posologie recommandée. Utiliser avec précaution en cas de : insuffisance cardiaque, insuffisance coronarienne, glaucome par fermeture de l'angle, constipation chronique, hypertrophie prostatique. Broncoxil- ne doit être utilisé chez la femme enceinte qu'en cas de nécessité absolue.

INTERACTION : Aucune interaction médicamenteuse cliniquement significative n'a été rapportée à ce jour. La prise d'alcool ou d'antidépresseurs (hypnotiques, sédatifs, tranquillisants, etc) peut majorer l'effet du Broncoxil-. Les inhibiteurs de la MAO peuvent prolonger voire augmenter l'effet anticholinergique (sécheresse des muqueuses) des antihistaminiques.

SURDOSAGE : Des symptômes toxiques à type de convulsions, troubles du rythme, troubles de la conscience.

EFFETS INDESIRABLES : La somnolence est l'effet secondaire le plus courant, commun aux antihistaminiques.

INSTRUCTIONS : Conserver à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants.

EXPLOITANT DE L'AMM : Odypharm Ltd. The Quadrant. 118, London Road, Kingston (UK).

Fabricant : Nabilqasim Industries (Pvt) Ltd. 17/24, Korangi Industrial Area, Karachi - Pakistan.



Sinaps

Traitement
symptomatique
de la **TOUX**



Broncoxil®

Acéphylline pipérazine + Diphénhydramine

Broncoxil®

Acéphylline pipérazine + Diphénhydramine

Synergie d'actions complémentaires

Acéphylline pipérazine

BRONCHO-DILATATEUR

+

Diphénhydramine

ANTICOLINERGIQUE SÉDATIF

- Relaxation des muscles respiratoires
- Maintien du flux respiratoire
- Prévention des crises

- Décongestion des muqueuses nasales et bronchiques
- Diminution des manifestations allergiques
- Diminution de la fréquence des épisodes nocturnes

... pour une efficacité durable sur les symptômes

Broncoxil®
élimine
le bronchospasme et
lève
l'obstruction bronchique pour
rétablir
une bonne ventilation pulmonaire.

Pour traiter rapidement les symptômes de la toux et éviter les risques de complications

(fatigue, troubles du sommeil, dysphagie, surinfection bronchique, hernies)

POSOLOGIE

	Nb cuill.café par prise	Nb de prises par jour
Adultes	1 à 2	3 à 4
Enfants	1/2 à 1	3 à 4
Nourrissons (4-12 mois)	1/4	3

La dose journalière doit être fractionnée en 3 ou 4 prises.
Poursuivre le traitement jusqu'à la disparition des symptômes

Ne contient pas d'agent mucolytique

Pas de risque d'aggravation de l'encombrement respiratoire ou d'aggravation de bronchiolite chez le nourrisson.

