



CONTRE-INDICATIONS : Femme enceinte de plus de 5 mois, antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise d'ibuprofène ou d'AINS tel que l'aspirine, ulcère gastroduodénal en évolution, insuffisance hépatocellulaire sévère, insuffisance rénale sévère, insuffisance cardiaque sévère non contrôlée. **MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS** AINS. À utiliser avec précaution chez le patient hypertendu. **INTERACTIONS :** Association déconseillée avec autres AINS, anticoagulants oraux, héparine à haute dose, ciclosporine, triméthoprime, diurétiques hypokaliémisants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, inhibiteurs de l'angiotensine II. **SURDOSAGE :** De rares cas de surdosage ont été rapportés, et se manifestent par des nausées, vomissements, gastroalgies, troubles du transit, ulcérations digestives. -Réactions d'hypersensibilité : éruptions, rash, prurit, parfois crise d'asthme chez le sujet allergique aux AINS. -Effets sur le système nerveux central : exceptionnellement des vertiges et des maux de tête. **INSTRUCTIONS :** Conserver en dessous de 30°C, à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants. **EXPLOITANT DE L'AMM :** Odipharma PVT Ltd, 01/04, Pragati Soc, Sahakar Nagar, Nagpur, MS 440025 - INDIA.

Suspension : Enfant (6 mois à 12 ans ou ≤ 40 kg)	1 comprimé (400 mg)	Affections douloureuses et/ou états fébriles
	3 fois/jour	Règles douloureuses (Dysménorrhée)
	1 comprimé (400 mg)	Indications rhumatoïdes
	3 fois/jour	-Traitement d'attaque
	2 comprimés 3 fois/jour	-Traitement d'entretien
	1 comprimé 3 à 4 fois/j	

PRESENTATIONS : - Bufaligan, comprimé : Boîte de 30 comprimés sous blister. - Bufaligan, poudre pour Suspension buvable : flacon de 100 ml. **COMPOSITION :** - Bufaligan, comprimé : Chaque comprimé contient 400 mg d'ibuprofène. Excipients : Amidon de maïs, stéarate de magnésium, gel de silice, Hydroxypropyl cellulose. - Bufaligan, poudre pour Suspension buvable : Chaque 5 ml contient 100 mg d'ibuprofène. Excipients : Sucrose, saccharinate de sodium, silice, gomme xanthane, arôme orange. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :** L'ibuprofène est un anti-inflammatoire non stéroïdien appartenant au groupe des proproniques. Il possède les propriétés suivantes : antialgique, anti-inflammatoire, diminue la synthèse des prostaglandines. **INDICATIONS THERAPEUTIQUES :** Traitement des affections douloureuses et des états fébriles. Traitement symptomatique de l'arthrite juvénile, de l'arthrite rhumatoïde, et de toutes autres douleurs articulaires ou musculéo-squelettiques (entorse, tendinite, torticolis...) ; douleurs dentaires, règles douloureuses. **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :** Bufaligan, comprimé 400 mg : Adulte : Ne pas dépasser 3 comprimés par jour (soit 1200 mg/jour) sauf en traitement d'attaque dans les indications rhumatoïdes où la posologie peut monter jusqu'à 6 comprimés par jour (2400 mg/j). Bufaligan suspension buvable 100 mg/5 ml : Nourrison enfant de 6 mois à 12 ans (jusqu'à 40 kg) : Ne pas dépasser 30 mg/kg/jour, Bien agiter le flacon avant usage.



Suspension buvable 100 mg/5 ml
Comprimé 400 mg

Bufaligan®

Ibuprofène

Bufaligan®

Ibuprofène

Plus FORT
sur la Douleur
et la Fièvre




Bufalgan®

Ibuprofène


Plus FORT sur la Douleur et la Fièvre

Une meilleure efficacité sur la fièvre par rapport au paracétamol



Efficacité et tolérance de l'ibuprofène sirop versus paracétamol sirop sur la fièvre associée à une infection traitée par antibiothérapie, chez l'enfant. (n= 154 patients âgés de 6 mois à 5 ans).
Autret E. et al. Eur J Clin Pharmacol. 1994; 46 (3): 197-201.

Une diminution de la douleur plus importante par rapport au paracétamol et à la codéine



Diminution de la douleur musculo-squelettique post-traumatique chez l'enfant : Essai randomisé contrôlé comparant l'ibuprofène au paracétamol et à la codéine. (patients âgés de 6 à 17 ans).
Clark E. and al. Pediatrics. 2007 Mar; 119 (3): 460-7.

Bufalgan®

Ibuprofène

Posologie simple

	Comprimé 400 mg Adulte et enfant de plus de 15 ans			Sirop 100 mg/5 ml Enfant de 6 mois à 12 ans (≤40 kg)		
	matin	midi	soir	matin	midi	soir
Affections douloureuses et/ou états fébriles*	●	●	●	20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises		
Règles douloureuses (Dysménorrhées)*	●	●	●			
Indications rhumatoïdes* -Traitement d'attaque	●●	●●	●●	30 à 40 mg/kg/jour en 4 prises		
-Traitement d'entretien	●	●	●			

*Dose maximale journalière à ne pas dépasser

