



OXAPEN®

Oxacilline

- OXAPEN® comprimés : Boîte de 12 comprimés enrobés, sous blister. - OXAPEN® poudre pour sirop à 250 mg/5 ml : flacon de 60 ml de sirop reconstitué, soit 12 doses de 5 ml. Flacon gradué, bouchon-dosier. - OXAPEN® poudre et solvant pour usage parentéral I.V. à 1 g : Flacon + ampoule de 5 ml de solvant. **COMPOSITION** : - par comprimé : Oxacilline(DCI) sel de sodium, exprimé en oxacilline 500 mg. Excipients : stéarate de magnésium, carboxyméthyl amidon sodique, amidon, cellulose microcristalline. - Poudre pour sirop à 250 mg/5 ml : Oxacilline (DCI) sel de sodium, exprimé en oxacilline base 250 mg, soit 3g par flacon de 60 ml. Excipients : Saccharine sodique, citrate de sodium, benzoate de sodium, polyvidone, carboxyméthylcellulose, EDTA. - Poudre pour usage parentéral : - par flacon : Oxacilline (DCI) sel de sodium, exprimé en oxacilline : 1 g. Teneur en sodium : 64 à 71 mg (2,8 à 3,1 mmol) par gramme d'oxacilline. - Solvant : Eau ppi 5 ml. **PROPRIÉTÉS** : Antibiotique bactéricide de la famille des bêta-lactamines, du groupe des penicillines M semi-synthétiques résistantes à la pénicilline. Le spectre d'activité comprend les espèces habituellement sensibles qui sont : les bactéries à gram + : staphylocoques pénicillino-sensibles, staphylocoques pénicillino-résistants (producteur de pénicilline) à l'exception des souches résistantes hétérogènes dites mété - R et streptocoques à l'exclusion des streptocoques du groupe D. Lorsque la notion de sensibilité constante des souches n'a pas été établie pour une espèce donnée, seule une étude *in vitro* de la souche en cause permet de confirmer si elle est sensible, résistante ou intermédiaire. **INDICATIONS** : Traitement des infections dues aux staphylocoques et aux streptocoques sensibles notamment dans leurs manifestations : - Respiratoires - O.R.L. - Rénales et uro-génitales - Cutanées - Osseuses. Infections septiques et endocardiques. **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION** : Posologie : 35 à 50 mg par kg de poids par jour, soit en moyenne : - Adulte : Comprimés à 500 mg : 2 comprimés le matin, et 2 comprimés le soir (2 + 2). Avaler les comprimés avec un peu d'eau de préférence une heure avant les repas. - Enfant : Suspension orale à 250 mg : 2 cuillères-mesure de 5ml le matin, et 2 cuillères-mesure le soir (2 + 2). - Nourrisson : Suspension orale à 250 mg : 1/2 cuillère-mesure de 5ml par 5 kg de poids matin et soir. Remarque : En cas d'insuffisance rénale sévère, il est possible d'utiliser l'oxacilline par voie orale à la posologie habituelle. **Préparation de la suspension buvable** : Ajouter une petite quantité d'eau pour dissoudre le produit, fermer le flacon et agiter, compléter avec de l'eau jusqu'au trait de mesure 60 ml, et agiter vigoureusement jusqu'à obtenir une suspension homogène. Après utilisation, refermer le flacon et garder au frais. Agiter avant chaque utilisation. - Poudre et solvant pour usage parentéral : **En traitement curatif** : - Adulte, enfant et nourrisson : 50 à 100 mg/kg/j en I.V. **En prophylaxie des infections postopératoires en chirurgie** : - 2 g I.V à l'induction anesthésique, puis injection de 1 g I.V toutes les 12 h. L'antibioprophylaxie doit être de courte durée, et ne doit pas dépasser 48 heures. **CONTRE-INDICATIONS** : Allergie aux pénicillines. **MISE EN GARDE** : Toute manifestation allergique impose l'arrêt immédiat du traitement. Des réactions d'hypersensibilité (anaphylaxie) sévères et parfois fatales ont été exceptionnellement observées chez des patients traités par les penicillines M. Leur administration nécessite un interrogatoire préalable. La contre-indication est formelle chez des patients ayant des antécédents d'allergie typique à ces produits. **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** : Risque d'allergie croisée avec les antibiotiques de la famille des céphalosporines. Grossesse : Bien qu'aucune action tératogène n'ait pu être démontrée, l'oxacilline doit être utilisée avec précaution chez la femme enceinte. Allaitements : L'oxacilline passant dans le lait maternel, l'interruption de l'allaitement doit être envisagé. Nouveau-né : Administration prudente en raison du risque d'hyperbilirubinémie. **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES** : Des interactions sont possibles, éviter de mélanger l'oxacilline avec d'autres médicaments. **EFFETS INDESIRABLES** : Manifestations allergiques : fièvre, urticaire, éosinophilie, oedème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique. - Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées. - Augmentation rare et modérée des transaminases (ASAT, ALAT), exceptionnellement hépatites icteriques. - Possibilité de néphropathie interstitielle aiguë immunoallergique. - Réaction hématoLOGIQUE réversible : anémie, thrombopénie, leucopénie. **CONDITIONS DE DELIVRANCE** : Sur prescription médicale - Liste 1. Conserver à une température inférieure à 25 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Après reconstitution, la suspension orale peut être conservée 7 jours à température ambiante (25° C) ou 14 jours au réfrigérateur (4° C). Tenir hors de portée des enfants. **DURÉE DE VALIDITÉ** : 3 ans. Poudre pour usage parentéral : Après mise en solution, l'oxacilline est stable à température ambiante pendant 4 heures dans les solutions glucosées et salées isotoniques.

OXAPEN® est une marque déposée.

OXAPEN®

Oxacilline

**Cibler le Staphylocoque
au cœur de l'infection**

- Infections Cutanées
- Infections Osseuses
- Infections Urogénitales
- Infections Respiratoires
- Endocardites, Méningites





OXAPEN®

Oxacilline

Une gamme complète pour la prise en charge globale, en ambulatoire et en hospitalisation

OXAPEN ampoule injectable

poudre et solvant pour usage parentéral IV à 1 g : Flacon + ampoule de 5 ml de solvant.



En traitement curatif

Adulte, enfant, nourrisson

50 à 100 mg/kg/j
en I.V.

Relais possible par les formes orales

En Prophylaxie des infections postopératoires

- 2 g IV à l'induction
- puis injection de 1g IV toutes les 12 heures

OXAPEN comprimés

Boîte de 12 comprimés à 500 mg

Posologie simple : 35 à 50 mg /kg/j
soit en moyenne :

Adulte :

2 cp le matin
2 cp le soir



Avaler les comprimés avec un peu d'eau de préférence une heure avant les repas.

OXAPEN suspension buvable

Flacon de 60 ml, à 250 mg/ 5 ml

35 à 50 mg /kg/j, soit en moyenne :

Enfants et nourrissons

Poids de l'enfant	Nb. cuillères-mesure de 5 ml matin	soir
-------------------	------------------------------------	------

5 kg	1/2	1/2
10 kg	1	1
15 kg	1+1/2	1+1/2
20 kg	2	2
25 kg	2+1/2	2+1/2
30 kg	3	3



Une gamme accessible

(Coût de traitement compétitif)