



[Página Principal](#) → [Medicinas, hierbas y suplementos](#) → Guanfacina

Dirección de esta página: <https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601059-es.html>

Guanfacina

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

Las tabletas de guanfacina se utilizan solas y en combinación con otros medicamentos para tratar la hipertensión arterial. Las tabletas de liberación-prolongada de guanfacina (acción prolongada) se usan como parte de un programa de tratamiento para controlar los síntomas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH; en los niños que tienen más dificultad para enfocarse, controlar sus acciones y permanecer quietos o en silencio que otras personas de la misma edad). La guanfacina se encuentra en una clase de medicamentos llamados agonistas de los receptores adrenérgicos alfa_{2A} de acción central. La guanfacina trata la hipertensión arterial mediante la disminución de la frecuencia cardíaca y la relajación de los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir más fácilmente a través del cuerpo. Las tabletas de liberación-prolongada de guanfacina puede tratar el TDAH al afectar la parte del cerebro que controla la atención y los impulsos.

La hipertensión arterial es una condición común y cuando no se trata, puede causar daños en el cerebro, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones y otras partes del cuerpo. El daño a estos órganos puede causar enfermedades del corazón, un infarto, insuficiencia cardíaca, apoplejía, insuficiencia renal, pérdida de la visión y otros problemas. Además de tomar medicamentos, hacer cambios de estilo de vida también le ayudará a controlar su presión arterial. Estos cambios incluyen comer una dieta que sea baja en grasa y sal, mantener un peso saludable, hacer ejercicio al menos 30 minutos casi todos los días, no fumar y consumir alcohol con moderación.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La presentación de la guanfacina es en tabletas y en tabletas de liberación prolongada para administrarse vía oral. Usualmente la tableta se toma una vez al día a la hora de dormir. La tableta de liberación-prolongada usualmente se toma una vez al día y no se debe tomar con una comida con alto contenido de grasa. Tome guanfacina aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica

y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome guanfacina exactamente según lo indicado. No tome más ni menos cantidad del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico.

Ingiera las tabletas de liberación-prolongada enteras con un poco de agua u otro líquido; no las parta, mastique ni triture.

Su médico probablemente comenzará con una dosis baja de guanfacina y puede aumentar en forma gradual, no más de una vez a la semana si usted está tomando las tabletas de liberación-prolongada, y no más de una vez cada 3-4 semanas, si está tomando las tabletas.

La guanfacina puede controlar su condición, pero no la curará. Puede tomar 2 semanas antes que sienta el beneficio completo de las tabletas de guanfacina de liberación-prolongada. Continúe tomando guanfacina incluso si se siente bien. No deje de tomar guanfacina sin hablar con su médico. Si deja de tomar la guanfacina repentinamente, su presión arterial puede aumentar y es posible que se sienta nervioso o ansioso. Probablemente su médico disminuirá su dosis gradualmente.

¿Qué otro uso se le da a este medicamento?

Este medicamento se puede recetar para otros usos; pida más información a su médico o farmacéutico.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de tomar guanfacina,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la guanfacina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contienen las tabletas o tabletas de liberación-prolongada de guanfacina. Pida a su farmacéutico una lista de los ingredientes.
- Usted debe saber que la guanfacina es el ingrediente activo en las tabletas de guanfacina y en las tabletas de liberación-prolongada de guanfacina. No tome ambos productos al mismo tiempo.
- Informe a su médico y farmacéutico acerca de qué otros medicamentos con y sin receta médica, vitaminas y suplementos nutricionales está tomando o tiene planificado tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: antidepresivos; antihistamínicos; barbitúricos como el fenobarbital (Luminal); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol); claritromicina (Biaxin, en Prevpac); indinavir (Crixivan); itraconazol (Onmel, Sporanox); ketoconazol (Nizoral); medicamentos para la ansiedad, hipertensión arterial, enfermedad mental, náuseas o convulsiones; nefazodona; nelfinavir (Viracept); fenitoína (Dilantin, Fhenytek); pioglitazona (Actos, en Actoplus Met, en Duetact, en Oseni); rifabutina (Mycobutin); rifampicina (Rifadin, en Rifamate, en Rifater, Rimactane); ritonavir (Norvir, en Kaletra); sedantes; píldoras para dormir; tranquilizantes; y ácido valproico (Depakene). Es posible que su médico deba cambiar las dosis de sus medicamentos o supervisarle atentamente para saber si sufre efectos secundarios.

- Informe a su médico qué productos de hierbas está tomando, especialmente la hierba de San Juan.
- Informe a su médico si se ha desmayado, o si recientemente tuvo un infarto; y si padece o ha padecido de derrame cerebral; presión sanguínea baja; un ritmo cardíaco lento; trastorno bipolar (trastorno maníaco-depresivo; una enfermedad que provoca episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales); o enfermedad cardíaca, renal o hepática.
- Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma guanfacina, llame a su médico.
- Si se someterá a una cirugía, incluso una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando guanfacina.
- Debe saber que la guanfacina le puede ocasionar somnolencia o mareo. No conduzca un vehículo ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.
- Consulte a su médico sobre el consumo seguro de bebidas alcohólicas mientras toma guanfacina. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios de la guanfacina.
- Debe saber que la guanfacina puede ocasionar mareo, aturdimiento y desmayo cuando se levanta muy rápido cuando está acostado. Esto es más común al empezar a tomar guanfacina por primera vez. Para evitar este problema, levántese de la cama despacio, apoyando sus pies en el suelo por unos minutos antes de levantarse.
- Usted debe saber que se puede desmayar si se deshidrata o por el exceso de calor durante su tratamiento con guanfacina. Asegúrese de tomar suficientes líquidos y mantenerse fresco mientras toma este medicamento.
- Debe saber que la guanfacina se debe usar como parte de un programa de tratamiento total para TDAH, que puede incluir asesoría y educación especial. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de su médico o terapeuta.
- Consulte a su médico sobre los riesgos y los beneficios de tomar la guanfacina si usted tiene 65 años o más. En general, los adultos mayores no deben tomar la guanfacina porque no es tan seguro ni tan eficaz como otros medicamentos que pueden usarse para tratar la misma afección.

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?

Hable con su médico sobre comer toronja y tomar jugo de toronja mientras toma este medicamento.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que le faltó y continúe con su programa regular de dosificación. No duplique la dosis para compensar la dosis omitida. Si está tomando las tabletas de liberación-prolongada de guanfacina y omite dos o más dosis seguidas, llame a su médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

La guanfacina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas o los que se enumeran en la sección PRECAUCIONES ESPECIALES son fuertes o no desaparecen:

- boca seca
- cansancio
- debilidad
- dolor de cabeza
- irritabilidad
- menor capacidad sexual
- disminución del apetito
- dolor de estómago
- náuseas
- vómitos
- estreñimiento

Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta alguno de los síntomas siguientes, llame a su médico inmediatamente:

- desmayos
- visión borrosa
- sarpullido
- ritmo cardíaco lento

La guanfacina puede causar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si desarrolla un efecto secundario grave, usted o su doctor puede enviar un informe al programa de divulgación de efectos adversos 'MedWatch' de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en la página de Internet (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono al 1-800-332-1088.

¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento?

Mantenga este medicamento en su envase original, cerrado herméticamente y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante que mantenga todos los medicamentos fuera de la vista y el alcance de los niños, debido a que muchos envases (tales como los pastilleros de uso semanal, y aquellos que contienen gotas oftálmicas, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños pequeños, quienes pueden abrirlos fácilmente. Con el fin de protegerlos de una intoxicación, siempre use tapaderas de seguridad e inmediatamente coloque los medicamentos en un lugar seguro, uno que se encuentre arriba y lejos de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org/es/> [<http://www.upandaway.org/es/>]

Los medicamentos que ya no son necesarios se deben desechar de una manera apropiada para asegurarse de que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe desechar estos medicamentos por el inodoro. En su lugar, la mejor manera de deshacerse de sus medicamentos es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o póngase en contacto con su departamento de basura/reciclaje local para conocer acerca de los programas de devolución de medicamentos de su comunidad. Consulte el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), (<https://goo.gl/xRXbPn> [<https://goo.gl/xRXbPn>]) para obtener más información de cómo desechar de forma segura los medicamentos, si no tiene acceso al programa de devolución de medicamentos.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>] . Si la víctima se ha derrumbado, ha tenido una convulsión, tiene dificultad para respirar, o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

- somnolencia
- falta de energía
- ritmo cardíaco lento
- desmayos
- mareos
- visión borrosa

- pupilas reducidas (círculos negros en el centro de los ojos)

¿Qué otra información de importancia debería saber?

Asista a todas las citas con su médico. Su presión arterial y ritmo cardíaco deberán verificarse regularmente para determinar su respuesta a la guanfacina.

No deje que nadie más tome su medicamento. Haga a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta médica.

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.

Marcas comerciales

- Intuniv[®]
- Tenex[®]

Documento revisado – 15/08/2018

[Conozca cómo citar esta página](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de Protección](#)

AHFS[®] Patient Medication Information[™]. © Copyright, 2024. The American Society of Health-System Pharmacists[®], 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos los derechos reservados. La duplicación de este documento para su uso comercial, deberá ser autorizada por ASHP. Traducido del inglés por HolaDoctor.