



STELLAR FE

Contains complex Fe in a highly concentrated form to correct deficiencies in all Listed crops

Iron (Fe) 6%
SG in g/ml 1.26
PH at 1% 7.6
PH at 0.1 7.3



الوصف	يعالج نقص الحديد
حجم العبوة	لتر 1.5.20
"Fe" حديد	6%
الرقم الهيدروجيني عند 0.1%	7.30%
الرقم الهيدروجيني عند 1%	7.60%
سان جرمان في جم / مل	1.26%
التوصيل الكهربائي عند 1% ملي سيمنز/سم	2.13%
اللون والشكل	سائل اسود
تطبيق	التربة/الورقية
الوظيفة	مكمل غذائي

ستيلر حديد

يحتوي على الحديد المركب في شكل متوفر معقد بدرجة عالية لتصحيح أوجه القصور في جميع المحاصيل المدرجة في النباتات، يشارك الحديد في تركيب الكلوروفيل، وهو ضروري للحفاظ على بنية البلاستيدات الخضراء ووظيفتها.

المركب عبارة عن حديد مخلب علي أحماض أمينية للرش الورقي بحسب جداول الجرعات

الاتجاه للاستخدام

الاستخدام القبلي

- لا تعد بخافات التغذية الورقية بديلاً للأسمدة المستخدمة في التربة ولكنها تعمل على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية عبر الجذور. إذا تم منع نمو الجذور لسبب ما، فإن التغذية الورقية يمكن أن تخفف من المشكلة
- يمكن تطبيق الرش الورقي على فترات 7 أو 10 أو 14 يوماً، اعتماداً على الظروف المناخية السائدة ومرحلة نمو المحصول وطبيعة برنامج الرش العام المتوقع
- بشكل عام لا ينبغي تجاوز تركيز 2% من حجم Stellar FeTM في الماء إلا إذا أوصى بذلك المزارع على وجه التحديد. يوصى بالرش المتكرر بدلاً من زيادة التركيز فوق الحد الأقصى الموصى به لكل تطبيق. راجع الجدول أدناه للحصول على توصيات عامة.

التوافق

- لا تخلط Stellar BTM مع المنتجات التي تحتوي على الفوسفات أو الكالسيوم.
- عندما يتم تطبيق Stellar FeTM بمفرده كرش ورقي، فإن المواد المساعدة مثل الحواجز والمرطبات والموزعات والاختراقات قد تعزز الامتصاص، خاصة عندما يكون للمحصول أوراق شمعية. وينبغي تكيف معدلات الجرعة وفقاً لذلك.

المحاصيل والجرعات ووقت التطبيق

المحصول	الجرعة/ فدان	توقيت التطبيق
النفاج الكشمري	2-1 لتر	يوصى ثلاث مرات بفاصل 10-14 يوماً مع الرش الأولي على التدفق الجديد يمكن إجراء من 3-2 تطبيقات على فترات تتراوح من 7 إلى 14 يوماً في مرحلة نضج الثمار حتى 7 أيام قبل الحصاد
الحضبات	0.5-1 لتر	يتم تطبيقه مرتين في بداية موسم النمو بفاصل 10-14 يوماً يمكن إجراء من 3-2 تطبيقات بفاصل 14-7 يوم في مرحلة نضج الثمار حتى 7 أيام قبل الحصاد
البطاطس	1.5 لتر	تطبق مع بداية موسم النمو
الذرة	1 لتر	تطبق مع بداية موسم النمو
العنب	0.5، 1.5 لتر	تطبيق على فترات 7 أيام فقط عند حدوث أوجه القصور لانيتم الرش أثناء فترة التزهير يمكن إجراء من 3-2 تطبيقات بفاصل 14، 7 أيام في مرحلة نضج الثمار حتى 7 أيام قبل الحصاد
فول الصويا	0.5 لتر	يتم التطبيق في مرحلة النمو V4 ومرحلة أخرى في مرحلة R1
النفاج الكشمري	1 لتر	
البطاطس	1 لتر	تطبيق 3-4 من ظهور 90% من اللاتيات
فول الصويا	1 لتر	قم بالتطبيق أولاً عند R1 والثاني عند R5.1
الفاكهة ذات السواء الحرجية الخوخ، برقوق	1، 2 لتر	يطبق ثلاث مرات بفاصل 10-14 يوماً مع الرش الأولي على التدفق الجديد آخر 3-2 يمكن إجراء التطبيق على فترات تتراوح من 7 إلى 14 يوماً في مرحلة نضج الثمار حتى 7 أيام قبل الحصاد

معدلات التطبيق العامة للمحاصيل المختلفة

المحاصيل الخام	
التطبيقات الورقية	خفف 1 لتر، 100 لتر من الماء ثم ضعه على المحصول (أقصى تركيز 3% أو 3 لتر/100 لتر من الماء)
تطبيقات التربة	1/2 لتر لكل تطبيق
في وقت الزراعة	من 0.5 الي 1 لتر للفدان
محاصيل الخضر	
التطبيق الورقي	قم بتخفيف 0.5 لتر، 100 لتر من الماء ثم ضعه كغطاية كاملة (الحد الأقصى للتركيز 2% أو 2 لتر/100 لتر من الماء)
تطبيقات التربة	لتر /فدان ويطبق من 2 : 5 مرات أو 3 : 6 مرات خلال فترات النمو

تفاصيل الخلط والتطبيق

ستيلر حديدTM يفضل أن يتم تطبيقه في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر ويعتمد معدل التطبيق على خصوبة التربة والتفاعل المطلوب. وينبغي استخدام المعدلات المنخفضة للصيانة في حين أن المعدلات الأعلى سوف تصحح نقص التغذية

تحذيرات

لا تخلط مع المنتجات التي تحتوي على الفوسفات أو الكبريتات

الحفاظ على درجة الحموضة من 5.5 إلى 6.0 للامتزاج الأمثل

يجب أن يتم تخزين المنتج بشكل آمن وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة

ومن المهم مراقبة المحاصيل وتعديل مخدلات المغذيات وفقاً لمتطلبات المحاصيل المحددة

وينبغي تجنب تلوث مصادر المياه

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات

يحتوي المنتج على أملاح قد تسبب صداً على المعادن إذا انسكبت، يجب غسلها بالماء في أسرع وقت ممكن