



STELLAR K™

contains very high concentration potassium in organically complexed forms that make it highly effective in terms of uptake and translocation

pH at 0.1%	7.60
pH at 1%	9.10
SG in g/ml	1.40



الوصف	مصحح نقص البوتاسيوم
حجم العبوة	1.5, 20, 200, 1000 لتر
بوتاسيوم	25%
الرقم الهيدروجيني عند 0.1%	7.60
الرقم الهيدروجيني عند 1%	9.10
سان جرمان في جم / مل	1.40
التوصيل الكهربائي عند 1% ملي سيمنز/سم	3.99
اللون والشكل	سائل أبيض شفاف
تطبيق	التربة / الرش
الوظيفة	مكمل غذائي

المحاصيل والجترات ووقت التطبيق

المحصول	الجرعة / فدان	توقيت التطبيق
خضار ورقية	0.5-1 لتر	ابدأ بمرحلة 4-6 أوراق ثم استخدمه 3-4 مرات بفواصل 14-21 يوماً.
الذرة ما قبل الزراعة	1 لتر	قم بتطبيق تطبيقين أولاً في مرحلة النمو 4 و الثانية في 15 يوماً قبل الشراية.
الذرة	2-5 لتر	يتم تطبيقه بالتساوي مع أخذ بيانات تحليل التربة بعين الاعتبار.
بصل	0.5-1 لتر	يتم تطبيقه مرتين ابتداءً من 21 يوماً بعد إنشاء المحصول وتكراره بعد 21 يوماً إذا لزم الأمر.
فاكهة التفاح الكمثرى	1 لتر	4 أسابيع بعد الحصاد، 30% إزهار، الأسبوع 43، 45، 47، 49، 50، 51. انظر تحليل الأوراق.
البطاطس	0.5-1 لتر	تطبيق 3-4 تطبيقات من ظهور 90%.
فول الصويا	1 لتر	قم بتقديم طليين أولاً عند R1 والثاني عند R5.1.
الفاكهة ذات النواة الحجرية الخوخ، البرقوق	1 لتر	يطبق عند ظهور أول علامة على النقص ويكرر بعد 3-4 أسابيع.
الفول السوداني	1 لتر	يتم تطبيقه عند 30% من الإزهار، بعد الحصاد.
طماطم	1 لتر	تطبيق 3-4 مرات على فترات 21 يوماً.
قمح	1-2 لتر	قم بتطبيق مرحلة الحراثة ومرة أخرى قبل 7-10 أيام من مرحلة ورقة العلم.

ستيلر بوتاسيوم™

يحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم في أشكال معقدة مما يجعله فعالاً للغاية من حيث الامتصاص والانتقال .

ستيلر بوتاسيوم™

تم تطويره لتحسين عملية تخليق الكربوهيدرات وحركة السكريات المنتجة أثناء عملية التمثيل الضوئي إلى الثمار. فهو يعزز حجم الثمار ووزنها ومحتوى السكر فيها، مما يؤثر بشكل مباشر على المحصول. يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم والأحماض الأمينية المعقدة عضويًا والتي تعتبر ضرورية لزيادة محتوى السكر والبريكس في جميع أنواع المحاصيل.

الاتجاه للاستخدام

• الاستخدام الورقي
لا تعد بخاخات التغذية الورقية بديلاً للأسمدة المستخدمة في التربة ولكنها تعمل على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية عبر الأوراق. إذا تم منع نمو الجذور لسبب ما، فإن التغذية الورقية يمكن أن تخفف من المشكلة. يمكن تطبيق الرش الورقي على فترات 7 أو 10 أو 14 يوماً، اعتماداً على الظروف المناخية السائدة ومرحلة نمو المحصول وطبيعة برنامج الرش العام المتبع.
بشكل عام، لا ينبغي تجاوز تركيز 1-2% من حجم ستيلر بوتاسيوم™ في الماء ما لم يوصي المزارع بذلك على وجه التحديد. يوصى بالرش المتكرر بدلاً من زيادة التركيز فوق الحد الأقصى الموصى به لكل تطبيق. راجع الجدول أدناه للحصول على توصيات عامة.

التوافق

• يتمتع ستيلر بوتاسيوم™ بتأثير قلوي قوي على الماء، لذلك يجب التحقق من استخدامه مع معظم المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات من خلال اختبار الإبريق قبل خلط كميات كبيرة. تحقق دائماً من التوافق قبل الرش. لا تخطئ ستيلر بوتاسيوم™ مع خليط بوردو أو منتجات التعليق النحاسية. عندما يتم تطبيق ستيلر بوتاسيوم™ بمفرده كرش ورقي، فإن المواد المساعدة مثل العازلة، والمرطبات، والموزعات، والمواد المخترقة قد تعزز الامتصاص، خاصة عندما يكون للمحصول أوراق شمعية. وينبغي تكييف معدلات الجرعة وفقاً لذلك.

تحذيرات

- لا ينطبق على النباتات المجردة بالجفاف
- لا يخلط مع المنتجات التي تحتوي على الكالسيوم
- الحفاظ على الرقم الهيدروجيني من 5.5 إلى 6.0 للامتزاج الأمثل
- يجب تخزين المنتج بشكل آمن
- من المهم مراقبة المحاصيل وتعديل مدخلات المغذيات وفقاً لمتطلبات المحاصيل المحددة
- ينبغي تجنب تلوث مصادر المياه
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات
- يحتوي المنتج على أملاح قد تسبب صدأ على المعادن
- إذا انسكبت، يجب غسلها بالماء في أسرع وقت ممكن.

المصنع: رقم 20 ،بلوك رقم C6 ،مجمع سى بى سى الصناعى،مدينة السادات ،مصر
Manufacturing plant: No.20 ,Block C6,CPC industrial Park,Egypt
Tel : 01113331352 Email : info@rich-chemicals.com www.rich-chemicals.com