



STELLAR Mg

contains complexed magnesium in a highly concentrated form to correct magnesium deficiencies in all crops listed.

Magnesium (Mg) 10%

SG g/ml 1.25

Ph at 1% 8.5



الوصف	مصحح نقص المغنيسيوم
حجم الحزمة	1,5,20,200,1000 لتر
المغنيسيوم (Mg)	10%
الرقم الهيدروجيني عند 0.1%	8.5
الرقم الهيدروجيني عند 1%	8.5
سان جرمان في جم / مل	1.28
التوصيل الكهربائي عند 1% ملي سيمنز/سم	2.13
اللون والشكل	سائل أصفر فاتح
التطبيق الورقي	
الوظيفة	مكمل غذائي وعلاجي

المحاصيل والجترات ووقت التطبيق

اقتصاص	الجرعة/ فدان	توقيت التطبيق
الأفوكادو	2-1 لتر	للحفاظ على كفاءة المغنيسيوم.
الحمضيات	2 لتر	للحفاظ على كفاءة المغنيسيوم، ضعة مرتين.
قطن	1 لتر	للحفاظ على كفاءة المغنيسيوم، ضعه مرتين.
القرعيات	1 لتر	يطبق عند ظهور أول علامة على النقص ويكرر بعد 3-4 أسابيع.
العنب	1.5 لتر	أبدأ بالتطبيق بعد الإزهار وكرر ذلك على فترات 10-12 يوماً طوال فترة النمو الخضري.
الفول السوداني	1 لتر	يتم تطبيقه في وقت مبكر من موسم النمو عند ظهور أولى علامات النقص وتكرر التطبيق إذا لزم الأمر.
خس	1 لتر	تطبيق مرتين على فترات 10 أيام في وقت مبكر من موسم النمو.
الذرة	1 لتر	يتم تطبيقه في وقت مبكر من موسم النمو عند ظهور أولى علامات النقص وتكرر التطبيق إذا لزم الأمر.
زيتون	1 لتر	يتم تطبيقه مرتين بدءاً من بداية موسم النمو ويكرر بعد 21-28 يوماً على النمو الجديد.
بصل	1 لتر	قم بتطبيقه مرتين خلال موسم النمو وكرر التطبيق بعد 10-14 يوماً.
الفلفل	1 لتر	يطبق عند ظهور أول علامة على النقص ويكرر بعد 3-4 أسابيع لمدة ثلاث مرات
فاكهة التفاح: والكمثرى	1 لتر	فقط للحفاظ على كفاءة المغنيسيوم.
المكسرات: المكاديميا، البقان	1 لتر	فقط للحفاظ على كفاءة المغنيسيوم.
البطاطس	2-1 لتر	يطبق عند أول علامة على النقص ويكرر مرتين بعد 3-4 أسابيع.
الفاكهة ذات النواة الحديدية، اليرفوق التكاثرين، الخوخ	1 لتر	فقط للحفاظ على كفاءة المغنيسيوم.

ستيلر مغنيسيوم

يحتوي على المغنيسيوم المعقد في شكل عالي التركيز لتصحيح نقص المغنيسيوم في جميع المحاصيل المدرجة.

طريقة الاستخدام الورقي

لا تعد بخافات التغذية الورقية بديلاً للأسمدة المستخدمة في التربة ولكنها تعمل على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية عبر الجذور. إذا تم منع نمو الجذور لسبب ما، فإن التغذية الورقية يمكن أن تخفف من المشكلة. يمكن تطبيق الرش الورقي على فترات 7 أو 10 أو 14 يوماً، اعتماداً على الظروف المناخية السائدة ومرحلة نمو المحصول وطبيعة برنامج الرش العام المتبع.

بشكل عام، تركيز 2% حجم على حجم ستيلر مغنيسيوم لا ينبغي تجاوزها في الماء إلا إذا أوصى المزارع بذلك على وجه التحديد. يوصى بالرش المتكرر بدلاً من زيادة التركيز فوق الحد الأقصى الموصى به لكل تطبيق. راجع الجدول أدناه للحصول على توصيات عامة.

تفاصيل التطبيق

• ستيلر مغنيسيوم™ يفضل أن يتم تطبيقه في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر. وينبغي استخدام المعدلات المنخفضة للحفاظ على مستوى المغنيسيوم في حين أن المعدلات الأعلى سوف تصحح نقص التغذية. يعتمد معدل التطبيق على خصوبة التربة والتفاعل المطلوب.

معدلات التطبيق العامة للمحاصيل المختلفة

المحاصيل الخام	
التطبيقات الورقية	خفف 1 لتر: 100 لتر من الماء ثم ضعه على المحصول (أقصى تركيز 3% أو 3 لتر/100 لتر من الماء).
تطبيقات التربة	1.5/5 لتر لكل تطبيق.
محاصيل الأشجار	
التطبيق الورقي	قم بتخفيف 0.5 لتر: 100 لتر من الماء ثم ضعه تغطية كاملة (الحد الأقصى للتركيز 2% أو 2 لتر/100 لتر من الماء).
تطبيقات التربة	3-7 لتر / ما لكل تطبيق، يخفف 1: 1000 ويطبق 3-6 مرات خلال فترات النمو.

تحذيرات

- الحفاظ على درجة الحموضة من 5.5 إلى 6.0 للامتزاج الأمثل.
- يجب أن يتم تخزين المنتج بشكل آمن وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- ومن المهم مراقبة المحاصيل وتعديل مدخلات المغذيات وفقا لمتطلبات المحاصيل المحددة.
- وينبغي تجنب تلوث مصادر المياه.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات.
- إذا انسكبت، يجب غسلها بالماء في أسرع وقت ممكن.