



# STELLAR zn

contains complexed zinc in a highly concentrated form to correct Zinc deficiencies in all listed crops

**Zinc (Zn) 8.6%**  
**SG g/ml 1.34**  
**Ph at 1% 7.8**



| الوصف                                 | يعالج نقص الزنك     |
|---------------------------------------|---------------------|
| حجم العبوة                            | 1.5,20,1000 لتر     |
| الزنك (الزنك) %                       | 8.6                 |
| الرقم الهيدروجيني عند 0.1%            | 5.30                |
| الرقم الهيدروجيني عند 1%              | 7.80                |
| سان جرمان في جم / مل                  | 1.34                |
| التوصيل الكهربائي عند 1% ملي سيمنز/سم | 1.92                |
| اللون والشكل                          | سائل أصفر فاتح واضح |
| تطبيق                                 | التربة/الورقية      |
| الوظيفة                               | مكمل غذائي          |

## ستيلر زنك™

يحتوي على الزنك المركب في شكل متوفر بدرجة عالية التركيز لتصحيح نقص الزنك في جميع المحاصيل المدرجة.

الاتجاه للاستخدام  
• الاستخدام الورقي  
يمكن تطبيق الرش الورقي على فترات 7 أو 10 أو 14 يومًا، اعتمادًا على الظروف المناخية السائدة ومرحلة نمو المحصول وطبيعة برنامج الرش العام المتبع.

بشكل عام، لا ينبغي تجاوز تركيز 2% من حجم ستيلر زنك™ في الماء ما لم يوصي المزارع بذلك على وجه التحديد. يوصى بالرش المتكرر بدلاً من زيادة التركيز فوق الحد الأقصى الموصى به لكل تطبيق. راجع الجدول أدناه للحصول على توصيات عامة.

• تفاصيل الخلط والتطبيق  
ستيلر زنك™ يفضل أن يتم تطبيقه في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر. وينبغي استخدام المعدلات المنخفضة للحفاظ على معدلات الزنك في حين أن المعدلات الأعلى سوف تصحح نقص التغذية.

## المحاصيل والجترات ووقت التطبيق

|                                |                |                                                                                               |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| بصل                            | 1 لتر          | ضعه مرتين بدءًا من حجم كرة الجولف وكرري الاستخدام بعد ١٤-١٠ يومًا.                            |
| الفلفل                         | 1 لتر          | يطبق عند ظهور أول علامة على النقص ويكرر بعد ٤-٣ أسابيع.                                       |
| البازلاء                       | 100 مل: 150 مل | يتم تطبيقه في وقت مبكر من موسم النمو عند ظهور أولى علامات النقص وتكرار التطبيق إذا لزم الأمر. |
| البرقوق،<br>الينكتارين،<br>خوخ | 1 لتر          | قم بالتطبيق في وقت مبكر من الموسم على النمو الجديد وكرر التطبيق إذا لزم الأمر.                |
| فول الصويا                     | 100 مل: 200 مل | يتم تطبيقه في وقت مبكر من موسم النمو عند ظهور أولى علامات النقص وتكرار التطبيق إذا لزم الأمر. |
| طماطم                          | 100 مل: 200 مل | يطبق عند ظهور أول علامة على النقص ويكرر بعد ٤-٣ أسابيع.                                       |
| قمح                            | 100 مل: 200 مل | يطبق عند ظهور أول علامة على النقص ويكرر بعد ٤-٣ أسابيع إذا لزم الأمر.                         |

## تحذيرات

- لا تخلط مع المنتجات التي تحتوي على الفوسفات أو الكبريتات.
- الحفاظ على درجة الحموضة من 5.5 إلى 6.0 للامتزاج الأمثل
- يجب أن يتم تخزين المنتج بشكل آمن وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.
- من المهم مراقبة المحاصيل وتعديل مدخلات المغذيات وفقا لمتطلبات المحاصيل المحددة
- وينبغي تجنب تلوث مصادر المياه
- يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات

| المحصول             | الجرة / فدان | توقيت التطبيق                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التفاح،<br>الكمثرى  | 1 لتر        | ضع ٣-٤ مرات بدءًا من أول استخدام بعد ٧ أيام من التزهير، وبعد ١٤ يومًا من آخر مرحلة تزهير ومرة أخرى بعد ١٤ يومًا. يجب أن يكون التطبيق الأخير بعد الحصاد بواقع نصف لتر/فدان. |
| الأفوكادو           | 2.1 لتر      | ابدأ التطبيق الأول على الزهور وعلى جميع الثمرات الجديدة في الصيف، ويوصى باستخدام ٣-٤ مرات على فترات ١٤ يومًا.                                                              |
| الفول،<br>جاف وأخضر | 1 لتر        | ابدأ بالتطبيق بعد بدء النمو النشط وكرر ذلك على فترات تتراوح من ١٠ إلى ١٢ يومًا طوال فترة النمو الخضري.                                                                     |
| الحمضيات            | 1.5 لتر      | تنطبق ٣ مرات على النمو الجديد.                                                                                                                                             |
| بيري                | 1.5:1 لتر    | ابدأ بالتطبيق بعد بدء النمو النشط وكرر ذلك على فترات تتراوح من ١٠ إلى ١٢ يومًا طوال فترة النمو الخضري.                                                                     |
| البطاطس             | 3:1 لتر      | يطبق عند ظهور أول علامة على النقص ويكرر بعد ٤-٣ أسابيع.                                                                                                                    |
| العنب               | 1 لتر        | ابدأ بالتطبيق بعد بدء النمو النشط وكرر ذلك على فترات تتراوح من ١٠ إلى ١٢ يومًا طوال فترة النمو الخضري.                                                                     |
| قطن                 | 1 لتر        | قم بالتطبيق في وقت مبكر من الموسم على النمو الجديد وكرر التطبيق إذا لزم الأمر.                                                                                             |
| القرعيات            | 1 لتر        | يطبق عند ظهور أول علامة على النقص ويكرر بعد ٤-٣ أسابيع.                                                                                                                    |
| الفول<br>السوداني   | 1 لتر        | يتم تطبيقه في وقت مبكر من موسم النمو عند ظهور أولى علامات النقص وتكرار التطبيق إذا لزم الأمر.                                                                              |
| خسّ                 | 1 لتر        | تنطبق مرتين على فترات ٢٨:٢١ يومًا في وقت مبكر من موسم النمو.                                                                                                               |
| الذرة               | 1 لتر        | يتم تطبيقه في وقت مبكر من موسم النمو عند ظهور أولى علامات النقص وتكرار التطبيق إذا لزم الأمر.                                                                              |
| زيتون               | 1.5 لتر      | يتم تطبيقه مرتين بدءًا من بداية موسم النمو ويكرر بعد ٢٨:٢١ يومًا على النمو الجديد.                                                                                         |