

# Thông tin Dành cho Bệnh nhân



## Dị ứng thuốc kháng sinh và tác dụng phụ

Tài liệu này không thay thế lời khuyên của chuyên gia chăm sóc sức khỏe có liên quan của quý vị.

Nhiều người báo cáo bị phản ứng với thuốc kháng sinh, đặc biệt là với penicillin. Điều quan trọng là phải nói về tình trạng quý vị bị dị ứng thuốc kháng sinh với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá để đảm bảo rằng quý vị có thể dùng đúng loại thuốc kháng sinh một cách an toàn khi cần.

### Dị ứng thuốc kháng sinh là gì?

Đôi khi trường hợp dị ứng thuốc kháng sinh được báo cáo là “tác dụng phụ” chứ không phải “dị ứng thực sự”. “Dị ứng thực sự” và “tác dụng phụ” khác nhau.

Dị ứng thuốc kháng sinh xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng thái quá với loại thuốc kháng sinh không phù hợp với cơ thể. Khi điều này xảy ra, hệ thống miễn dịch tạo ra các triệu chứng dị ứng. Dị ứng thuốc kháng sinh có thể trầm trọng (nguy hiểm đến tính mạng) hoặc nhẹ.

“Dị ứng thực sự” với thuốc kháng sinh bao gồm:

- Sốc phản vệ (phản ứng dị ứng trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng đối với các chất như thuốc men, thực phẩm hoặc côn trùng cắn). Các triệu chứng hoặc dấu hiệu sốc phản vệ bao gồm:
  - huyết áp rất thấp
  - mạch hoặc nhịp tim yếu và/hoặc nhanh
  - phát ban kèm các triệu chứng khác, phát triển nhanh chóng sau khi tiếp xúc với chất đó
  - sưng môi hoặc lưỡi

*Nếu có bất kỳ dấu hiệu hoặc bị bất kỳ triệu chứng sốc phản vệ nào, quý vị nên lập tức gọi 000 để được hỗ trợ y tế khẩn cấp.*

- Những loại phát ban khác

**Điều quan trọng là nói với bác sĩ nếu quý vị biết mình bị dị ứng thuốc kháng sinh**

### Tác dụng phụ thuốc kháng sinh gây ra là gì?

Tất cả các loại thuốc, kể cả thuốc kháng sinh, đều có thể gây ra tác dụng phụ. Đây là lý do quý vị chỉ nên dùng thuốc kháng sinh khi cần thiết. Tác dụng phụ không liên quan đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tác dụng phụ thuốc kháng sinh gây ra là phổ biến.

Tác dụng phụ thuốc kháng sinh gây ra bao gồm:

- ngứa mà không phát ban
- buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc đau bụng
- nhức đầu
- bị nấm

Thông tin Dành cho Bệnh nhân

Tựa đề tài liệu: Dị ứng thuốc kháng sinh và tác dụng phụ

## Quý vị đã từng bị dị ứng thuốc kháng sinh hay tác dụng phụ hay không?

Bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem phản ứng quý vị bị là tác dụng phụ hay dị ứng thực sự. Quý vị sẽ cần trả các câu hỏi và điều quan trọng là quý vị cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. **Nếu quý vị bị dị ứng với một loại thuốc kháng sinh, điều đó không có nghĩa là quý vị bị dị ứng với tất cả các loại thuốc kháng sinh.**

Bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá sẽ cho quý vị và (các) bác sĩ thông thường của quý vị biết liệu phản ứng của quý vị với thuốc kháng sinh là tác dụng phụ hay dị ứng. Bệnh sử của quý vị cũng sẽ được cập nhật.

## Tôi có cần xét nghiệm dị ứng không?

Nếu quý vị đã báo cáo tác dụng phụ thuốc kháng sinh gây ra, quý vị không cần phải làm xét nghiệm dị ứng. Dựa trên thông tin quý vị cung cấp cho bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá, đôi khi có thể cần phải thẩm định dị ứng để xác định xem quý vị có thực sự dị ứng với thuốc kháng sinh hay không.

## Tôi có thể làm gì nếu bị tác dụng phụ thuốc kháng sinh gây ra?

Quý vị không nên tự “nhận” mình bị dị ứng với thuốc kháng sinh nếu quý vị bị tác dụng phụ. Làm như vậy có thể khiến quý vị không được dùng thuốc kháng sinh tốt nhất cho trường hợp bị nhiễm trùng trong tương lai.

Quý vị phải luôn nói với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu quý vị nghĩ rằng mình đã bị tác dụng phụ thuốc kháng sinh gây ra. Nhiều tác dụng phụ thuốc kháng sinh gây ra có thể điều trị được một cách an toàn để quý vị có thể dùng trọn đợt thuốc kháng sinh do bác sĩ kê toa.



Muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

<https://antibioticallergy.org.au/>

Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 000 để xin xe cứu thương hoặc đến khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

Ngày thực hiện: Tháng 3 năm 2023