

低風險盤尼西林過敏

這份文件不應取代相關醫療專業人士給予您的建議。

許多人對抗生素有反應，特別是對盤尼西林。許多盤尼西林過敏反應會在幾年後消失。您可能可以接受簡單的測試，以確定您是否仍然對盤尼西林過敏。

什麼是盤尼西林過敏？

盤尼西林過敏是對盤尼西林的一種不良反應。它可能是嚴重的（危及生命）或輕微的。

嚴重的盤尼西林過敏症狀包括：

- 嚴重過敏反應（嚴重的、危及生命的過敏反應，可能由藥物、食物或昆蟲叮咬過敏引起）。嚴重過敏反應的症狀包括：
 - 血壓過低
 - 脈搏或心跳過慢和/或過快
 - 在接觸到物質後迅速發展，並伴隨其他症狀的皮疹
 - 嘴唇或舌頭腫脹

如果出現任何嚴重過敏反應的症狀，應立即撥打 000 尋求緊急醫療救助。

- 皮疹，伴隨身體嚴重不適

什麼是低風險盤尼西林過敏？

低風險盤尼西林過敏產生的症狀輕微，且不太可能再次發生。如果您有以下情況，則可能有低風險盤尼西林過敏：

- 在童年時或很久以前，曾在盤尼西林療程中或結束後出現皮疹
- 在盤尼西林療程中或之後，身體的小部分出現皮疹
- 在 10 年前或更早期，對盤尼西林出現無法解釋的反應

患者資訊

文件標題：低風險盤尼西林過敏

90%（即 10 個中有 9 個）對盤尼西林的反應會隨著時間消失，並且可能並非由盤尼西林引起。

如果您認為自己對盤尼西林抗生素具有低風險過敏，您需要透過接受測試來確定。

如何確定您是否有低風險盤尼西林過敏？

您的醫生、藥劑師或護士會評估您，以確定您是否屬於低風險或高風險盤尼西林過敏。您將會被問問題，重要的是您提供盡可能多的資訊。如果您的醫生認為您對盤尼西林過敏的風險較低，他們會跟您討論接受「盤尼西林口服測試」的選項。這個測試很簡單且風險非常低。

什麼是盤尼西林口服測試？

在這個測試中，您將被要求吞服一顆（少量）盤尼西林膠囊。護士會密切觀察您兩個小時，以查看是否出現立即性過敏反應。如果在此期間沒有任何反應，則表示您對盤尼西林沒有立即性過敏反應。接受測試幾天後可能會出現輕微的皮疹，但這是非常罕見的。我們會給您一封信，上面有一個電話號碼，如果您注意到因為測試而出現的不尋常狀況，可以撥打該號碼。

接受盤尼西林口服測試的好處

通過這個測試，您可以確定自己是否還對盤尼西林過敏。

如果測試結果顯示您不再對盤尼西林過敏，那麼您的醫生將有更多的抗生素可供選擇。這可能意味著您在感染時能獲得更有效且更安全的抗生素。

盤尼西林口服測試安全嗎？

是的，這個測試的風險非常低。全球已經有數千人接受過這個測試。在接受測試後，許多人發現他們可以安全地使用盤尼西林。

在接受測試期間，護士或醫生將密切觀察您。如果您出現任何過敏反應的跡象，例如：皮疹、呼吸困難、腫脹，或者血壓或脈搏變化，您的護士或醫生會立即對您進行治療。

接受測試後會發生什麼？

您和您的醫生將收到測試結果。

患者資訊

文件標題：低風險盤尼西林過敏

您們將各收到一封信，解釋以下內容：

- 測試的名稱及結果
- 您可以安全使用的抗生素名稱

所有測試結果將被記錄在您的醫療歷史中。

確保所有醫療保健提供者都知道您的抗生素過敏情況。

您可以在我的健康紀錄（My Health Record）中記錄您的過敏資訊。

重要的是您得隨時攜帶過敏警示卡（Allergy Alert Cards）。



如需進一步資訊，請拜訪以下網址：

<https://antibioticallergy.org.au/>

在緊急情況下，請撥打 000 叫救護車或前往最近的醫院急診部。

製作日期：2023 年 3 月