

Orientações Pós Gastrostomia Endoscópica Percutânea (GTT)

Orientações gerais

- ✓ Nos primeiros 5 dias após o exame, fazer repouso total;
- ✓ Limpar o orifício da gastrostomia durante o banho e sempre que estiver sujo;
- ✓ Cuidado na manipulação da sonda para não puxar ou tracionar com força. Caso o cateter saia nos primeiros 10 dias, trazer o paciente **IMEDIATAMENTE** para a emergência do hospital. Caso o cateter saia depois disso, comparecer ao hospital em até 6 horas, para a colocação de outro cateter;
- ✓ Verificar diariamente a pele em torno do cateter, durante a limpeza. Em caso de sinais de inflamação (vermelhidão, inchaço, calor ou dor) procurar a emergência do Hospital;
- ✓ Se houver afrouxamento do retentor externo ou vazamento da dieta pela pele em torno do cateter, procurar o Setor de Endoscopia (em dias úteis) ou a emergência do Hospital;
- ✓ Usar dieta líquida bem diluída e sem resíduos ou a dieta industrializada. Antes de colocar a dieta, injetar uma seringa de água filtrada para lubrificar a sonda por dentro. Quando terminar a dieta, lavar a sonda por dentro com duas seringas de água filtrada, para evitar obstrução;
- ✓ Medicações que forem administradas pela GTT devem ser maceradas e diluídas em pequena quantidade de água filtrada, lembrando de lavar a sonda por dentro após com água filtrada;
- ✓ Caso o paciente tenha dor leve ou moderada, fazer 40 gotas de dipirona, diluídas em água, pelo cateter da gastrostomia, até de 4/4 h (6 vezes ao dia);

Em caso de dúvidas contatar a GastroMais.