



BIOGRA Max

Sildenafil 50mg + Dapoxetina 30mg



BIO-PROSPECTO

COMPOSICIÓN

Citrato de Sildenafil USP equivalente a Sildenafil.....	50 mg
Clorhidrato de Dapoxetina USP Eq. a Dapoxetina	30mg
Excipientes.....	C.S.

MECANISMO DE ACCIÓN

Sildenafil, es una terapia de administración oral para tratamiento de la Disfunción Eréctil. En condiciones normales, es decir, con estimulación sexual, restaura la función eréctil deteriorada aumentando el flujo sanguíneo al pene.

El mecanismo fisiológico responsable de la erección del pene implica la liberación de óxido nítrico (NO) en los cuerpos cavernosos durante la estimulación sexual.

El óxido nítrico activa la enzima guanilato ciclasa, lo que da lugar a un aumento de los niveles de guanosina monofosfato cíclica (GMPc), 12 de 16 que produce una relajación del músculo liso en los cuerpos cavernosos del pene, permitiendo la afluencia de sangre.

La Dapoxetina pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS). Esta sustancia puede ser también conocida como medicamento urológico. La Dapoxetina se utiliza para el tratamiento de la Eyaculación Precoz para varones de 18 a 64 años.

La eyaculación precoz es un problema sexual frecuente, que se produce cuando el varón eyacula con una mínima estimulación sexual y antes de que el varón lo desee. Esta situación puede causar problemas para el hombre y puede afectar las relaciones sexuales con su pareja. La Dapoxetina prolonga el tiempo hasta la eyaculación y puede mejorar el control sobre este proceso fisiológico. Esto reduciría su frustración o preocupación por lo rápido que eyacula. Este medicamento también puede mejorar su satisfacción respecto a sus relaciones sexuales.

INDICACIONES TERAPEUTICAS

Indicado en adultos con disfunción eréctil en hombres y eyaculación precoz (EP), en varones adultos de 18 a 64 años. que es la incapacidad para obtener o mantener una erección suficiente para una actividad sexual satisfactoria. Para que BIOGRA MAX, sea efectivo es necesaria la estimulación sexual.

Debe prescribirse únicamente a pacientes que cumplan todos los criterios siguientes: Un tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal (TLEI) de menos de 2 minutos y Eyaculación con estimulación sexual mínima antes, durante o poco después de la penetración, y antes de lo que le gustaría al paciente, de forma persistente o recurrente; Angustia personal marcada o dificultad interpersonal a consecuencia de la EP; y Escaso control de la eyaculación. Antecedentes de eyaculación precoz en la mayor parte de las relaciones sexuales en los 6 últimos meses. BIOGRA MAX, debe administrarse únicamente como tratamiento a demanda antes de la actividad sexual.

Debe administrarse únicamente a pacientes que cumplan todos los criterios siguientes: Un tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal (TLEI) de menos de 2 minutos y Eyaculación con estimulación sexual mínima antes, durante o poco después de la penetración, y antes de lo que le gustaría al paciente, de forma persistente o recurrente; Angustia personal marcada o dificultad interpersonal a consecuencia de la EP; y Escaso control de la eyaculación. Antecedentes de eyaculación precoz en la mayor parte de las relaciones sexuales en los 6 últimos meses. BIOGRA MAX, debe administrarse únicamente como tratamiento a demanda antes de la actividad sexual.

POSOLÓGIA

1 tableta de 1 a 3 horas aproximadamente antes de la actividad sexual. No debe tomarse con una frecuencia superior a una vez cada 24 horas.

El tratamiento con BIOGRA MAX no está indicado para tratamiento crónico diario. Se recomienda que los comprimidos sean tragados con al menos un vaso de agua entero. BIOGRA MAX puede tomarse con o sin alimentos. BIOGRA MAX debe tomarse únicamente cuando se vaya a mantener relaciones sexuales.

ADVERTENCIA:

-Toma drogas como éxtasis, LSD, narcóticos o benzodiacepinas

- Si alguna vez ha tenido trastornos mentales como depresión, manía (sentimiento de sobreexcitación, irritabilidad o no ser capaz de pensar con claridad), trastorno bipolar (estos síntomas incluyen cambios de humor graves entre manía y depresión) o esquizofrenia (una enfermedad psiquiátrica)

- Si tiene antecedentes sangrado o problemas de coágulos de sangre.

- Si usted tiene problemas de riñón.

- Si usted tiene epilepsia.

- Si usted tiene antecedentes por baja la tensión sanguínea.

- Si consume alcohol.

Si alguna de las circunstancias le afecta a usted (o no está seguro), consulte a su médico antes de tomar BIOGRA MAX. Antes de que comience a tomar este medicamento, su médico debe realizarle una prueba para asegurarse de que su tensión sanguínea no desciende demasiado cuando usted se pone de pie.

No tome BIOGRA MAX si está tomando los siguientes medicamentos:

Tioridazina, u otros medicamentos para la depresión. Litio, Linezolid, Triptófano, Tramadol, ketoconazol e itraconazol. Ciertos medicamentos para el VIH, incluyendo ritonavir, saquinavir, nelfinavir y atazanavir, antibióticos como telitromicina, Nefazodona, eritromicina y claritromicina. Analgésicos y antiinflamatorios como Ibuprofeno o ácido acetilsalicílico. Anticoagulantes Warfarina, anginas de pecho, verapamilo y diltiazem).

Infecciones por Hongos como, fluconazol. Aprepitant, para tratar las náuseas.

EFFECTOS ADVERSOS

Mareos - Dolor de cabeza - Náuseas.

Efectos adversos frecuentes

- Sensación de irritabilidad, ansiedad, agitación o nerviosismo entumecimiento u hormigueo, Dificultad para lograr una erección o para mantenerla, Sudoración excesiva, Visión borrosa, Sequedad de boca.

ALMACENAMIENTO: No conservar a temperatura superior a 30°C.

Conservar en el empaque original para protegerlo de la humedad.

PRESENTACIÓN: Caja de 04 Unidades

Importado y Distribuido por:

Casa de representaciones BioVenezuela c.a.

Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630

Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio

Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.

www.BioVenezuela.net

Importado bajo el No. de Permiso sanitario de Importación 00008062

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

