BioVenezuela

# BIOPRAZOL 20mg

## Omeprazol Liberación Retardada

## BIO-PROSPECTO

**BIOPRAZOL 24 HORAS**
Composición:
Omeprazol en granulos con cubierta enterica..... 20mg
Excipientes.....C.S.

**Indicaciones:**
No tome Bioprazol:
- si es alérgico (hipersensible) a omeprazol o a cualquiera de los demás componentes de Omeprazol,
- si es alérgico a medicamentos que contengan inhibidores de la bomba de protones (ej. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol),
- si está tomando un medicamento que contenga nelfinavir (usado para la infección por VIH).

**Embarazo y lactancia:** El BIOPRAZOL no muestran reacciones adversas sobre el embarazo ni la salud del feto o del recién nacido. Se puede utilizar BIOPRAZOL durante el embarazo. El BIOPRAZOL se excreta en la leche materna,pero no es probable que afecte al niño cuando se utilizan dosis terapéuticas.
Efectos sobre la capacidad de conducir: No es probable que afecte a la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Pueden aparecer reacciones adversas tales como mareo y alteraciones visuales. Si ocurrieran, los pacientes no deberían conducir o utilizar máquinas

**Dosis:**
Adultos:
Tratamiento de los síntomas de la ERGE (Enfermedad de Reflujo Gastro-esofagico), como ardor y regurgitación ácida:
- Si su médico comprueba que tiene daños leves en el esófago, la dosis normal es de 20 mg una vez al día durante 4-8 semanas. Es posible que su médico le recete una dosis de 40 mg durante otras 8 semanas si el esófago todavía no ha cicatrizado.
- La dosis normal una vez cicatrizado el esófago es de 10 mg una vez al día.
- Si no tiene daños en el esófago, la dosis normal es de 10 mg una vez al día.

Tratamiento de las úlceras de la parte superior del intestino úlcera duodenal:
- La dosis normal es de 20 mg una vez al día durante 2 semanas. Es posible que su médico le recete esa misma dosis durante otras 2 semanas si la úlcera todavía no ha cicatrizado.
- Si la úlcera no cicatriza del todo, la dosis podrá aumentarse a 40 mg una vez al día durante 4 semanas.

Tratamiento de las úlceras del estómago (úlcera gástrica):
- La dosis normal es de 20 mg una vez al día durante 4 semanas. Es posible que su médico le recete esa misma dosis durante otras 4 semanas si la úlcera todavía no ha cicatrizado.
- Si la úlcera no cicatriza del todo, la dosis podrá aumentarse a 40 mg una vez al día durante 8 semanas.

Prevención de la reaparición de las úlceras de estómago y duodeno:
- La dosis normal es de 10 mg o 20 mg una vez al día. Puede que su médico aumente la dosis a 40 mg una vez al día.

Tratamiento de las úlceras de estómago y duodeno causadas por los AINEs (antiinflamatorios no esteroideos):
- La dosis normal es de 20 mg una vez al día durante 4-8 semanas.

Prevención de las úlceras de estómago y duodeno durante la administración de AINEs:
- La dosis normal es de 20 mg una vez al día

Tratamiento de las úlceras causadas por la infección por Helicobacter pylori y prevención de su reaparición:
- La dosis normal es de 20 mg de omeprazol dos veces al día durante una semana.
- Su médico le indicará además que tome dos antibióticos de los siguientes: amoxicilina, claritromicina y metronidazol.

Tratamiento del exceso de ácido en el estómago provocado por un tumor en el páncreas (síndrome de Zollinger-Ellison):
- La dosis habitual es de 60 mg al día.
- Su médico ajustará la dosis dependiendo de sus necesidades y decidirá además durante cuánto tiempo tiene que tomar el medicamento

**Interacciones con otros medicamentos:**
- Reduce absorción de: ketoconazol, itraconazol, posaconazol, erlotinib (con los 2 últimos evitar concomitancia).
- Aumenta exposición sistémica de: principios activos metabolizados por CYP2C19 como warfarina y otros antagonistas de vit. K, cilostazol, diazepam, fenitoína (vigilar concentración fenitoína 2 1 as semana).
- Controlar nivel plasmático de: ciclosporina.
- Inhibe metabolismo hepático de: triazolam, flurazepam y disulfiram.
- Aumenta concentración sérica de: tacrolimús (monitorizar concentración y función renal, ajustar dosis tacrolimús si es preciso), metotrexato (retirar temporalmente omeprazol), saquinavir.
- Concentración sérica aumentada por: voriconazol, claritromicina; considerar ajuste de dosis en I.H. y en tratamiento. prolongado.
- Concentración sérica disminuida por: rifampicina, hipérico.
- Aumenta biodisponibilidad de: digoxina (precaución en ancianos y monitorizar).

**Efectos adversos:**
Poco frecuentes (debe llamar a su médico):
- Silbidos repentinos al respirar (sibilancias repentinas), hinchazón de los labios, la lengua y la garganta o del cuerpo, erupción en la piel, desmayo o dificultades al tragar (reacción alérgica grave).
- Enrojecimiento de la piel con formación de ampollas o descamación. También podrían aparecer ampollas intensas y sangrado en los labios, los ojos, la boca, la nariz y los genitales. Podría tratarse de "síndrome de Stevens-Johnson" o "necrólisis epidérmica tóxica".
- Coloración amarilla de la piel, orina oscura y cansancio, que pueden ser síntomas de problemas del hígado.

Otros efectos adversos son:
Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
- Dolor de cabeza.
- Efectos en el estómago o el intestino: diarrea, dolor de estómago, estreñimiento y gases (flatulencia).
- Náuseas o vómitos.
- Pólipos benignos en el estómago

**Conservación:**
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
Conservar por debajo de 30ºC.
Mantener el frasco perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad.
Conservar el blíster en el embalaje original para protegerlo de la humedad


*Importado y Distribuido por:*
**Casa de representaciones BioVenezuela c.a.**
**Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630**
**Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio**
**Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.**
www.BioVenezuela.net


**Importado bajo el**
**No. de Permiso sanitario de Importación 00002810**

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL