




BIOPROFEN 200mg

Ibuprofeno Tabletas Recubiertas



BIO-PROSPECTO

BIOPROFEN

Composición:

Ibuprofeno USP. 200mg

Excipientes..... C.S.

Mecanismo de acción:

El ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico que posee propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. El efecto terapéutico, como antiinflamatorio no esteroideo que es, deriva de su actividad inhibitoria de la prostaglandín-sintetasa.

Como todos los antiinflamatorios no esteroideos de la familia de los ácidos arilpropiónicos, el ibuprofeno inhibe la acción de las enzimas COX1 y COX2.

Los efectos anti-inflamatorios del ibuprofeno son el resultado de la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas subsiguiente a la inhibición de la ciclooxigenasa. El ibuprofeno inhibe la migración leucocitaria a las áreas inflamadas, impidiendo la liberación por los leucocitos de citoquinas y otras moléculas que actúan sobre los receptores nociceptivos.

El ibuprofeno, como otros AINEs, no altera el umbral del dolor ni modifica los niveles de prostaglandinas cerebrales, concluyéndose que sus efectos son periféricos. La antipiresis es consecuencia de la vasodilatación periférica debido a una acción central sobre el centro regulador de la temperatura del hipotálamo.

Indicaciones:

Esta indicado para:

- Traumatismos Esqueléticos: esguinces, desgarros musculares, rupturas tendinosas, traumatismos en la práctica de deporte.
- Tratamiento de dolores tales como: dolor al pasar alimentos por el esófago, dolor de oído, dolor dental, dolor de cabeza.
- Condiciones inflamatorias no articulares como: tendinitis, bursitis, lumbago, hombro doloroso agudo.
- Tratamiento del dolor después de cirugía: en cirugía dental y cirugía periodontal.
- Tratamiento de los cólicos menstruales
- Manejo de artritis reumatoidea, osteoartritis, espondiloartrosis, espondilitis deformativa y gota aguda.

Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a los componentes, a salicilatos o a otros antiinflamatorios no esteroideos.
- Úlcera péptica, porfiria, falla renal o hepática.
- Anomalías sanguíneas de origen desconocido.
- Tensión arterial alta.
- Enfermedades intestinales inflamatorias (enfermedad de Cronhn, inflamación ulcerativa del colon).
- Debilidad general,
- Insuficiencia cardíaca.

Debe usarse con precaución en pacientes con función renal deteriorada o que están recibiendo tratamiento anticoagulante.

Embarazo y en mujeres en edad fértil:

Debido a que la administración de medicamentos del tipo ibuprofeno se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible. En el tercer trimestre la administración de ibuprofeno está contraindicada.

Conducción y uso de máquinas:

Si experimenta mareo, vértigo, alteraciones de la visión u otros síntomas mientras esté tomando este medicamento, no debe conducir ni utilizar maquinaria peligrosa. Si solamente toma una dosis de ibuprofeno, o lo toma durante un periodo corto, no es necesario que adopte precauciones especiales.

Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos del tipo ibuprofeno se han asociado con una disminución de la capacidad para concebir.

Posología:

- Niños y adolescentes de 25 a 40 kg de peso: La dosis diaria recomendada es de 600 mg – 800 mg de ibuprofeno, repartidos en 3 ó 4 tomas, siendo la dosis máxima diaria recomendada de 800mg.

- Niños y adolescentes de más de 40 kg de peso: La dosis diaria recomendada es de 1.200 mg – 1.600 mg de ibuprofeno al día, repartidos en 3 ó 4 tomas, siendo la dosis máxima diaria recomendada de 1.600mg.

- Para el tratamiento de la artritis reumatoide juvenil podría ser necesarias dosis superiores, aunque se recomienda no sobrepasar los 40 mg/kg/día de ibuprofeno. El intervalo entre dosis dependerá de la evolución de los síntomas, pero nunca inferior a 4 horas. No se recomienda el uso de este medicamento en niños menores de seis meses.

- Adultos: La dosis diaria recomendada es de 1.200 mg – 1.800 mg de ibuprofeno al día, repartidos en 3 ó 4 tomas, siendo la dosis máxima recomendada de 2.400mg.

Interacciones con otros medicamentos:

El ibuprofeno debe administrarse con precaución en pacientes que estén en tratamiento con alguno de los fármacos que se citan a continuación ya que, en algunos pacientes, se han notificado interacciones:

- Antihipertensivos: reducción del efecto hipotensor.
- Diuréticos: disminución del efecto diurético. Los diuréticos pueden aumentar el riesgo de nefrotoxicidad por antiinflamatorios no esteroideos.
- Glucósidos cardíacos: los antiinflamatorios no esteroideos pueden exacerbar la insuficiencia cardíaca, reducir la tasa de filtración glomerular y aumentar los niveles de los glucósidos cardíacos.
- Litio: disminución de la eliminación de litio.
- Metotrexato: disminución de la eliminación de metotrexato.
- Ciclosporina: aumenta el riesgo de nefrotoxicidad con los antiinflamatorios no esteroideos.
- Mifepriestona: los antiinflamatorios no esteroideos no deben administrarse en los 8-12 días posteriores a la administración de la mifepriestona ya que éstos pueden reducir los efectos de la misma.
- Otros analgésicos: evitar el uso concomitante con otros antiinflamatorios no esteroideos.
- Corticosteroides: aumento del riesgo de sangrado digestivo.
- Anticoagulantes: aumento del efecto anticoagulante.
- Quinolonas: datos derivados de la experimentación animal indican que los antiinflamatorios no esteroideos asociados a las quinolonas pueden aumentar el riesgo de convulsiones.

Efectos adversos:

Los efectos graves incluyen: el descenso en la presión arterial, que en casos extremos pueden precipitar choque y asma, edema facial, edema de la lengua, edema laríngeo causante de estrechamiento en la vía aérea y dificultad para respirar, taquicardia.

Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad cuya severidad va desde coque y la erupción cutánea hasta enrojecimiento de la piel.

Efectos secundarios digestivos: tales como náuseas, sensación de llenura, conspación de quemazón en el esófago, dolor gástrico, inapetencia, diarrea o constipación, vomito, gastritis erosiva, presencia de sangre oculta en las heces.

Sobre el sistema nervioso: limitación en la capacidad para reacción (principalmente en asociación con el alcohol), dolor de cabeza, vértigo, sueño, depresión, ansiedad, estados de confusión, alteraciones de la vista, ambliopía toxica.

En casos raros puede presentarse zumbido de uno de los oídos.

De manera ocasional, pueden ocurrir alteraciones del desarrollo de las células sanguíneas en la medula ósea (anemia, leucopenia, trombocitopenia, agranulocitosis).

En casos aislados puede presentarse daño renal.

Precauciones:

Adminístrese con precaución en pacientes con glaucoma, hipertrofia prostática con tendencia a la formación de orina residual, íleo paralítico, estenosis pilórica, asma, bronco espasmo, alteraciones de la coagulación, enfermedad cardiovascular, o que estén recibiendo cumarínicos, en el periodo anterior o posterior a una cirugía mayor, incluyendo la dental, ancianos y niños menores de 12 años.

En pacientes con síndrome de pólipos nasales asociados con el bronco espasmo, edema y otras reacciones provocadas por la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, alto riesgo de reacción alérgica.

Conservación:

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 25°C.

No utilice BIOPROFEN después de la fecha de caducidad indicada en el envase después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Importado y Distribuido por:

Casa de representaciones BioVenezuela c.a.

Rif: J-413246040 - Tlf 0281-2811630

Av. Americo Vespucio Marina Americo Vespucio

Local 1 Puerto la Cruz Edo Anzoátegui 6023 Venezuela.


www.BioVenezuela.net

Importado bajo el No. de Permiso sanitario de Importación 00002809

CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL



CAJA PRESENTACIÓN COMERCIAL

BioVenezuela 

BIOPROFEN

Ibuprofeno **Tabletas recubiertas** **200 mg.**

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 100 *Tabletas USP*

BIOPROFEN
Ibuprofeno **200 mg.**
Tamaño **Real**
Via Oral
100 *Tabletas Recubiertas*

Composición:
Cada tableta recubierta contiene:
Ibuprofeno USP..... 200mg.
Excipientes c. s.

Indicaciones y Posología:
A juicio del facultativo.
No exceda la dosis prescrita.
Si está embarazada o en periodo de lactancia consulte a su médico.
Este producto contiene lactosa.

Almacenamiento:
Consérvese a temperatura ambiente, inferior a 30° centígrados, protegido de la luz, la humedad



BIO-PROSPECTO



8 9 0 4 1 8 7 8 8 0 0 2 3 1

"Su salud es nuestra misión"
BioVenezuela 



Fab. lic.: XXXXXXXX
Lote: XXXXX
Fab: xx/xxxx
Exp: xx/xxxx

BioVenezuela 

BIOPROFEN

Ibuprofeno **Tabletas recubiertas** **200 mg.**

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 100 *Tabletas USP*

Importado y Distribuido por:
Casa de representaciones BioVenezuela c.a.
Rif: J-413246040
biovenezuela.net BioVenezuela 

Fabricado por:
Maiden Pharmaceutical Ltd.
maidenpharma.com

Av. Americo Vespucio, Marina Americo Vespucio, Local #1, Puerto la Cruz, Edo Anzoátegui 6023 - Venezuela.

Aggarwal Cyber Plaza-II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi India 110034

No. de Permiso sanitario de Importación 00002809 Cpe: