

Spørgsmål

1. Hvilke præparat anvendes til analgesi på Endoskopiafsnittet? • Sufentanil • Midazolam • Flumazenil
2. Hvilken antidot anvendes ved sedation med Midazolam? • Naloxone • Flumazenil • Atropin
3. Hvis Midazolam kombineres med Sufentanil, skal Midazolam-dosis reduceres med: • 20 – 40% • 33 – 50% • 65%
4. Ved hjertestop på Endoskopiafsnittet ringes: • 112 • 8-4444 • 8-5555
5. Antidot Naloxone har kortere halveringstid end Sufentanil. Det betyder at: • Patienten hurtigt får en bedret klinisk tilstand • At forgiftningssymptomer kan recidivere inden for få timer • At der skal gives Atropin
6. Hvordan gives Adrenalin 0,3-0,5 mg ved en allergisk reaktion? • Oralt • I.M • I.V.
7. Hvad er definitionen på klinisk hjertestop? • At patienten er bevidstløs og uden vejrtrækning • At patienten er pulsløs og uden vejrtrækning • At patienten ikke kan holde frie luftveje
8. Under C- Cirkulation i ABCDE-princippet hører blandt andet: • Vurdering af bevidsthed • Anlæggelse af IV-adgange • Sikring af sufficient respiration/ventilation
9. Vedr. anvendelse af AED ved hjertestop: • Pads påsættes under pågående hjertemassage • Hjertemassage pauseres, mens pads påsættes • Pads påsættes først, når hjertestopholdet er ankommet
10. Ved hjertestop i Endoskopiafsnittet er forventningen, at personalet skal: • Overlevere informationer til teamleder vha. ISBAR • Bistå med optrækning og dispensering af medicin • Dokumentere tider for diverse hændelser på stuen • Bistå hjertestopholdet med at hente/bringe diverse utensilier etc.