

INSECTICIDAS



INSECTICIDAS

SAGMEX
AGRICOLA



INSECTICIDAS

SAGMEX
AGRICOLA





AGRIMEC (ABAMECTINA) (1L) Syngenta
AGRIMEC® 1.8% CE tiene como ingrediente activo a la abamectina, la cual controla los ácaros e insectos fitófagos aquí indicados. Este producto tiene actividad translaminar. **AGRIMEC® 1.8% CE** al ser aplicado apropiadamente penetra en el tejido de las hojas formando un depósito de ingrediente activo, proporcionando una actividad residual contra las plagas que se alimentan del follaje las cuales son afectadas al ingerir el producto.



CULTIVO	PLAGA (NOMBRE COMÚN)	PLAGA (NOMBRE CIENTÍFICO)	DOSIS (L / Ha)	L. S*
Apio	Ácaros	Tetranychus spp.	0.3 - 1.2 o mínimo 60 mL/100 L de agua.*	3
Algodonero	ÁcarosMinador de la hoja	Tetranychus spp.Liriomyza spp.	0.5 - 1.2	20
Cítricos	Árador de los cítricosÁcaro blancoÁcaro de dos manchas	Phyllocoptruta oleivoraPolyphagotarsonemus latusTetranychus urticae	0.4 - 1.5 + 0.25% de aceite mineral agrícola o mínimo 20 mL + 250 mL de aceite/100 L de agua**	7
Fresa	Araña rojaAraña ciclamina	Tetranychus spp.Steatonemus pallidus	0.5 - 1.2 o mínimo 100 mL/100 L de agua.	3
	Ácaro de dos manchas	Tetranychus urticae	0.5 - 1.0 L/Ha	
Jitomate (tomate)	Araña rojaMinadores de hojaGusano alfilerPulgón saltador	Tetranychus spp.Liriomyza spp.Keiferia lycopersicellaBactericera cockerelli	0.3 - 1.2 o mínimo 60 mL/100 L de agua.0.5 - 1.2 L/Ha o mínimo 100 mL/100 L de agua. 0.5 - 0.75	3
RosasCrisantemosGerberasClaveles	ÁcarosMinador de la hoja	Tetranychus spp.Liriomyza spp.	0.5 - 1.5050 - 100 mL/100 L de agua.	No aplica
CalabacitaMelónPepinoSandía	Minador de la hoja	Liriomyza spp.	0.5 - 1.0	3
Chile	Minador de la hojaÁcaro blanco Pulgón saltador	Liriomyza mundaPolyphagotarsonemus latusBactericera cockerelli	0.5 - 1.00.75 - 1.0 0.5 - 0.75	0
ManzanoPeralAguacateroPapa	Araña rojaÁcaro caféPulgón saltador	Tetranychus urticaeOligonychus punicaeBactericera cockerelli	0.5 - 1.00.5 - 1.00.5 - 0.75	28143



COMBAT MEJORADO (CIPERMETRINA) (950ML)

Dragón

COMBAT 20® es un insecticida piretroide formulado como concentrado emulsionable. Actúa por contacto e ingestión, principalmente sobre larvas de lepidópteros y dípteros. La dosis debe ajustarse según la infestación y tamaño del cultivo.





CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS/L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD***
Arándano•Frambuesa•Fresa•Grosella•Zarzamora	Gusano soldado	Spodoptera exigua	125 - 150	7
Lima•Limonero•Mandarino•Naranja•Tangerino•Toronjo	Adulto de Psílido Asiático de los cítricos.Ninfas Psílido Asiático de los cítricos.	Diaphorina citri Diaphorina citri	125 1.0 - 125	34
Algodonero***	Gusano belloteroGusano soldadoGusano de algodón	Heliothis virescensSpodoptera exiguaHelicoverpa zea	1.0 - 2.01.5 - 2.01.0 - 2.0	21
Alfalfa	Gusano soldado Gusano trozador Picudo egipcioChinche ligus	Spodoptera exiguaAgrotis spp Euxoa auxiliarisHypera brunneipennisLygus spp	0.75 - 1.0 1.5 - 1.75 0.5 - 1.21.0 - 1.5	21
Arroz	Gusano soldado	Spodoptera exigua	0.75 - 1.25	21
Chile	Gusano soldado	Spodoptera exigua	1.0 - 1.5	7
Jitomate	Minador de la hojaGusano del frutoGusano soldado	Liriomyza munda Heliothis zeaSpodoptera exigua	1.5 - 2.0	1
Maíz	Gusano cogolleroGusano soldado	Spodoptera frugiperdaMythimna unipuncta	0.5 - 0.750.75 - 1.5	21
Manzano	Pulgón lanigero	Eriosoma lanigerum	1 a 2 ml/Lde agua	30
Pepino	Minador de la hoja	Liriomyza munda	1.5 - 2.0	7
Frijol ejotero	Gusano soldadoMinador de la hoja	Spodoptera exiguaMythimna unipuncta Liriomyza sp	1.0 - 1.5	20



CONFINAL (IMIDACLOPRID + BIFENTRINA) (1L) Dragón

Confinal®, insecticida compuesto por dos ingredientes que combinan modos diferentes de acción. Une el poder de un insecticida neonicotinoide así como de un piretroide. Los activos de Confinal® logran atacar al insecto de dos diferentes modos de acción, mediante acción sistémica y traslaminar, en tanto que el piretroide actúa por ingestión y contacto. Con esta combinación se obtiene un producto letal contra adultos y estados inmaduros de insectos plaga.

Posee actividad insecticida por vía sistémica y residual; actúa por contacto e ingestión y es absorbido por las hojas y aplicado por aspersión foliar. Los insectos tratados muestran inmediatamente los síntomas del envenenamiento con excitación y parálisis. Muestra actividad antialimentaria paralizando esta acción en los insectos. Esta acción evita de manera inmediata la transmisión de virus y controla el daño producido por los insectos. Tiene efectos repelentes sobre adultos de mosquita blanca impidiendo la puesta de huevos.





CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*	OBSERVACIONES
Caña de Azúcar	Mosca pinta o salivazo (Aeneolamia postica)	0.4-0.5	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 5 días cuando se tenga la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 419-519 L de agua/ha.
Cacahuete Chícharo Frijol Frijol ejotero Garbanzo Habab Lenteja Soya	Mosquita blanca (Bemisia tabaci)	300 – 500 ml	7	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 5 días cuando se tenga la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 185-285 L de agua/ha.
Berenjena Chile Jitomate Papa Pimiento morrón Tomate de cáscara	Mosca blanca (Bemisia tabaci) Paratrioza (Bactericera cockerelli)	10-15 ml/L de agua	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 5 días cuando se tenga la presencia de la plaga; volumen de aplicación sugerido 357-457 L de agua/ha.



**COMPAS (CLORPIRIFOS)
(950ML)**

COMPAS® 480 es un insecticida organofosforado que actúa por contacto. Está formulado como concentrado emulsionable y se aplica al follaje de los cultivos en forma de aspersión.



CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS L/HA	INTERVALO DE SEGURIDAD
Jitomate	Minador de la hoja Gusano del fruto Gusano soldado	Liriomyza munda Heliothis zea Spodoptera exigua	1.5 - 2.0	1
Maiz	Gusano cogollero Gusano soldado	Spodoptera frugiperda Mythimna unipuncta	0.5 - 0.75 0.75 - 1.5	21
Manzano	Pulgón lanigero	Eriosoma lanigerum	1 a 2 ml/L de agua	30
Pepino	Minador de la hoja	Liriomyza munda	1.5 - 2.0	7
Sorgo	Mosquita midge Gusano cogollero Gusano elotero	Contarinia sorghicola Spodoptera frugiperda Heliothis zea	0.5	21
Frijol ejotero	Gusano soldado Minador de la hoja	Spodoptera exigua Mythimna unipuncta Liriomyza sp	1.0 - 1.5	20
Soya	Gusano soldado Gusano peludo	Spodoptera exigua Mythimna unipuncta Estigmene acrea	1.0 - 1.5	21
Trigo	Gusano cogollero Gusano soldado	Spodoptera exigua Mythimna unipuncta	0.75 - 1.0	21



DICTADOR (FIPRONIL)

DICTADOR es un insecticida formulado como suspensión acuosa (floable) que actúa por contacto e ingestión.



CULTIVO	PLAGA	DOSISL/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD(Días)*	OBSERVACIONES
Algodón	Picudo del algodón o (Anthonomus grandis)	200 – 300 ml/ha	45	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
Crisantemo	Trips (Thrips sp.)	75 – 200 ml/ha	Sin Límite	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, volumen de aplicación 150 – 250 L de agua/ha.
Maíz	Gallina ciega (Philophaga ravidus)	0.5 – 1.0	Sin Límite	Realizar una aplicación al momento de la siembra al fondo del surco cubriendo la semilla, volumen de aplicación 150 – 250 L de agua/ha.
Papa	Gallina ciega (Philophaga ravidus)	0.5 – 1.0	45	Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de la siembra; volumen de aplicación 170 – 270 L de agua/ha.



FOLEY REY (CLORPIRIFOS+PERMETRINA)
(950ML) Dragón
FOLEY® REY Insecticida agrícola,
Concentrado Emulsionable



Cultivo	Plaga	Dosis L/Ha	Intervalo de seguridad • (Días*)	Observaciones
Chile	Picudo de Chile (Anthrenus eugenii)	0.75-1.0	7	Aplicar cuando aparezcan los primeros adultos
Jitomate	Minador de la hoja (Liriomyza uidobrensis)	1.5-2.0	1	Aplicar cuando se tenga de 20- 25% de hojas minadas (con larvas).
MaízSorgo	Gusano cogollero (S. podoptera Frugiperda)	0.75-1.0	21	Aplicar de preferencia sobre estadios iniciales, cuando se tenga 25% de plantas dañadas. En ambos cultivos, dirigir la aplicación al cogollo



**GUSAMIL (BENZOATO DE EMAMECTINA)
(500ML) Guindag**

Gusamil es un excelente insecticida para el control de insectos del tipo defoliadores que atacan en etapas del desarrollo del cultivo establecido. Estos insectos al ocasionar un deterioro en el área foliar llegan a mermar el crecimiento de las plantas, esto ocasiona que sean cultivos del mal aspecto físico, los cultivos son susceptibles al ataque de las plagas en todas sus etapas de desarrollo.



CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Avena Cebada Centeno Trigo Triticale Arroz	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	100 a 400 ml / ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos, de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volúmenes de aplicación sugerido por ha 200 litros de agua.



IMILAND
(IMIDACLOPRID+LAMBDAHALOTHRIN
A) 1L Dragón
IMILAND® Insecticida y/o Acaricida
Agrícola.



CULTIVO	PLAGA	DOSISml/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD(DÍAS)+	OBSERVACIONES
CalabacitaCalabazaMelónPepinoSandía	Mosca blanca(Bemisia tabaci)	200 – 300	33333	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 360-460 L de agua/ha.
LimónLimaMandarino NaranjaToronjo	Pulido asiático de los cítricos(Diaphorina citri)	40 – 50 ml/ 100 L de agua	Sin LímiteSin LímiteSin LímiteSin Límite	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga distribuida de manera homogénea en el cultivo; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
JitomateChile	Ninfas y adultos de mosca blanca(Bemisia tabaci)	250 – 300	1515	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días; cuando se presenten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha.
Aguacate	Trips(Scirtothrips perseae)	250 – 300	7	Realizar 1 aplicación al follaje, cuando se detecte la plaga sobre los brotes florales, período de protección hasta 14 días. Volumen de aplicación 450 – 550 L de agua/ha.



PAQUETE TORMENTA (SIDELT+TORMENTA) (1HA)
Insecticida que combina la efectividad de Tormenta® y de Sidel® para lograr un alto nivel de control de larvas de lepidópteros como gusano cogollero y otros gusanos que atacan diversos cultivos. Es un producto para aquellos productores que buscan control rápido y perdurable de gusanos que atacan su cultivo y logra un control inmediato y prolongado, evitando así ataques continuos de la plaga, con un período de control de hasta 10 días dependiendo el nivel de infestación.



CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MODO DE APLICACIÓN
Maíz (1)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) Gusano elotero (Helicoverpa zea)	1 paquete / ha	Iniciar aplicaciones cuando se observen las primeras larvas en el cultivo.
Sorgo	Gusano soldado (Spodoptera exigua)	1 paquete / ha	Iniciar aplicaciones cuando se observen las primeras larvas en el cultivo.



Busca tu cultivo, ingrediente activo, producto o marca
WhatsApp_Image_2023-10-09_at_4.06.47_PM-removebg-preview
QUIYAJO (EXTRACTO DE QUILLAJA + AJO + CANELA) (1L) Grindag
QUIYAJO® es un insecticida acaricida natural a base de extractos botánicos como Extracto de Quillaja (Quillaja saponaria) y Extracto de Ajo (Allium sativum).

QUIYAJO® tiene diversos modos de acción, destacando el efecto de derribe por efecto del contenido en saponinas de Quillaja, su efecto espumante logra derribar los insectos en segundos posterior a la aplicación. Estas mismas saponinas logran distorsionar la permeabilidad de la cutícula del insecto, provocándose la muerte de este por ruptura celular al generarse una deshidratación inmediata.

El contenido en Alomonas provenientes del ajo (Allium sativum) logran hacer el efecto de repelencia hacia insectos que atacan a los cultivos establecidos, logrando tener un efecto duradero y control natural hacia estas plagas.



CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
berengena ,chile , tomate , jitomate ,tabaco	mosquita blanca (bemisia tabaci)	1 a 2 ml / ha
OBSERVACIONES		
Realizar 3 aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días cuando se detecte la presencia de la plaga. Volumen de aplicación 350- 450 L de agua/ha.		



REGENT 4SC (FIPRONIL) (1L)

Basf

Regent® 4 SC (fipronil) es un insecticida del grupo de los pirazoles, formulado como suspensión concentrada que actúa por contacto e ingestión con acción rápida, no tiene acción sistémica, ni fumigante




CULTIVO	PLAGA	DOSISL /ha	Observaciones
Maíz (90)	Gallina ciegaPhyllophaga ravidia	0.3 – 0.5	Realizar una aplicación al momento de la siembra, aplicando al lado de la semillaSe aplica en el suelo con aplicador "ONE PASS" 3arainsecticidas líquidos instalado en sembradora de precisión.
	AlfilerilloDiabrotica virgifera zea		
	Gallina ciegaPhyllophaga obsoleta	0.3 – 0.5	MezclarRegent® 4 SC a la dosis indicada con 150 Kg de fertilizante 18-46-00 y aplicar al fondo del surco antes de la siembra.
Papa (45)	Gallina ciegaPhyllophaga obsoleta	0.3 – 0.5	Realizar una aplicación en el fondo del surco al momento de la siembra. Con volumen de aspersión suficiente para asegurar un buen cubrimiento.
Agave (SL)	Picudo del agaveScyphophorus acupunctatus	0.075 – 0.125	Realizar dos aplicaciones en drech, a intervalos de 7 días. Con un volumen de aplicación de 120 mL de mezcla por planta.



CLORPIRIFOS ETIL I GRANULADO
Analor 3G es un insecticida organofosforado de contacto, ingestión e inhalación de amplio espectro de control. Su formulación es granular lista para usarse.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Maíz y sorgo.





CLORPIRIFOS ETIL I GRANULADO

Analor 5% es un insecticida del grupo de los organofosforados que puede ser aplicado usando equipos terrestres manuales de tipo "salero." Equipos terrestres para tractor o equipos aéreos que aseguren un buen cubrimiento de las áreas infestadas. Su formulación es granular lista para usarse.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Maíz y sorgo.





Anater 5% G

TERBUFOS GRANULADO

Organofosforado sistémico con actividad insecticida, acaricida y nematocida, de aplicación al suelo, con buen efecto de choque y actividad residual. Por su actividad sistémica también actúa sobre parásitos de los órganos aéreos. Actúa por contacto e ingestión.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Producto especializado para maíz.





FLASH C

CLORPIRIFOS ETIL I POLVO

FLASH C es un insecticida del grupo de los organofosforados, por lo tanto actúa inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa mediante la combinación con esta enzima, por lo que la acetilcolina no se libera en el sitio receptor y el mensaje del impulso nervioso continua pasando entre las terminales nerviosas del insecto, esto resulta en una excesiva transmisión de impulsos nerviosos, parálisis y finalmente la muerte de los insectos.

Presentado como polvo seco para ser aplicado con maquinaria o manual.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Maíz y sorgo.



Certacor 20 SC



CLORANTRANILIPROL I SUSPENSIÓN CONCENTRADA ACUOSA

Certacor es un insecticida que pertenece al grupo de las diamidas antranílicas (grupo insecticidas 28 IRAC), una clase de insecticidas con modo de acción que actúa en los receptores de rianodina.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Papa, tomate, tomate de cáscara, berenjena, chile, tomate, tomate de cáscara, pepino, melón, calabacita, chayote, sandía, brócoli, col o repollo, coliflor, col de bruselas, nabo, mostaza, colza, manzano, maíz, sorgo, arándano, frambuesa, fresa, zarzamora, espárrago, cebolla, ajo, poro, nogal, aguacate, piña, papaya, caña de azúcar.

PROPIEDADES

Posee actividad sistémica al ser absorbido a través del sistema radicular.

Acción translaminar.

Tiene actividad de contacto, aunque es más eficaz a través de la ingestión del material tratado.

Actúa rápidamente.





Cincuate

METHOXYFENOZIDE - FLOABLE

Insecticida regulador de crecimiento de los insectos; que actúa sobre la fase de larvas de la plaga, imitando la hormona natural de la muda del insecto, induciendo a la larva a una muda prematura letal, la cual se encuentra impedida de deshacerse de su vieja cutícula por lo que muere de deshidratación e inanición después de ingerir el tejido vegetal tratado con Cincuate.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Nogal, maíz, aguacate, solanáceas y cucurbitáceas.

PROPIEDADES

Nueva generación de insecticidas (Biorracionales).

Reguladores hormonales.

Efecto letal en corto tiempo.

Alta actividad insecticida y selectiva contra larvas de lepidópteros.

No afecta a insectos benéficos.





Diazinon 25 E


DIAZINON I CONCENTRADO EMULSIONABLE

Diazinon es un insecticida y/o acaricida agrícola, organofosforado que actúa por contacto, ingestión e inhalación y cierta acción penetrante. No es ovicida. Se degrada rápidamente en el suelo en condiciones aerobias y anaerobias.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Alfalfa, algodón, cacahuate, pepino, melón, sandía, apio, caña de azúcar, cebolla, chícharo, fresa, frijol, trigo, jitomate, lechuga, maíz, pastos, sorgo, soya, durazno, ciruelo, manzano, peral, piña, plátano.





Alter

SPINOSAD SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Insecticida de origen natural, del grupo naturalyte para el control de plagas de larvas de lepidópteros y trips. Su novedosa forma de acción, su contundente efecto de derribe y su prolongado periodo de control lo hacen el mejor producto en el mercado para proteger sus cultivos en sistemas de producción a campo abierto o agricultura protegida. Es una herramienta útil para el manejo integrado de plagas (MIP)

CULTIVOS RECOMENDADOS

Brasicáceas, cucurbitáceas, solanáceas, nogal y fresa.

PROPIEDADES

Herramienta efectiva para el manejo de resistencia

Modo de acción único

Controla poblaciones resistentes a otros grupos toxicológicos

Alta selectividad a fauna benéfica

Muy bajo impacto al medio ambiente y a seres vivos





Anatrina

PERMETRINA I CONCENTRADO EMULSIONABLE

Anatrina es un insecticida y/o acaricida agrícola, piretroide a base de permetrina que actúa por contacto e ingestión para el control de plagas, especialmente larvas de lepidóptero.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Aguacatero, algodónero, maíz, sorgo, papa, soya, jitomate, sandía, pepino, manzano, durazno, peral, col, coliflor, col de Bruselas, apio, lechuga, espinaca, espárrago, berenjena, chile, brócoli, pastos, melón, calabaza.





Flash Ultra

CLORPIRIFOS ETIL + PERMETRINA I CONCENTRADO EMULSIONABLE

FLASH® Ultra es un organofosforado y piretroide sintético no sistémico con actividad insecticida por ingestión, inhalación y contacto, y gran efecto de choque, presentada en forma de concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje. Resulta efectiva sobre numerosos insectos tanto chupadores como masticadores. Puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor.

Concentrado emulsionable.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Soya, chile, algodónero, maíz, sorgo, tomate.





Flash G

SULFOXAFLOR + LAMBDA CYHALOTRINA
SUSPENSIÓN EN EMULSIÓN

A modo de suspensión en emulsión, el insecticida FLASH G presenta una química nueva que permite que el ingrediente activo se mueva dentro de la planta teniendo un nivel superior de control en insectos chupadores, masticadores y raspadores. Contiene una nueva clase de química, las sulfoximinas. Flash G actúa dentro de la planta controlando insectos que son de difícil alcance.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Papa, algodón, frijol, soya y trigo.

PROPIEDADES

Flash G es accionado por dos diferentes mecanismos de acción que actúan dentro de la planta controlando insectos que son de difícil alcance.

El componente Sulfoxaflor tiene una excelente actividad sistémica y translaminar, controlando insectos chupadores que se esconden en diferentes partes del follaje.





Malathion 50 E

MALATHION I POLVO

MALATHION 50 E es un insecticida agrícola organofosforado no sistémico con actividad insecticida y acaricida por contacto, ingestión e inhalación, de gran efecto de choque, presentado como concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje. Su persistencia es corta o moderada. Es muy móvil en suelos limosos y arenosimos. Se le considera ligeramente persistente (hasta 1 año).

MALATHION 50 E puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor. No se mezcle con productos de fuerte reacción alcalina.

Formulación: concentrado emulsionable.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Algodonero, pepino, melón, sandía, jitomate, maíz, sorgo, tabaco.



Malathion 1000

MALATHION 1 CONCENTRADO EMULSIONABLE

MALATHION 1000 es un insecticida y acaricida organofosforado no sistémico con actividad por contacto, ingestión e inhalación, de gran efecto de choque presentado como concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje. Su persistencia es corta o moderada. Es muy móvil en suelos limosos y areno-limosos. Se le considera ligeramente persistente (hasta 1 año).

MALATHION 1000 puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor. No se mezcla con productos de fuerte reacción alcalina.

Formulación: concentrado emulsionable.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Algodonero, maíz, sorgo, jitomate, col, coliflor, cártamo, melón, pepino, sandía, nogal pacanero, piña, naranjo, papayo, pastos, tabaco, guayabo, mango, aguacate, manzano, peral.





Vantex

GAMMA CYHALOTRINA I CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN

VANTEX® es un piretroide sintético con actividad insecticida por contacto e ingestión, no sistémico, con buen efecto de choque y buena persistencia presentado en forma de microcápsulas en suspensión. Presenta gran capacidad de penetración.

VANTEX® puede ser aplicado con equipo terrestre o aéreo. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

Formulación: Cápsulas en suspensión.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Aguacatero, algodónero, maíz, sorgo, cebolla, ajo, brócoli, col, coliflor, col de Bruselas, jitomate, tomate de cáscara, chile, berenjena, tabaco.





Naled 90

NALED I CONCENTRADO EMULSIONABLE

NALED 90 es un insecticida-acaricida organofosforado que actúa por contacto estomacal y en menor grado por inhalación; desarrolla gran rapidez de control de insectos chupadores y masticadores.

NALED 90 puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor.
Formulación: Concentrado emulsionable.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Apio, berenjena, brócoli, calabacita, chile, jitomate, lechuga, pepino, melón, naranjo, fresa, algodónero, tabaco, frijol, ornamentales.



Ultravion MC

MALATHION + CIPERMETRINA I CONCENTRADO EMULSIONABLE

ULTRAVION® MC es un insecticida agrícola organofosforado y piretroide sintético no sistémico, que actúan sinérgicamente por acción de contacto e ingestión, de rápida y eficaz acción inicial, controla insectos chupadores y masticadores en una gran diversidad de cultivos y es de bajo impacto al medio ambiente.

ULTRAVION® MC puede ser aplicado con equipos manuales y de tractor. No se mezcla con productos de fuerte reacción alcalina.

Formulación: Concentrado emulsionable.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Maíz, sorgo, limonero, lima, toronjo, naranjo, mandarino, tangerino, cidro, chile, aguacatero





Ultravion ULV

MALATHION I LÍQUIDO CONCENTRADO

ULTRAVION® ULV es un insecticida y acaricida organofosforado no sistémico con actividad por contacto, ingestión e inhalación y de gran efecto de choque presentado en forma de líquido concentrado y bajo poder residual. Interfiere la transmisión de los impulsos nerviosos por inhibición de la colinesterasa.

Formulación: Líquido concentrado.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Algodonero, mango.





Malathion 4%

MALATHION I POLVO

MALATHION® 4% es un Insecticida y acaricida organofosforado no sistémico con actividad por contacto, ingestión e inhalación de gran efecto de choque y bajo poder residual. Presentado como polvo seco para ser aplicado como viene. Su persistencia es corta o moderada. Es muy móvil en suelos limosos y arenolimosos. Se le considera ligeramente persistente (hasta 1 año).

MALATHION® 4% puede ser aplicado por medio de espolvoreadores manuales, motorizados o por avión. Es compatible con insecticidas organoclorados y organofosforados.

Formulación el polvo.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Algodonero, berenjena, col, coliflor, jitomate, papa, frijol, pastos

