

# 26

## INDICACIONES PARA IMPLANTE DE MARCAPASOS.

### Bloqueo Aurículo-Ventricular

1. Bloqueo AV de 2° grado o completo con bradicardia sintomática.
2. Bloqueo AV de 2° grado o completo infranodal.
3. Bloqueo AV de 2° grado o completo con escape nodal  $\leq 40$  lpm.
4. Periodos de asistolia de más de 3 segundos que NO se relacionan con estados de hipervagotonía.
5. Bloqueo AV de 2° grado o completo que se presenta al ejercicio.
6. Después de la ablación del nodo AV realizada para control de frecuencia cardiaca en FA.
7. Bloqueo AV postoperatorio que se estima será persistente.
8. Bloqueo AV de 2° grado que durante un EEG se encuentra que es infrahisiano.
9. Bloqueo AV de 2° Grado en pacientes con Enfermedad neuromuscular (Distrofia muscular miotónica, Síndrome Kearns-Sayre).
10. Bloqueo AV de 1<sup>er</sup> grado que causa síntomas debido al intervalo AV anormal.



# 26

## INDICACIONES PARA IMPLANTE DE MARCAPASOS.

### Disfunción del Nodo AV.

11. Bradicardia sintomática, incluyendo incompetencia cronotrópica -incapacidad para aumentar la FC en respuesta a necesidades metabólicas.
12. Bradicardia sintomática por fármacos necesarios para tratar otras condiciones.
13. Bradicardia sintomática en duda que sea sintomática pero con frecuencia  $\leq 40$  lpm.
14. Síncope de etiología no precisada con evidencia de disfunción del nodo AV.
15. Pausas prolongadas que se presentan al término de arritmias supraventriculares como fibrilación auricular.

### Síndrome del seno enfermo

16. Síncope recurrente en un paciente con hipersensibilidad documentada del seno carotídeo (pausa  $>3$  seg).



# 26

## INDICACIONES PARA IMPLANTE DE MARCAPASOS.

### Síncope Neurocardiogénico

17. Paciente sintomático con pausas  $\geq 3$  segundos, recurrentes o síncope en aquellos en los que la hipotensión no es la causa directa.

### Bloqueo bifascicular (BBF)

18. BBF con BAV *Mobitz* II o completo.
19. BBF con BCRIHH alternante.
20. BBF + Síncope en los que TV ha sido descartada.
21. BBF con tiempo de conducción His-ventrículo  $>100$ ms en un EEF en un paciente sintomático.



# 26

## INDICACIONES PARA IMPLANTE DE MARCAPASOS.

### Post Infarto del miocardio

- 22. BAV de 2º grado o completo infranodal persistente con o sin síntomas.
- 23. BAV avanzado o completo en presencia de BCRIHH en pacientes con un IAM anterior.
- 24. BAV avanzado o completo intranodal sintomático en pacientes con un IAM inferior.

### Para prevenir taquiarritmias

(GENERALMENTE CON UN DAI)

- 25. TV dependiente de pausas (Torsades de pointes).
- 26. Síndrome de QT largo congénito.

