

9.SINIF COĞRAFYA

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN
İKLİM TÜRLERİ






İklim Tipi	En Yağışlı Mevsim	En Az Yağışlı Mevsim	Yağış Türü
Karadeniz	Sonbahar ve Kış	İlkbahar	Yağmur, Kışın kar (OROĞRAFİK)
Akdeniz İklimi	Kış	Yaz	Kışın yağmur, dağlık alanlar kar (CEPHE YAĞIŞLARI)
Karasal İklim	İlkbahar	Kış ve Yaz	İlkbaharda yağmur, kışın kar (KONVEKSİYANEL YAĞIŞ)
Marmara İklimi	Kış	Yaz	Yağmur, kışın karla karışık yağmur (OROĞRAFİK CEPHE YAĞIŞLARI)
Doğu Anadolu İklimi	Kış ve İlkbahar	Yaz	Kışın kar, ilkbaharda yağmur




YAĞIŞ TÜRLERİ




YAMAÇ (OROĞRAFİK) YAĞIŞ



YÜKSELİCİ (KONVEKSİYONEL) YAĞIŞ
KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI(İÇ ANADOLU)




CEPHE (FRONTAL) YAĞIŞ
AKDENİZ İKLİMİ




AKDENİZ İKLİMİ

- Bu iklim, Akdeniz ve Batı Anadolu kıyılarında belirgin olarak görülür. Ayrıca Marmara Denizi kıyıları, İç Batı Anadolu, Göller Yöresi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında da bu iklimin özellikleri hissedilmektedir.
- Yazlar oldukça sıcak, kurak ve uzun; kışlar ise ılık, yağışlı ve kısa sürer. Bu iklimin tipik olarak görüldüğü Akdeniz kıyılarında don olayı az görülür. Marmara kıyılarına doğru enlemin, iç kesimlere doğru da yükselti ve karasallığın etkisi ile yazlar daha serin, kışlar daha soğuk geçer ve yaz kuraklığı daha az hissedilir.




KARADENİZ İKLİMİ

- Yağış rejimi nispeten düzenlidir. Yazlar serin, kışlar ılıktır. En fazla yağış sonbahar, en az ise ilkbaharda düşer.
- Karadeniz kıyılarında etkili olan bu iklim, yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre iç kesimlere sokulabilmektedir. Örneğin Doğu ve Batı Karadeniz'de dar bir kıyı şeridinde görülen bu iklimin etkileri Orta Karadeniz'de iç kesimlere kadar sokulabilmektedir.
- Karadeniz'den esen rüzgârların, denize paralel uzanan dağlara temas edip yükselmesi ile oluşan yamaç yağışları bu iklimin karakterini belirler. Bu nedenle her mevsim yağışlı olan bu iklimde günlük ve yıllık sıcaklık farkları azdır. Ülkemizde en fazla yağışlar bu iklimin etkili olduğu yerlerde görülür.



KARASAL İKLİM

- Ülkemizde yeryüzü şekilleri ve yükseltinin etkisine bağlı olarak denizellik, iç kesimlere yeterince sokulamamaktadır.
- Bunun bir sonucu olarak iç kesimlerde günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla, kışların uzun ve soğuk, yazların ise sıcak ve kurak olduğu karasal iklim özellikleri hüküm sürmektedir.
- Yükseltinin arttığı alanlarda yaz süreleri kısa, don olayları daha fazladır.
- Özellikle Kuzeydoğu Anadolu, bu yönüyle ülkemizde yıllık ortalama sıcaklıkların en düşük olduğu yerdir. İç kesimlerde ilkbahar mevsiminde yaşanan hava koşulları burada yaz mevsiminde görülür.



MARMARA İKLİMİ

Kışları Akdeniz iklimi kadar ılık, yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Karasal iklim kadar kışı soğuk, yazı da kurak geçmemektedir. Bu özelliklerden dolayı Marmara iklimi, karasal Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir.




DOĞU ANADOLU İKLİMİ (KARASAL)

Alçak alanlarda yazlar biraz sıcaktır. Ocak ayı ortalama sıcaklığı $-4,2^{\circ}\text{C}$; temmuz ortalaması $24,2^{\circ}\text{C}$ 'dir. Yıllık yağış ortalaması 579 mm; yıllık ortalama sıcaklık $10,2^{\circ}\text{C}$ 'dir. Yağışın çoğu ilkbahar ve yaz düşer, yaz yağış oranı %20,8'dir.

Doğal bitki örtüsü, yüksek rakımlı yerlerde çayırlardan, düşük rakımlı yerlerde ise bozkırlardan ve bunların çevresindeki yüksek kesimlerde kuru ormanlardan oluşur. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı $-4,2^{\circ}\text{C}$, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı $24,2^{\circ}\text{C}$, yıllık ortalama sıcaklık $10,2^{\circ}\text{C}$ 'dir., yaz yağış oranı %20,8'dir.



Büyük İklim Bölgeleri



BOSS COĞRAFYA

