



Molibo® es una herramienta clave para promover una entrada en receso adecuada de los frutales caducifolios como es el caso de los cerezos, con el fin que los árboles puedan soportar las bajas temperaturas invernales y prepararlos para la próxima temporada de crecimiento.

BENEFICIOS :

- Ayuda a los árboles a acumular carbohidratos.
- Fortalece la madera y la hace más resistente al frío.
- Favorece la entrada en dormancia de los árboles.
- Favorece la traslocación de azúcares para formar reservas en predormancia, además lignificación de madera y yemas para afrontar de mejor forma las posibles heladas en el periodo de dormancia.
- Puede mejorar la productividad de los árboles en la próxima temporada.
- Contiene una alta concentración de molibdeno (11% p/p), y Boro (11% p/p); el Molibdeno es un micronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas.
- Con la aplicación de Molibo en papas, en 2 aplicaciones previas, antes del inicio de heladas, se evidencia que la traslocación va en directo beneficio al tubérculo, y lo más importante es que visualmente se puede observar la mejora de calibres.



MOLIBO® es un Producto Distribuido y Desarrollado en Chile por **VADPAGRO®**

T. +56 9 4868 3811

info@vadpagro.cl

WWW.VADPAGRO.CL



Molibo® es una herramienta clave para promover una entrada en receso adecuada de los frutales caducifolios como es el caso de los cerezos, con el fin que los árboles puedan soportar las bajas temperaturas invernales y prepararlos para la próxima temporada de crecimiento.

APLICACIÓN :

CULTIVO	Momento de aplicación	Foliar
Cerezo	En zonas tempranas con variedades tempranas, primera aplicación 15 marzo, segunda aplicación 5 abril.	0,7 a 1 kg/ha
	En zonas tardías con variedades tardías, primera aplicación 25 marzo, segunda aplicación 15 abril.	0,7 a 1 kg/ha
Uva de mesa vid	En caso de exceso de crecimiento vegetativo	200 – 300 g/ha
Duraznero, Nectarino, Manzano, Peral, Kiwi, Nogal, Almendro y Ciruelo	En caso de exceso de crecimiento vegetativo	200 – 300 g/ha
	Aplicar en postcosecha tardía, cuando el fotoperiodo comience a disminuir o cuando las hojas comienzan el proceso de senescencia natural.	0,7 a 1 kg/ha
Frutillas, Frambuesas y arándanos	En caso de exceso de crecimiento vegetativo.	50 – 100 g/ha
	Aplicar cuando comienza la senescencia natural del cultivo o a terminado ciclo productivo de la temporada	300 – 400 g/ha
Papas	Aplicar desde 45 días a cosecha de los tubérculos. Antes del inicio de las heladas.	0,5 – 0,7 kg/ha



MOLIBO® es un Producto Distribuido y Desarrollado en Chile por **VADPAGRO®**

T. +56 9 4868 3811

info@vadpagro.cl

WWW.VADPAGRO.CL