



# POSEIDON® FERTILIZANTE INORGÁNICO A BASE DE MICRONUTRIENTES

Novedosa formulación a base de nanopartículas de magnesio con Hierro Complejado (No necesita Nitrato de calcio)

## Beneficios en Cerezos:

- Estimula el crecimiento vegetativo y Floral. (Mejora la relación Hoja – Fruto).
- Mejora la curva de Color y Calibre. (Concentra la cosecha).
- Se puede aplicar desde una a dos semanas post cianamida hidrogenada, del 40% al 70% de puntas verdes y sin riesgo de quemar.
- En caso de NO APLICAR Cianamida Hidrogenada y con la planta aun durmiendo, POSEIDON® aporta horas frío, en una dosis de 35 L/Ha + 3L/Ha de Brotovalle N®.
- No necesita acompañarse de Nitrato de Calcio .  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$  .
- 0% cáustico.
- Residuo Cero.

## Instrucciones de aplicación:

Mientras la yema esté cerrada (Post-Cianamida) ó el tejido esté expuesto (Punta verde), se recomienda la aplicación de un surfactante, penetrante y regulador de pH.

Se recomienda aplicar desde 48 horas antes de una lluvia (>3 mm) siempre y cuando se use un penetrante como Dispen pH ó Li700.





# POSEIDON® FERTILIZANTE INORGÁNICO A BASE DE MICRONUTRIENTES

Novedosa formulación a base de nanopartículas de magnesio con Hierro Complejado (No necesita Nitrato de calcio)

Recomendamos aplicar la mezcla con mojamiento del 60% de la mitad de la planta hacia arriba y 40% de la mitad hacia abajo, objetivo del agua pH 6.

Este producto debe agitarse antes de usar

| CULTIVO        | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                                                      | DOSIS                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cerezos        | Aplicar desde una a dos semanas Post Cianamida Hidrogenada y hasta 40% a 70% de puntas verdes.             | 30 L/ha ó 27 L/ha +3 L/ha Brotovalle N . (Moj 1000 L)   |
|                | En caso de NO haber aplicado Cianamida Hidrogenada y la planta aún esté durmiendo .(Aporte de horas frío). | 35 L/Ha + 3L/Ha de Brotovalle N. (Moj 1000 L)           |
| Ciruelo d'agen | Aplicar desde el 5% hasta el 30% de inicio de puntas verdes.                                               | 25 L/ha ó 23L/ha + 2L/ha Brotovalle N. (Moj 1000 L)     |
| Kiwi           | Aplicar a inicio de brotación hasta inicio de punta verde de hojas.                                        | 25 L/ha ó 25L/ha +3 L/ha Brotovalle N .(Moj 800 L)      |
| Uva de mesa    | Aplicar a término de yema alodonosa.                                                                       | 25 L/ha ó 25L/ha + 3L/ha Brotovalle N . (Moj 800 L)     |
| Nogales        | Aplicar desde inicio de brotación (Estados fenológicos Cf a Cf2)                                           | 30 L/ha ó 27 L/ha +3 L/ha Brotovalle N . ( Moj 1200 L ) |



En VADPAGRO® diseñamos **programas personalizados** para cada cultivo con los mejores insumos agrícolas. **Contáctanos** para recibir **recomendaciones precisas hechas por expertos** para maximizar tu producción; Consulta por nuestros programas o por cualquiera de nuestros productos disponibles.

