

GEBELİK KAŞINTILARI SADECE ALERJİK MİDİR?

Hasan Burak Kaya^{1*}, Dilek Atik²

¹Yozgat Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yozgat

²Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Karaman

*Sorumlu yazar, hasanburakkaya@hotmail.com

ÖZET

İntrahepatik gebelik kolestazı genellikle gebeliğin son trimesterinde ortaya çıkan karaciğer fonksiyonlarında anormallik gösteren gebelik kaşıntısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem maternal hem de fetal komplikasyonları göz önüne alındığında akılda tutulması gereken bir tablodur. Biz yazımızda acil servise kaşıntı ile başvuran ve gebelik kolestazı düşünülen 29 haftalık bir gebe olgusundan bahsedeceğiz. Acil servise kaşıntı ile başvuran gebe hastalarda intrahepatik gebelik kolestazı acil servis hekimi için gözden kaçmaması gereken bir tanıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kolestaz, Kaşıntı.

ABSTRACT

Intrahepatic pregnancy cholestasis is usually encountered in the last trimester of pregnancy as pregnancy pruritus with abnormal liver functions. Considering both maternal and fetal complications, it is a table that should be kept in mind. In our article, we will talk about a 29-week pregnant case who presented to the emergency department with itching and was considered to have gestational cholestasis. Intrahepatic pregnancy cholestasis is a diagnosis that should not be overlooked by the emergency room physician in pregnant patients who present to the emergency department with pruritus.

Keywords: Pregnancy, Cholestasis, Itching.