

Brightside Specialty Pharmacy

431 N. Tustin Ave., STE C, Santa Ana, CA 92705

Phone 714-707-5115

Date :8/12/2022

Patient Education for AMOXICILLIN 400 MG/5 ML SUSP



Must complete full course of therapy Space doses evenly Do not use if allergic to penicillins Shake well before using. Tell doctor what medicines you are taking Call doctor if rash or severe diarrhea occur. Discard unused portion after 14 days. Oral or vaginal yeast infections may occur due to changes in flora.

Must use for full length of treatment Space doses evenly throughout the day Do not take if you are allergic to penicillin Shake well before using. Tell doctor what medicines you are taking Call DR if rash or severe diarrhea occur. Discard unused portion after 14 days. Watch for oral thrush or vaginal yeast infections.

.....Education Section.....

IMPORTANTE:

CÓMO USAR ESTA INFORMACIÓN: Este es un resumen y NO

contiene toda la información disponible de este producto. Esta información no garantiza que este producto sea seguro, eficaz o apropiado para usted. Esta información no es una consulta médica individualizada y no pretende sustituir la opinión médica de su profesional sanitario. Siempre consulte a su profesional

MARCAS CONOCIDAS:

Amoxil

crecimiento bacteriano.

Este antibiótico sólo se usa para tratar infecciones sanitario para obtener información más completa sobre este producto y sus necesidades sanitarias específicas.

AMOXICILINA, SUSPENSIÓN - ORAL

La amoxicilina también puede usarse junto con otros medicamentos para tratar úlceras estomacales/intestinales

USOS:

La amoxicilina se utiliza para tratar una amplia variedad

de infecciones bacterianas. Este medicamento es un antibiótico de la familia de las penicilinas. Su acción consiste en detener el Mida cuidadosamente su dosis con una cuchara/dispositivo dosificadores especiales para medicamentos. No utilice una bacterianas. No es eficaz para tratar infecciones virales (por ejemplo, resfriado común, gripe). Usar un antibiótico cuando no es necesario puede hacer que no funcione en la presencia de futuras infecciones. respuesta al tratamiento.

Puede añadir la dosis indicada a leche de fórmula para bebé, causadas por la bacteria H. pylori y para prevenir el regreso de las úlceras.

MODO DE EMPLEO:

Agite bien el envase antes de medir cada dosis.

Beba muchos líquidos mientras toma este medicamento, a menos que su médico le dé otras indicaciones.

cuchara común de uso doméstico, ya que es posible que no obtenga la dosis correcta. Tome este medicamento por vía oral, con o sin

alimentos, según las indicaciones de su médico, generalmente cada 8 ó 12 horas. La dosificación dependerá de su afección médica y recetada, aunque los síntomas desaparezcan unos días después de haberlo empezado. Suspender prematuramente este medicamento leche, jugo, agua o gaseosa de ginger ale, y tomarla inmediatamente. Tómese toda la mezcla para asegurarse de tomar la dosis completa. No mezcle y guarde la mezcla para usarla más tarde.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Puede causar náuseas, vómitos o diarrea.

Informe lo antes posible a su médico o farmacéutico si cualquiera

Para recibir el mayor efecto, use este antibiótico a intervalos de tiempo regulares. Para que le sea más fácil recordar, tome este medicamento en el mismo horario cada día.

Tome este medicamento hasta terminar toda la cantidad

Recuerde que su médico le ha recetado este medicamento porque ha determinado que el beneficio para usted es mayor que el riesgo podría permitir que la bacteria continúe creciendo, lo cual podría producir una recaída de la infección.

Informe a su médico si su afección persiste o empeora. vaginal por hongos (infección fúngica oral o vaginal).

Comuníquese con su médico si nota manchas blancas en la boca, de estos efectos persiste o empeora.

Este medicamento puede manchar temporalmente los dientes. Cepillarse bien los dientes generalmente quitará las manchas y puede prevenirlas.

estomacal/abdominal intenso, ojos/piel amarillentos, orina oscura), fácil aparición de moretones/sangrado.

de sufrir los efectos secundarios. Mucha gente que usa este medicamento no presenta efectos secundarios graves.

El uso de este medicamento por períodos prolongados o reiterados puede provocar aftas orales o una nueva infección inmediatamente a su médico si presenta: diarrea persistente, dolores/calambres abdominales o estomacales, sangre/mucosidad en cambios en las secreciones vaginales u otros síntomas nuevos.

Informe inmediatamente al médico si presenta cualquier efecto secundario grave, incluyendo: signos de enfermedad hepática (como náuseas/vómitos persistentes, pérdida de apetito, dolor incluyendo: fiebre persistente, hinchazón en los ganglios nueva o

que empeora, erupción cutánea, picazón/inflamación (especialmente

En raras ocasiones, este medicamento puede causar una afección intestinal grave causada por una bacteria llamada *C. difficile*.

Esta afección puede producirse durante el tratamiento o semanas, incluso meses, después de haberlo terminado. Informe pueda diferenciarla de erupciones cutáneas que rara vez ocurren y pueden ser un signo de una reacción alérgica grave. Obtenga las heces.

Rara vez ocurre una reacción alérgica muy grave a este medicamento. Sin embargo, busque atención médica de inmediato si nota cualquier síntoma de una reacción alérgica grave, otros efectos no mencionados anteriormente.

En los Estados Unidos - en cara/lengua/garganta), mareos intensos, dificultad para respirar.

La amoxicilina suele producir erupciones cutáneas leves que generalmente no son graves. Sin embargo, es posible que usted no efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a Salud Canadá (Health Canada) al 1-866-234-2345. atención médica de inmediato si observa cualquier erupción cutánea.

Esta no es una lista completa de los posibles efectos secundarios. Comuníquese con su médico o farmacéutico si nota otra alergia. Este producto podría contener ingredientes inactivos que pueden causar reacciones alérgicas u otros

Llame a su médico para consultarlo acerca de los efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

En Canadá - Llame a su médico para consultarlo acerca de los de: enfermedad renal, cierto tipo de infección viral (mononucleosis infecciosa).

PRECAUCIONES:

Antes de tomar amoxicilina, informe a su médico o

farmacéutico si es alérgico a ésta, a antibióticos de la familia de las penicilinas o las cefalosporinas, o si padece de cualquier producto.

La amoxicilina puede reducir la eficacia de las vacunas problemas. Consulte a su farmacéutico para obtener más información.

Antes de usar este medicamento, informe a su médico o farmacéutico acerca de su historial médico, especialmente acerca dentista sobre todos los productos que usa (incluidos los medicamentos con o sin receta y los productos herbales).

La suspensión de amoxicilina puede contener azúcar. Se recomienda precaución si padece de diabetes o cualquier otra afección que requiera que limite/evite el azúcar en su dieta. Consulte a su médico o farmacéutico sobre el uso prudente de este antes de amamantar.

elaboradas con bacterias vivas (por ejemplo, la vacuna contra la tifoidea). Antes de recibir alguna inmunización/vacuna, informe a su profesional de atención médica que está usando amoxicilina.

Antes de someterse a una cirugía, informe a su médico o medicamentos. Lleve consigo una lista de todos los productos que usa (incluidos los medicamentos con receta, sin receta y

Durante el embarazo, sólo use este medicamento cuando sea claramente necesario. Hable con su médico acerca de los riesgos y

los beneficios.

La amoxicilina pasa a la leche materna. Consulte a su médico metotrexato.

La amoxicilina puede producir resultados positivos falsos en

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

Las interacciones

medicamentosas pueden cambiar la acción de sus medicamentos o aumentar su riesgo de sufrir efectos secundarios graves. Este documento no menciona todas las posibles interacciones entre

Este documento no menciona todas las posibles interacciones entre medicamentos. Lleve consigo una lista de todos los productos herbales) y compártala con su médico y farmacéutico. No empiece, suspenda ni cambie la dosificación de ningún medicamento sin la aprobación de su médico.

Un producto que puede interactuar con este medicamento es:

SOBREDOSIS:

En caso de presentar síntomas graves de sobredosis,

como pérdida del conocimiento o dificultades para respirar, llame ciertas pruebas de orina (con sulfato cúprico) para pacientes diabéticos. También puede interferir con los resultados de ciertos análisis de laboratorio. Asegúrese de que el personal de laboratorio y sus médicos sepan que usted usa este medicamento. centro provincial para el control de intoxicaciones. Entre los síntomas de una sobredosis se incluyen diarrea persistente, productos que usa. Comparta esta lista con su médico y farmacéutico para disminuir su riesgo de presentar problemas graves con los medicamentos.

Le han recetado este medicamento únicamente para su afección actual. No lo use más adelante para otra afección, a menos que su al 911. Para situaciones menos urgentes, llame inmediatamente a un centro de control de intoxicaciones. Los residentes de EE.UU. pueden llamar a su centro local de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. Los residentes de Canadá pueden llamar a un supervisor su evolución o detectar efectos secundarios. Consulte a su médico para obtener más información. vómitos intensos, una disminución grave del volumen de orina o convulsiones.

NOTAS:

No comparta este medicamento con nadie.

normalmente. No duplique la dosis para compensar por la dosis omitida.

médico lo indique.

En tratamientos prolongados, periódicamente deben realizarse análisis de laboratorio y/o pruebas médicas (por ejemplo, pruebas de función hepática y renal, hemogramas completos) para refrigerarse. Revise la botella o pregunte a su farmacéutico para saber si puede almacenar (y por cuanto tiempo) este medicamento a

DOSIS OMITIDA:

Si se olvida de una dosis, úsela en cuanto se

acuerde. Si se acerca la hora de la siguiente dosis, no use la dosis omitida. Use su siguiente dosis a la hora que le toque perderá efectividad después de este tiempo.

No deseche medicamentos en el inodoro ni en el desagüe a menos

CONSERVACIÓN:

La refrigeración puede mejorar el sabor de este

medicamento. Algunas marcas de este medicamento pueden expirar antes si se almacenan a temperatura ambiente en lugar de

Última actualización junio 2022.

temperatura ambiente. No lo guarde en el cuarto de baño. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Deseche el medicamento sobrante después de 14 días, ya que

Copyright(c) 2022 First Databank, Inc.

que se lo indiquen. Deseche apropiadamente este producto cuando se cumpla la fecha de caducidad o cuando ya no lo necesite.

Consulte a su farmacéutico o a su compañía local de eliminación de desechos.