

Brightside Specialty Pharmacy

431 N. Tustin Ave., STE C, Santa Ana, CA 92705

Phone 714-707-5115

Date :8/26/2024

Patient Education for NABUMETONE 500 MG TABLET



Take with food to lessen gastrointestinal upset Dispense Medication Guide and explain to patient before use May cause drowsiness or dizziness Use caution driving. Alcohol and tobacco use may increase risk of GI bleeding. Low dose aspirin prophylaxis ok. Avoid other aspirin & NSAIDs. May increase risk of heart attack, stroke or GI bleeding. To avoid esophagitis, drink 8 oz. liquid, remain upright for 10 min. Avoid use in pregnancy from 20 weeks until birth.

Best to take with food to lessen stomach upset Before use, important to read the Medication Guide May make you drowsy or dizzy. Drive with caution Limit alcohol consumption and stop using tobacco. Low dose daily aspirin ok Ask MD about other NSAIDs Watch for bleeding, heart attack or stroke signs. Take with 8 oz. liquid. Do not lie down for 10min Avoid use in pregnancy from 20 weeks until birth

Education Section

IMPORTANTE:

CÓMO USAR ESTA INFORMACIÓN: Este es un resumen y NO

contiene toda la información disponible de este producto. Esta información no garantiza que este producto sea seguro, eficaz o apropiado para usted. Esta información no es una consulta médica individualizada y no pretende sustituir la opinión médica de su profesional sanitario. Siempre consulte a su profesional sanitario para obtener información más completa sobre este producto y sus necesidades sanitarias específicas.

NABUMETONA - ORAL

MARCAS CONOCIDAS:

Relafen

ADVERTENCIA:

En raros casos, los fármacos anti-inflamatorios no

esteroides (incluyendo nabumetona) pueden aumentar el riesgo de sufrir ataques cardíacos o derrames cerebrales. Este efecto puede presentarse en cualquier momento mientras toma este medicamento, pero es más probable que se presente si lo toma durante mucho tiempo. El riesgo podría ser mayor en las personas de edad avanzada, si padece enfermedad cardíaca o si tiene un mayor riesgo de padecer enfermedad cardíaca (por ejemplo, debido al hábito de fumar, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, o afecciones como presión arterial alta o diabetes). No tome este medicamento justo antes ni justo después de una derivación aortocoronaria (CABG, por sus siglas en inglés).

Además, este medicamento puede, con poca frecuencia, causar hemorragia estomacal o intestinal grave (rara vez mortal). Este efecto puede ocurrir sin síntoma o aviso alguno mientras toma este medicamento. Las personas de edad avanzada pueden tener un riesgo mayor de presentar este efecto. Consulte también la sección de Precauciones y la de Interacciones con otros medicamentos.

Suspenda el uso de nabumetona y busque atención médica de inmediato si presenta los siguientes efectos secundarios que rara vez ocurren pero son graves: dolor estomacal/abdominal persistente, heces negras/alquitranadas o con sangre, vómito con aspecto de café molido, dolor de pecho/mandíbula/brazo izquierdo,

falta de aliento, sudoración inusual, debilidad en un lado del cuerpo, cambios repentinos de la vista, dificultad para hablar. Hable con su médico o farmacéutico acerca de los riesgos y beneficios del tratamiento con este medicamento.

USOS:

La nabumetona se usa para aliviar el dolor, la inflamación

y la rigidez de las articulaciones producidos por la artritis.

Este medicamento es un fármaco antiinflamatorio no esteroide (AINE).

Si está tratando una afección crónica como artritis, pregunte a su médico sobre tratamientos no farmacológicos y/o el uso de otros medicamentos para tratar el dolor. Consulte también la sección de Advertencia.

OTROS USOS:

En esta sección se incluyen usos de este medicamento

que no se mencionan en las indicaciones autorizadas, pero que su profesional sanitario podría indicarle. Use este medicamento para cualquiera de las afecciones que se mencionan en esta sección solamente si así se lo ha indicado su profesional sanitario. Este medicamento también puede utilizarse para los ataques de gota.

MODO DE EMPLEO:

Lea la Guía del medicamento que su farmacéutico

le facilita antes de tomar nabumetona y cada vez que renueve su receta. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Tome este medicamento por vía oral según las indicaciones de su médico, por lo general una o dos veces al día con un vaso lleno de agua (240 mililitros u 8 onzas). No se recueste durante por lo menos 10 minutos después de tomarlo. Para prevenir el malestar estomacal, tómelo con alimentos, leche o un antiácido. La dosificación dependerá de su afección médica y respuesta al tratamiento. Para minimizar el riesgo de sufrir efectos secundarios (por ejemplo, sangrado estomacal), use este medicamento en la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible. No aumente la dosis ni tome este medicamento con más frecuencia de lo recetado. Para enfermedades crónicas como la

artritis, continúe tomándolo siguiendo las indicaciones de su médico. Hable con su médico o farmacéutico acerca de los riesgos y los beneficios.

Para el tratamiento de ciertas afecciones (por ejemplo, artritis), es posible que pasen hasta 2 semanas de tratamiento regular con este medicamento antes de que reciba los beneficios completos.

Si está tomando este medicamento "según lo necesite" (sin seguir un régimen de dosificación), recuerde que los medicamentos para el dolor actúan mejor si se usan en cuanto aparecen los primeros signos de dolor. Si deja que el dolor aumente, es posible que el medicamento no sea tan eficaz.

Notifique a su médico si su afección empeora.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Consulte también la sección de Advertencia.

Puede causar malestar estomacal, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, flatulencia, mareos, somnolencia o dolor de cabeza. Informe lo antes posible a su médico o farmacéutico si cualquiera de estos efectos persiste o empeora.

Recuerde que su médico le ha recetado este medicamento porque ha determinado que el beneficio para usted es mayor que el riesgo de sufrir los efectos secundarios. Mucha gente que usa este medicamento no presenta efectos secundarios graves.

Este medicamento puede elevar su presión arterial. Tómese la presión arterial regularmente e informe a su médico si obtiene resultados altos.

Informe inmediatamente a su médico si presenta cualquier efecto secundario grave, incluyendo: cambios en la audición (por ejemplo, zumbido en los oídos), cambios mentales/anímicos, dificultad/dolor al tragar, signos de problemas renales (por ejemplo, cambios en el volumen de orina), síntomas de insuficiencia cardíaca (por ejemplo, hinchazón de tobillos/pies, cansancio inusual, aumento de peso inusual/repentino). Raras veces, este medicamento puede causar enfermedad hepática grave (potencialmente mortal). Si nota cualquiera de los siguientes efectos secundarios muy poco probables pero muy graves, suspenda el uso de nabumetona y comuníquese de inmediato con su médico o farmacéutico: náuseas/vómitos persistentes, orina oscura, dolor estomacal/abdominal intenso, ojos o piel amarillentos.

Rara vez ocurre una reacción alérgica muy grave a este medicamento. Sin embargo, busque atención médica de urgencia si nota cualquier síntoma de una reacción alérgica grave, incluyendo: fiebre, ganglios linfáticos hinchados, erupción cutánea, picazón/inflamación (especialmente en la cara/lengua/garganta), mareos intensos, dificultad para respirar.

Esta no es una lista completa de los posibles efectos secundarios. Comuníquese con su médico o farmacéutico si nota otros efectos no mencionados anteriormente.

En los Estados Unidos -

Llame a su médico para consultarlo acerca de los efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

En Canadá - Llame a su médico para consultarlo acerca de los efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a Salud Canadá (Health Canada) al 1-866-234-2345.

PRECAUCIONES:

Consulte también la sección de Advertencia.

Antes de tomar nabumetona, informe a su médico o farmacéutico si es alérgico a ésta, a la aspirina u otros AINE (por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, celecoxib), o si padece de cualquier otra alergia. Este producto podría contener ingredientes inactivos que pueden causar reacciones alérgicas u otros problemas. Consulte a su farmacéutico para obtener más detalles.

Antes de usar este medicamento, informe a su médico o farmacéutico acerca de su historial médico, especialmente acerca de: asma (incluyendo antecedentes de deterioro de la respiración después de tomar aspirina u otros AINE), problemas de sangrado o de coagulación, pólipos nasales (crecimientos en la nariz), enfermedad cardíaca (por ejemplo, ataque cardíaco previo), presión arterial alta, enfermedad hepática, derrame cerebral, problemas de estómago/intestino/esófago (por ejemplo, sangrado, úlceras, acidez estomacal recurrente).

En ocasiones, el uso de medicamentos AINE, incluyendo nabumetona, puede causar problemas renales. Es más probable que se presenten problemas si está deshidratado, tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, es una persona de edad avanzada o si toma determinados medicamentos (consulte también la sección de Interacciones con otros medicamentos). Tome muchos líquidos según las indicaciones de su médico para prevenir la deshidratación e informe a su médico inmediatamente si presenta un cambio en el volumen de orina.

Antes de someterse a una cirugía, informe a su médico o dentista de todos los productos que usa (incluidos los medicamentos con o sin receta y los productos herbales). Este medicamento puede causar mareos o somnolencia. El alcohol o la marihuana (cannabis) pueden causarle más mareos o somnolencia. No maneje, use maquinaria ni lleve a cabo ninguna actividad que requiera estar alerta, hasta estar seguro de que puede realizar estas actividades sin peligro. Hable con su médico si está usando marihuana (cannabis).

Este medicamento puede causar sangrado estomacal. El consumo diario de alcohol o de tabaco, especialmente cuando se combina con este medicamento, puede aumentar el riesgo de sufrir sangrado estomacal. Limite su consumo de alcohol y deje de fumar. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener información adicional.

Este medicamento puede aumentar la sensibilidad al sol. Limite el tiempo que pasa al sol. Evite las camas y lámparas solares. Cuando esté al aire libre, use crema con protección solar y ropa protectora. Informe inmediatamente a su médico si se quema al sol o si tiene ampollas/enrojecimiento en la piel.

Las personas de edad avanzada pueden tener un riesgo mayor de sufrir sangrado estomacal/intestinal, problemas renales, ataque cardíaco y derrame cerebral mientras usan este medicamento.

Antes de usar este medicamento, las mujeres en edad fértil deben consultar con su médico acerca de los beneficios y riesgos. Informe a su médico si está embarazada o si tiene intención de estarlo. Este medicamento podría causar daño fetal y problemas en el parto/alumbramiento natural. Se desaconseja usarlo desde las 20 semanas de embarazo hasta el parto. Si su médico decide que usted debe usar este medicamento entre las 20 y las 30 semanas de embarazo, use la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo

posible. No debe usar este medicamento después de las 30 semanas de embarazo.

No se sabe si este medicamento pasa a la leche materna.

Consulte a su médico antes de amamantar.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

Las interacciones

medicamentosas pueden cambiar la acción de sus medicamentos o aumentar su riesgo de sufrir efectos secundarios graves. Este documento no menciona todas las posibles interacciones entre medicamentos. Lleve consigo una lista de todos los productos que usa (incluidos los medicamentos con o sin receta y productos herbales) y compártala con su médico y farmacéutico. No empiece, suspenda ni cambie la dosificación de ningún medicamento sin la aprobación de su médico.

Algunos productos que pueden interactuar con este medicamento incluyen: aliskiren, inhibidores de la ECA (por ejemplo, captopril, lisinopril), bloqueadores de los receptores de angiotensina II (por ejemplo, losartán, valsartán), cidofovir, corticosteroides (por ejemplo, prednisona), litio, metotrexato, diuréticos (por ejemplo, furosemida).

Este medicamento puede aumentar el riesgo de sangrado cuando se toma con otros medicamentos que también pueden causar sangrado. Entre algunos ejemplos se incluyen fármacos antiplaquetarios como clopidogrel, anticoagulantes como dabigatrán/enoxaparina/warfarina.

Revise atentamente las etiquetas de todos sus medicamentos de venta con o sin receta médica, porque muchos medicamentos contienen analgésicos/antifebriles (aspirina, AINE como, celecoxib, ibuprofeno o ketorolaco). Estos fármacos son similares a la nabumetona, por lo que tomar alguno de estos mientras toma este medicamento puede aumentar su riesgo de sufrir efectos secundarios. Sin embargo, si su médico le ha indicado tomar aspirina en dosis bajas para prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral (generalmente en dosis de 81 a 162 miligramos al día), siga tomando la aspirina a menos que su médico le indique lo contrario. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener información adicional.

SOBREDOSIS:

En caso de presentar síntomas graves de sobredosis,

como pérdida del conocimiento o dificultades para respirar, llame al 911. Para situaciones menos urgentes, llame inmediatamente a un centro de control de intoxicaciones. Los residentes de Estados Unidos pueden llamar al 1-800-222-1222. Los residentes de Canadá pueden llamar al 1-844-764-7669. Entre los síntomas de una sobredosis se incluyen dolor estomacal intenso, vómito con aspecto de café molido, somnolencia extrema, pérdida del conocimiento, respiración lenta o superficial.

NOTAS:

No comparta este medicamento con nadie.

Es posible que se realicen análisis de laboratorio y/o exámenes médicos (por ejemplo, presión arterial, hemograma completo, pruebas de función hepática y renal) mientras tome este medicamento. Acuda a todas sus citas médicas y de laboratorio. Consulte a su médico para más información.

Los tratamientos no farmacológicos que su médico ha aprobado para la artritis (por ejemplo, pérdida de peso si se necesita, ejercicios de fortalecimiento y acondicionamiento) pueden ayudar a mejorar su flexibilidad, amplitud de movimientos y función de las articulaciones. Consulte a su médico para recibir instrucciones específicas.

DOSIS OMITIDA:

Si le indicaron tomar este medicamento siguiendo

un régimen de dosificación (no sólo "según lo necesite") y omite una dosis, tómela en cuanto se acuerde. Si se acerca la hora de la siguiente dosis, no use la dosis omitida y regrese a su horario de dosificación normal. No duplique la dosis para ponerse al día.

CONSERVACIÓN:

Guarde este producto a temperatura ambiente,

protegido de la luz y la humedad. No lo guarde en el cuarto de baño. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas.

No deseche medicamentos en el inodoro ni en el desagüe a menos que se lo indiquen. Deseche apropiadamente este producto cuando se cumpla la fecha de caducidad o cuando ya no lo necesite.

Consulte a su farmacéutico o a su compañía local de eliminación de desechos.

Última actualización mayo 2024.

Copyright(c) 2024 First Databank, Inc.