

Brightside Specialty Pharmacy

431 N. Tustin Ave., STE C, Santa Ana, CA 92705

Phone 714-707-5115

Date :9/23/2022

Patient Education for NORTRIPTYLINE HCL 10 MG CAP



May cause photosensitive reactions Use sunscreen Reduce or avoid alcohol consumption
Many drug-drug interactions possible with this drug Dispense Medication Guide and explain to patient before use May cause drowsiness or dizziness Use caution driving. Worsening depression/thoughts of suicide should be reported ASAP Check labels on OTC medications for contraindications. Discuss gradual dose reduction with MD before stopping medication

Skin may be more prone to sunburn; Use sunscreen Reduce or avoid drinking alcohol Review all drugs you are taking with your doctor Before use, important to read the Medication Guide May make you drowsy or dizzy. Drive with caution Immediately report to MD any thoughts of suicide. Check warnings on OTC medications. MD may need to reduce the dose before you stop it.

Education Section

IMPORTANTE:

CÓMO USAR ESTA INFORMACIÓN: Este es un resumen y NO

contiene toda la información disponible de este producto. Esta información no garantiza que este producto sea seguro, eficaz o apropiado para usted. Esta información no es una consulta médica individualizada y no pretende sustituir la opinión médica de su profesional sanitario. Siempre consulte a su profesional

MARCAS CONOCIDAS:

Aventyl, Pamelor

prevenir pensamientos/intentos suicidas y proporcionar otros beneficios importantes. Sin embargo, ciertos estudios han sanitario para obtener información más completa sobre este producto y sus necesidades sanitarias específicas.

NORTRIPTILINA - ORAL

muy importante hablar con su médico acerca de los riesgos y los beneficios de los medicamentos antidepresivos (especialmente para

ADVERTENCIA:

Los medicamentos antidepresivos se usan para tratar

una variedad de enfermedades, incluyendo depresión y otros trastornos mentales/anímicos. Estos medicamentos pueden ayudar a posibles pensamientos/intentos suicidas), u otros cambios mentales/anímicos (incluyendo nuevos o más intensos episodios de mostrado que un pequeño número de personas (especialmente las personas menores de 25 años) que toman antidepresivos, para cualquier afección, puede experimentar mayor depresión, otros síntomas mentales/anímicos o pensamientos/intentos suicidas. Es un nuevo antidepresivo o cuando cambia la dosis.

las personas menores de 25 años), aún si no se está tratando una afección mental/anímica. Informe inmediatamente a su médico si nota mayor depresión, el deterioro de otros trastornos psiquiátricos, cambios inusuales en el comportamiento (incluyendo medicamento pertenece a una clase de medicamentos conocidos como antidepresivos tricíclicos. Actúa alterando el equilibrio de ansiedad, ataques de pánico, dificultad para dormir, irritabilidad, impulsos hostiles/de enojo, acciones impulsivas, inquietud intensa, habla muy rápida). Esté especialmente alerta a la aparición de estos síntomas cuando empieza el tratamiento con

que no se mencionan en las indicaciones autorizadas, pero que su profesional sanitario podría indicarle. Use este medicamento para

USOS:

Este medicamento se usa para tratar problemas

mentales/anímicos tales como la depresión. Puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y la sensación de bienestar, aliviar la ansiedad y la tensión, y aumentar su nivel de energía. Este

MODO DE EMPLEO:

Lea la Guía del medicamento que su farmacéutico

ciertas sustancias químicas naturales (neurotransmisores) en el cerebro.

OTROS USOS:

En esta sección se incluyen usos de este medicamento

su médico, generalmente de 1 a 4 veces al día. Si está usando la formulación líquida, mida cuidadosamente la dosis con un cualquiera de las afecciones que se mencionan en esta sección solamente si así se lo ha indicado su profesional sanitario.

Este medicamento también puede usarse para el dolor nervioso. También puede usarse para ayudar a dejar de fumar. respuesta al tratamiento. Para reducir su riesgo de sufrir efectos secundarios (como boca seca, mareos), es posible que su le facilita antes de tomar nortriptilina y cada vez que renueve su receta. Si tiene preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.

Tome este medicamento por vía oral, según las indicaciones de regularmente. Para recordar más fácilmente, tómelo a la misma hora cada día. No aumente su dosis ni use este medicamento con dispositivo/cuchara dosificadores de medicamentos. No utilice una cuchara común de uso doméstico, ya que es posible que no obtenga la dosis correcta.

La dosificación dependerá de su afección médica y de su suspenda este medicamento sin antes consultar a su médico. Algunas afecciones pueden empeorar si lo suspende repentinamente. médico le indique iniciar el tratamiento con una dosis baja que irá aumentando gradualmente. Siga exactamente las indicaciones de su médico.

Para beneficiarse al máximo de este medicamento, tómelo

obtener más información consulte a su médico o farmacéutico. Reporte inmediatamente cualquier nuevo síntoma o deterioro de los más frecuencia o por más tiempo de lo recetado. Su afección no mejorará más rápidamente y si aumentará su riesgo de experimentar efectos secundarios.

Siga tomando este medicamento aunque se sienta bien. No completo.

Informe a su médico si su afección persiste o empeora (como si También, podría sentir síntomas como cambios de humor, dolor de cabeza, cansancio y cambios en el sueño. Para prevenir estos síntomas mientras suspende el tratamiento con este medicamento, es posible que su médico reduzca su dosis gradualmente. Para

Puede causar somnolencia, mareos, boca seca, visión borrosa, estreñimiento, aumento de peso o dificultad para orinar. Si síntomas.

Es posible que este medicamento no funcione inmediatamente. Es posible que note algunos beneficios en una semana. Sin embargo, pueden pasar hasta 4 semanas antes de que sienta el efecto

Para aliviar la boca seca, chupe caramelos (sin azúcar) o pedazos de hielo, mastique goma de mascar (sin azúcar), beba agua su sensación de tristeza aumenta o si tiene pensamientos suicidas).

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Consulte también la sección de Advertencia.

laxante es el mejor para usted.

Recuerde que su médico le ha recetado este medicamento porque cualquiera de estos efectos persiste o empeora, notifique inmediatamente a su médico o farmacéutico.

Si está sentado o recostado, levántese despacio, para minimizar los mareos y el aturdimiento.

efecto secundario grave, incluyendo: acidez estomacal persistente, temblores, expresiones faciales tipo máscara, o use un sustituto de saliva.

Para evitar el estreñimiento, consuma fibra alimentaria, beba suficiente agua y haga ejercicio. También es posible que tenga que tomar un laxante. Pregunte a su farmacéutico qué tipo de síndrome serotoninérgico. El riesgo aumentará si también está tomando otros medicamentos que aumentan los niveles de ha determinado que el beneficio para usted es mayor que el riesgo de sufrir los efectos secundarios. Mucha gente que usa este medicamento no presenta efectos secundarios graves.

Informe inmediatamente a su médico si presenta cualquier síntomas: ritmo cardíaco acelerado, alucinaciones, pérdida de coordinación, mareos intensos, náuseas/vómitos/diarrea intensos, calambres musculares, dolor estomacal/abdominal intenso, menor capacidad/deseo sexual, dolor/aumento del tamaño de los senos.

Este medicamento puede aumentar los niveles de serotonina y, rara vez, puede causar una afección muy grave conocida como cardíaco acelerado/irregular, desmayos, convulsiones, dolor/inflamación/enrojecimiento en los ojos, pupilas dilatadas, serotonina, por lo que es importante que informe a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando (consulte la sección de Interacciones con otros medicamentos). Busque atención médica de urgencia si presenta algunos de los siguientes nota cualquier síntoma de una reacción alérgica grave, incluyendo: erupción cutánea, picazón/inflamación (especialmente

contracciones musculares, fiebre sin motivo aparente, agitación/inquietud inusual.

Busque atención médica de urgencia si presenta cualquier efecto secundario muy grave, incluyendo: mareos intensos, ritmo otros efectos no mencionados anteriormente.

En los Estados Unidos - cambios en la vista (por ejemplo, ver arco iris alrededor de las luces por la noche).

Rara vez ocurre una reacción alérgica muy grave a este medicamento. Sin embargo, busque atención médica de urgencia si efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a Salud Canadá (Health Canada), al 1-866-234-2345.

en cara/lengua/garganta), mareos intensos, dificultad para respirar.

Esta no es una lista completa de los posibles efectos secundarios. Comuníquese con su médico o farmacéutico si nota tricíclicos (como amitriptilina), o si padece de cualquier otra alergia. Este producto podría contener ingredientes inactivos que

Llame a su médico para consultarlo acerca de los efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

En Canadá - Llame a su médico para consultarlo acerca de los de: dificultad para respirar, problemas hepáticos, ataque cardíaco reciente, dificultad para orinar (por ejemplo, debido a

PRECAUCIONES:

Consulte también la sección de Advertencia.

Antes de tomar nortriptilina, informe a su médico o farmacéutico si es alérgico a ésta, a otros antidepresivos antecedentes familiares de suicidio, convulsiones, afecciones que pueden aumentar el riesgo de sufrir convulsiones (como otras pueden causar reacciones alérgicas u otros problemas. Consulte a su farmacéutico para obtener más información.

Antes de usar este medicamento, informe a su médico o farmacéutico acerca de su historial médico, especialmente acerca rápido/irregular grave (rara vez mortal) y en otros síntomas (por ejemplo, mareos intensos, desmayos) que requerirán atención próstata agrandada), hipertiroidismo (tiroides hiperactiva), antecedentes personales o familiares de glaucoma (de ángulo cerrado), antecedentes personales o familiares de enfermedades mentales/anímicas (como trastorno bipolar, psicosis), usar nortriptilina, informe a su médico o farmacéutico acerca de todos los fármacos que toma y si presenta cualquiera de las enfermedades cerebrales, abstinencia alcohólica/de sedantes).

La nortriptilina puede causar una afección que afecta el ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT). Con poca frecuencia, la prolongación del intervalo QT puede resultar en un ritmo cardíaco muerte súbita cardíaca).

Los niveles bajos de potasio o magnesio en la sangre pueden médica de urgencia.

El riesgo de presentar prolongación del intervalo QT puede aumentar si sufre de ciertas afecciones médicas o si está tomando otros medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT. Antes de del uso seguro de nortriptilina.

Este medicamento puede causar somnolencia, mareos o visión siguientes afecciones: ciertos problemas cardíacos (insuficiencia cardíaca, ritmo cardíaco lento, síndrome de Brugada, prolongación

del intervalo QT en el ECG), antecedentes familiares de ciertos problemas cardíacos (prolongación del intervalo QT en el ECG, peligro. Limite su consumo de bebidas alcohólicas. Hable con su médico si está usando marihuana (cannabis).

aumentar su riesgo de presentar prolongación del intervalo QT. El riesgo puede ser mayor si usa ciertos fármacos (por ejemplo, diuréticos) o si sufre de ciertas afecciones médicas, como sudoración intensa, diarrea o vómitos. Hable con su médico acerca del tiempo que pasa al sol. Evite las camas y lámparas solares. Cuando esté al aire libre, use crema con protección solar y ropa borrosa. El alcohol o la marihuana (cannabis) pueden causarle más mareos o somnolencia. No maneje, use maquinaria ni lleve a cabo ninguna actividad que requiera estar alerta o tener buena visión, hasta estar seguro de que puede realizar estas actividades sin alcohólica, enfermedad hepática, o cualquier otra afección que requiera que controle/evite el consumo de alcohol en su dieta.

Antes de someterse a una cirugía, informe a su médico o dentista de todos los productos que usa (incluidos los medicamentos con o sin receta y los productos herbales).

Este medicamento puede aumentar la sensibilidad al sol. Limite tome lectura de sus niveles de azúcar en la sangre y comparta los resultados con su médico. Es posible que su médico necesite protectora. Informe inmediatamente a su médico si se quema al sol o si tiene ampollas/enrojecimiento en la piel.

La presentación líquida de este medicamento puede contener alcohol. Se recomienda precaución si padece diabetes, dependencia prolongación del intervalo QT (ver arriba).

Se recomienda precaución al administrar este medicamento a Consulte a su médico o farmacéutico sobre el uso prudente de este producto.

Si padece diabetes, este medicamento puede hacer más difícil el control de sus niveles de azúcar en la sangre. Periódicamente claramente necesario. Ya que los problemas mentales/anímicos (por ejemplo, depresión, ansiedad, ataques de pánico) no tratados ajustar sus medicamentos antidiabéticos, su programa de ejercicios o su dieta.

Las personas de edad avanzada podrían ser más sensibles a los efectos secundarios de este fármaco, especialmente a la beneficios y los riesgos de usar este medicamento durante el embarazo.

pacientes de edad avanzada, ya que pueden ser más sensibles a sus efectos, especialmente a boca seca, mareos, confusión y dificultad para orinar.

Durante el embarazo sólo use este medicamento cuando sea

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

Las interacciones

medicamentosas pueden cambiar la acción de sus medicamentos o pueden ser una afección grave, no suspenda el uso de este medicamento a menos que su médico se lo indique. Si está planeando un embarazo, queda embarazada o cree que podría estar embarazada, hable inmediatamente con su médico acerca de los productos herbales) y compártala con su médico y farmacéutico. No empiece, suspenda ni cambie la dosificación de ningún medicamento

Este medicamento pasa a la leche materna y podría producir efectos no deseados en el lactante. Consulte a su médico antes de amamantar.

(como alcaloides de belladona), ciertos fármacos para la presión alta (fármacos que actúan en el cerebro como, por ejemplo, aumentar su riesgo de sufrir efectos secundarios graves. Este documento no menciona todas las posibles interacciones entre medicamentos. Lleve consigo una lista de todos los productos que usa (incluidos los medicamentos con receta, sin receta y metaxalona, azul de metileno, moclobemida, fenelzina, procarbazina, rasagilina, safinamida, selegilina, sin la aprobación de su médico.

Algunos productos que pueden interactuar con este medicamento incluyen: arbutamina, anticoagulantes (por ejemplo, warfarina), disulfiram, suplementos tiroideos, fármacos anticolinérgicos tomar este medicamento.

El riesgo de presentar el síndrome serotoninérgico aumentará clonidina, guanabenz).

Tomar inhibidores de la MAO con este medicamento puede causar interacciones medicamentosas graves (potencialmente mortales). Evite tomar inhibidores de la MAO (isocarboxazida, linezolid, fluoxetina/paroxetina, IRSN como duloxetina/venlafaxina). El riesgo de síndrome serotoninérgico puede ser más probable al tranilcipromina) durante el tratamiento con este medicamento. La mayoría de los inhibidores de la MAO tampoco deberían tomarse durante dos semanas antes y después de recibir tratamiento con este medicamento. Pregunte a su médico cuándo empezar o dejar de terbinafina, fármacos para tratar el ritmo cardíaco irregular (como quinidina/propafenona/flecainida). Esta no es una lista si también está tomando otros medicamentos que aumentan los niveles de serotonina. Entre los ejemplos se incluyen fármacos/drogas ilícitas como MDMA/"éxtasis", hierba de San Juan, ciertos antidepresivos (incluyendo ISRS como dofetilida, pimozida, procainamida, quinidina, sotalol y antibióticos macrólidos (como eritromicina). Antes de usar empezar o aumentar la dosis de estos fármacos.

Otros medicamentos pueden afectar la eliminación de nortriptilina de su organismo, lo que afectará el modo de acción de la nortriptilina. Estos fármacos incluyen cimetidina, alcohol, marihuana (cannabis), antihistamínicos (por ejemplo, cetirizina, difenhidramina), medicamentos para dormir o completa.

Además de la nortriptilina, muchos otros medicamentos pueden afectar el ritmo cardíaco (prolongando el intervalo QT en el electrocardiograma), incluyendo, entre otros, amiodarona, productos para las alergias y para la tos y el resfriado), porque pueden contener descongestivos o ingredientes que causan nortriptilina informe a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que esté usando.

Informe a su médico o farmacéutico si también está tomando otros productos que pueden causar somnolencia, incluyendo nortriptilina.

ansiolíticos (por ejemplo, alprazolam, diazepam, zolpidem), relajantes musculares y analgésicos opioides (por ejemplo, codeína).

Revise las etiquetas de todos sus medicamentos (por ejemplo, pueden llamar a su centro local de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. Los residentes de Canadá pueden llamar a un somnolencia. Consulte a su farmacéutico acerca del uso prudente de estos productos.

La nortriptilina es muy similar a la amitriptilina. No use medicamentos que contengan amitriptilina mientras esté usando

NOTAS:

No comparta este medicamento con nadie.

SOBREDOSIS:

En caso de presentar síntomas graves de sobredosis,

como pérdida del conocimiento o dificultades para respirar, llame al 911. Para situaciones menos urgentes, llame inmediatamente a un centro de control de intoxicaciones. Los residentes de EE.UU. secundarios. Asista a todas sus citas médicas. Consulte a su médico para obtener más información.

centro provincial para el control de intoxicaciones. Entre los síntomas de una sobredosis se incluyen somnolencia extrema, alucinaciones, ritmo cardíaco acelerado/irregular, desmayos, respiración lenta/superficial, convulsiones. normalmente. No duplique la dosis para compensar por la dosis omitida.

Es posible que de vez en cuando lo sometan a análisis de laboratorio y/o pruebas médicas (por ejemplo, electrocardiograma, pruebas de función hepática/renal, niveles de nortriptilina en la sangre), para supervisar su evolución o detectar efectos

niños y las mascotas. No deseche medicamentos en el inodoro ni en el desagüe a menos

DOSIS OMITIDA:

Si se olvida de una dosis, tómela en cuanto se

acuerde. Si se acerca la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis omitida. Tome su siguiente dosis a la hora que le toque

Última actualización febrero 2022.

CONSERVACIÓN:

Guarde este producto a temperatura ambiente,

protegido de la luz y la humedad. No lo guarde en el cuarto de baño. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Copyright(c) 2022 First Databank, Inc.

que se lo indiquen. Deseche apropiadamente este producto cuando se cumpla la fecha de caducidad o cuando ya no lo necesite.

Consulte a su farmacéutico o a su compañía local de eliminación de desechos.