

INSTRUCCIONES PARA PREPARARSE PARA SU BIOPSIA DE LA PROSTATA

Antes de su biopsia:

- Dígale a su doctor si esta tomando Aspirina, Plavix, Coumadin, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Aggrenox, Motrin, Ibuprofen, Advil, Excedrin ó cualquier tipo de NSAID ó medicina que prevenga que los cuábulos se formen ó cualquier vitamina que esté tomando. Tiene que PARAR ESTAS MEDICINAS 7 DIAS ANTES DE SU BIOPSIA.
- Siga tomando sus otras medicinas sin ningun cambio
- Dígale al doctor si el día de la biopsia no se siente bien, tiene fiebre, sangre en la orina o dolor / ardor al orinar
- Recoja la receta de los antibioticos para estar listo para el día de la biopsia

El día de su biopsia:

- Empiece a tomar el antibiótico en la mañana el día de su biopsia
- Desayune en la mañana o almuerce. No venga en ayunas. Es buena idea traer un jugo o algo pequeño para comer después de la biopsia
- Le sugerimos que alguien lo acompañe y maneje, pero NO es necesario

Después de la biopsia:

- Tómese la pastilla del antibiótico en la noche
- Puede tomar Tylenol 500 mg cada 4 horas si lo necesita para el dolor
- No empiece ninguna medicina que prevenga cuagulos hasta que ya no vea sangre, pero continúe todas sus otras medicinas
- No levante nada pesado, haga ejercicio muy fuerte o tenga relaciones sexuales por 2-3 días despues de la biopsia
- Es normal tener sangre que salga por el recto o la orina por una semana y sangre en el semen por 4-6 semanas
- Sus resultados estarán listos en una a dos semanas. Tendrá una cita para platicar de las de los resultados en detalle

No es normal si usted:

- Tiene fiebre de 101 F, no puede orinar, tiene mucha sangre en la orina con cuábulos que no se mejoran, tiene mucho dolor o ardor al orinar que no se mejora, tiene dolor en el pecho ó se siente mareado.
- Si siente alguno de estos síntomas, llame al (626) 218 0921 ó vaya a la sala de emergencia

Diana Londoño, MD

412 West Carroll Ave. Suite 200
Glendora, CA 91741
(626) 218 0921