

AVALIAÇÃO

Nome: _____

TESTE DE REFLEXO PRIMITIVO

1



REFLEXO APODRECIDO

- 9 Desenhe bigodes do lábio à orelha
- 0 - perfeito
 - 1 - contraindo
 - 2 - fazendo careta
 - 3 - virando
 - 4 - vira e abre a boca

2



REFLEXO PALMAR

- 5 Desenhe na palma da mão
- 0 - perfeito
 - 1 - contração muscular
 - 2 - contração muscular de 2+ dedos
 - 3 - pegada leve
 - 4 - pegada completa

3



REFLEXO MORO

- 3 Cotovelos da criança para cima e para dentro, olhos fechados, diga a eles para cruzar os braços para tocar os ombros quando ouvirem uma palma.
- 0 - perfeito
 - 1 - pálpebras tremendo
 - 2 - tremor nos olhos e mãos
 - 3 - leve susto
 - 4 - susto severo

4



REFLEXO STN

- 3 Criança de quatro, agarra a cabeça e move-a para cima e para baixo.
- 0 - perfeito
 - 1 - movimento suave
 - 2 - arqueamento suave
 - 3 - mais arqueamento, movimento lateral
 - 4 - movimento severo f/b & s/s

5



REFLEXO ATN

- 3 Criança de quatro, agarra a cabeça e move-a de um lado para o outro.
- 0 - perfeito
 - 1 - flexão leve
 - 2 - flexão moderada
 - 3 - mais flexão começando a ficar perto do chão
 - 4 - queda grave para o lado

6



TÔNICO LAB. REFLEXO

- 3 Criança em pé, olhos fechados, inclina a cabeça para trás e depois para baixo.
- 0 - perfeito
 - 1 - balançar os dedos dos pés
 - 2 - balançar moderadamente
 - 3 - pé fora do chão
 - 4 - queda grave para o lado

Nível 0-4	1	2	3	4	5	6
Apodrecido						
Palmar						
Moro						
STN						
ATN						
Tônico Lab.						

PROPRIOCEPÇÃO

1



NÍVEL 1

1 Perna esquerda para baixo, perna direita para a frente, fora do chão. Segure por 60 segundos.

2



NÍVEL 2

1 Perna esquerda para baixo, perna direita para a frente, fora do chão com travesseiro. Segure por 60 segundos.

3



NÍVEL 3

1 Perna esquerda para baixo, perna direita para a frente, fora do chão, olhos fechados. Segure por 60 segundos.

4



NÍVEL 4

1 Perna esquerda para baixo, perna direita para a frente, fora do chão, sobre o travesseiro, olhos fechados. Segure por 60 segundos.

CRUZAMENTO DA LINHA MÉDIA

1



NÍVEL 1

25 Bata os joelhos para frente e para trás com a mão oposta.

2



NÍVEL 2

25 Marche com a mão oposta e o joelho para cima.

3



NÍVEL 3

25 Marche e olhe para o braço ascendente

4



NÍVEL 4

25 Bata o pé oposto atrás do corpo

Nível 1-4	1	2	3	4	5	6
Propriocepção						
Cruzamento da linha média						

BALANÇA

1



NÍVEL 1

2



NÍVEL 2

3



NÍVEL 3

4



NÍVEL 4

- 1

Ande para frente, calcanhar a ponta do pé, por 10 passos.
- 1

Ande para trás, dedo do pé para curar 10 passos.
- 1


Olhos fechados ande para frente, calcanhar aos dedos do pé, 10 passos.
- 1

Ande para frente, calcanhar aos dedos do pé, 10 passos com a cabeça para trás.

Nível 1-4	1	2	3	4	5	6
Balança						


MOVIMENTO LENTO DOS OLHOS

1




SINAL DE INFINITO

2




ZIGUE ZAGUES

3



PARA CIMA E PARA BAIXO

4



LADO A LADO

Níveis
3 - perfeito
2- dificuldade moderada
1 - dificuldade severa


2 vezes

2 vezes

2 vezes


2 vezes

5



CONVERGÊNCIA DIVERGÊNCIA

6



ESTICAM

- 5

vezes
coloque a caneta a 5cm do nariz e afaste-a 40cm
- 1

vez
Estique os olhos para cada borda e segure por 3 segundos em cada lado do sinal de parada

Nível 1-3	1	2	3	4	5	6
Sinal de infinito						
Ziguezagues						
Para cima/baixo						
Lado a lado						
Convergência divergência						
Esticam						

Nome: _____ Data: _____

SINTOMAS ANO 1

Use esta escala para cada sintoma: Preencha no início e repita a cada 3 meses para acompanhar o progresso.
0 = Não presente **1** = Leve **2** = Moderado **3** = Forte

Mês	0	3	6	9	12	Os sintomas de um reflexo de procura retido incluem:
1.	_____	_____	_____	_____	_____	1. Dificuldades de alimentação: Dificuldade em mastigar, engolir e se alimentar
2.	_____	_____	_____	_____	_____	2. Problemas de fala: Atrasos na fala, ceceo e problemas de articulação
3.	_____	_____	_____	_____	_____	3. Movimento da língua: Movimento da língua ao se concentrar ou fazer movimentos motores finos
4.	_____	_____	_____	_____	_____	4. Babar: Babar persistente
5.	_____	_____	_____	_____	_____	5. Sensibilidade: Sensibilidade a texturas de alimentos, temperaturas e ao redor da boca
6.	_____	_____	_____	_____	_____	6. Mastigação: roer unhas, canetas, coleiras etc.
 Um reflexo de preensão palmar retido pode causar uma série de sintomas, incluindo:						
1.	_____	_____	_____	_____	_____	1. Habilidades motoras finas: Dificuldade em agarrar objetos, escrever, se alimentar e manipular fechos de roupas
2.	_____	_____	_____	_____	_____	2. Caligrafia: Caligrafia confusa, colocar a língua para fora ao escrever e disgrafia (dificuldade em transformar pensamentos em palavras)
3.	_____	_____	_____	_____	_____	3. Fala: Desafios potenciais com fala e articulação
4.	_____	_____	_____	_____	_____	4. Hipersensibilidade tátil: Especialmente nas mãos
5.	_____	_____	_____	_____	_____	5. Direcionalidade: Dificuldade em distinguir esquerda de direita
6.	_____	_____	_____	_____	_____	6. Autocuidado: Dificuldade com habilidades de autocuidado que exigem coordenação motora fina
 Um reflexo de Moro retido pode causar uma série de sintomas, incluindo:						
1.	_____	_____	_____	_____	_____	1. Resposta de sobressalto: Um reflexo de sobressalto exagerado a ruídos, luzes ou movimentos repentinos
2.	_____	_____	_____	_____	_____	2. Habilidades motoras: Má coordenação e equilíbrio, falta de jeito e dificuldade com atividades que exigem coordenação
3.	_____	_____	_____	_____	_____	3. Sensibilidade sensorial: Sensibilidade excessiva ao toque, som, luz, movimento ou quente e frio
4.	_____	_____	_____	_____	_____	4. Instabilidade emocional: Ansiedade, alterações de humor, dificuldade em se acalmar e raiva facilmente desencadeada
5.	_____	_____	_____	_____	_____	5. Padrões de sono: Dificuldade em adormecer, permanecer dormindo ou acordar frequentemente à noite
6.	_____	_____	_____	_____	_____	6. Foco e atenção: Dificuldade de concentração e foco, distração e controle de impulsos deficiente
7.	_____	_____	_____	_____	_____	7. Processamento visual: Problemas de movimento ocular e processamento visual, movimentos oculares e percepção visual diminuída
8.	_____	_____	_____	_____	_____	8. Sistema imunológico: Sistema imunológico comprometido, infecções frequentes e alergias
 Os sintomas de um Reflexo Tônico Cervical Simétrico (STNR) retido incluem:						
1.	_____	_____	_____	_____	_____	1. Postura ruim: Uma postura curvada ou dificuldade para ficar sentado em uma mesa
2.	_____	_____	_____	_____	_____	2. Coordenação mão-olho ruim: Dificuldade para pegar ou rastrear uma bola, ou destreza manual ruim
3.	_____	_____	_____	_____	_____	3. Equilíbrio ruim: Dificuldade para nadar, ou percepção de profundidade ruim
4.	_____	_____	_____	_____	_____	4. Dificuldades de foco: Dificuldade para copiar de um quadro-negro, ou dificuldade para focar de longe para perto
5.	_____	_____	_____	_____	_____	5. Dificuldades de movimento: Pular o engatinhar e ir direto para a caminhada, ou "andar de urso" nas mãos e pés
6.	_____	_____	_____	_____	_____	6. Outras dificuldades motoras: Andar desleixado enquanto está sentado, ou preferir deitar no chão em vez de sentar
7.	_____	_____	_____	_____	_____	7. Problemas de visão: Reflexo de susto exagerado, enjoo de movimento, ou sensibilidade à luz
 O Reflexo Tônico Pescoço Assimétrico Retido (ATNR) pode causar uma variedade de sintomas, incluindo:						
1.	_____	_____	_____	_____	_____	1. Equilíbrio ruim: dificuldade em manter o equilíbrio sentado ou em pé, ou ao mover a cabeça de um lado para o outro
2.	_____	_____	_____	_____	_____	2. Dificuldade com movimentos oculares: rastreamento ocular ruim, movimentos oculares bruscos ou dificuldade em alternar o foco
3.	_____	_____	_____	_____	_____	3. Dificuldade com habilidades motoras finas: dificuldade em escrever, desenhar, abotoar ou usar utensílios
4.	_____	_____	_____	_____	_____	4. Dificuldade com coordenação: dificuldade em coordenar movimentos com ambos os lados do corpo ou dificuldade com coordenação mão-olho
5.	_____	_____	_____	_____	_____	5. Dificuldade com aprendizagem: dificuldade em aprender a andar de bicicleta, jogar ou pegar uma bola ou copiar do quadro
6.	_____	_____	_____	_____	_____	6. Atrasos no desenvolvimento: atrasos em marcos do desenvolvimento motor, como engatinhar ou andar
7.	_____	_____	_____	_____	_____	7. Dificuldade com postura: má postura ou dificuldade em manter o lugar ao copiar
8.	_____	_____	_____	_____	_____	8. Dificuldade com processamento sensorial: dificuldade com processamento sensorial ou desafios com dicas sociais
 Os sintomas de um reflexo labiríntico tônico (RLT) retido incluem:						
1.	_____	_____	_____	_____	_____	1. Má postura: Curvar-se, curvar-se ou sentar com as pernas em W.
2.	_____	_____	_____	_____	_____	2. Tônus muscular fraco: Baixo tônus muscular ou dificuldade em manter uma postura ereta.
3.	_____	_____	_____	_____	_____	3. Equilíbrio ruim: Equilíbrio instável, dificuldade para avaliar o espaço ou enjoo.
4.	_____	_____	_____	_____	_____	4. Coordenação ruim: Dificuldade em coordenar movimentos para esportes ou escrever.
5.	_____	_____	_____	_____	_____	5. Desafios visovestibulares: Tontura ao virar a cabeça, dificuldade para ver de perto ou longe ou dificuldade para movimentar os olhos.
6.	_____	_____	_____	_____	_____	6. Consciência espacial ruim: Desorganização, esquecimento ou dificuldade para avaliar distâncias.
7.	_____	_____	_____	_____	_____	7. Dificuldades de aprendizagem: Dificuldade em ler, escrever ou fazer contas, ou má compreensão.
8.	_____	_____	_____	_____	_____	8. Problemas comportamentais: Inquietação, inquietação ou dificuldade para prestar atenção.
9.	_____	_____	_____	_____	_____	9. Medo de altura: Medo de altura ou de evitar o parquinho.

Nome: _____ Data: _____

SINTOMAS ANO 2

Use esta escala para cada sintoma:
0 = Não presente 1 = Leve 2 = Moderado 3 = Forte

Mês 15 18 21 24

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Os sintomas de um reflexo de procura retido incluem:

- 1. Dificuldades de alimentação: Dificuldade em mastigar, engolir e se alimentar
- 2. Problemas de fala: Atrasos na fala, ceceo e problemas de articulação
- 3. Movimento da língua: Movimento da língua ao se concentrar ou fazer movimentos motores finos
- 4. Babar: Babar persistente
- 5. Sensibilidade: Sensibilidade a texturas de alimentos, temperaturas e ao redor da boca
- 6. Mastigação: roer unhas, canetas, coleiras etc.

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Um reflexo de preensão palmar retido pode causar uma série de sintomas, incluindo:

- 1. Habilidades motoras finas: Dificuldade em agarrar objetos, escrever, se alimentar e manipular fechos de roupas
- 2. Caligrafia: Caligrafia confusa, colocar a língua para fora ao escrever e disgrafia (dificuldade em transformar pensamentos em palavras)
- 3. Fala: Desafios potenciais com fala e articulação
- 4. Hipersensibilidade tátil: Especialmente nas mãos
- 5. Direcionalidade: Dificuldade em distinguir esquerda de direita
- 6. Autocuidado: Dificuldade com habilidades de autocuidado que exigem coordenação motora fina

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____

Um reflexo de Moro retido pode causar uma série de sintomas, incluindo:

- 1. Resposta de sobressalto: Um reflexo de sobressalto exagerado a ruídos, luzes ou movimentos repentinos
- 2. Habilidades motoras: Má coordenação e equilíbrio, falta de jeito e dificuldade com atividades que exigem coordenação
- 3. Sensibilidade sensorial: Sensibilidade excessiva ao toque, som, luz, movimento ou quente e frio
- 4. Instabilidade emocional: Ansiedade, alterações de humor, dificuldade em se acalmar e raiva facilmente desencadeada
- 5. Padrões de sono: Dificuldade em adormecer, permanecer dormindo ou acordar frequentemente à noite
- 6. Foco e atenção: Dificuldade de concentração e foco, distração e controle de impulsos deficiente
- 7. Processamento visual: Problemas de movimento ocular e processamento visual, movimentos oculares e percepção visual diminuída
- 8. Sistema imunológico: Sistema imunológico comprometido, infecções frequentes e alergias

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____

Os sintomas de um Reflexo Tônico Cervical Simétrico (STNR) retido incluem:

- 1. Postura ruim: Uma postura curvada ou dificuldade para ficar sentado em uma mesa
- 2. Coordenação mão-olho ruim: Dificuldade para pegar ou rastrear uma bola, ou destreza manual ruim
- 3. Equilíbrio ruim: Dificuldade para nadar, ou percepção de profundidade ruim
- 4. Dificuldades de foco: Dificuldade para copiar de um quadro-negro, ou dificuldade para focar de longe para perto
- 5. Dificuldades de movimento: Pular o engatinhar e ir direto para a caminhada, ou "andar de urso" nas mãos e pés
- 6. Outras dificuldades motoras: Andar desleixado enquanto está sentado, ou preferir deitar no chão em vez de sentar
- 7. Problemas de visão: Reflexo de susto exagerado, enjoo de movimento, ou sensibilidade à luz

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____

O Reflexo Tônico Pescoço Assimétrico Retido (ATNR) pode causar uma variedade de sintomas, incluindo:

- 1. Equilíbrio ruim: dificuldade em manter o equilíbrio sentado ou em pé, ou ao mover a cabeça de um lado para o outro
- 2. Dificuldade com movimentos oculares: rastreamento ocular ruim, movimentos oculares bruscos ou dificuldade em alternar o foco
- 3. Dificuldade com habilidades motoras finas: dificuldade em escrever, desenhar, abotoar ou usar utensílios
- 4. Dificuldade com coordenação: dificuldade em coordenar movimentos com ambos os lados do corpo ou dificuldade com coordenação mão-olho
- 5. Dificuldade com aprendizagem: dificuldade em aprender a andar de bicicleta, jogar ou pegar uma bola ou copiar do quadro
- 6. Atrasos no desenvolvimento: atrasos em marcos do desenvolvimento motor, como engatinhar ou andar
- 7. Dificuldade com postura: má postura ou dificuldade em manter o lugar ao copiar
- 8. Dificuldade com processamento sensorial: dificuldade com processamento sensorial ou desafios com dicas sociais

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
- 7. _____
- 8. _____
- 9. _____

Os sintomas de um reflexo labiríntico tônico (RLT) retido incluem:

- 1. Má postura: Curvar-se, curvar-se ou sentar com as pernas em W.
- 2. Tônus muscular fraco: Baixo tônus muscular ou dificuldade em manter uma postura ereta.
- 3. Equilíbrio ruim: Equilíbrio instável, dificuldade para avaliar o espaço ou enjoo.
- 4. Coordenação ruim: Dificuldade em coordenar movimentos para esportes ou escrever.
- 5. Desafios visovestibulares: Tontura ao virar a cabeça, dificuldade para ver de perto ou longe ou dificuldade para movimentar os olhos.
- 6. Consciência espacial ruim: Desorganização, esquecimento ou dificuldade para avaliar distâncias.
- 7. Dificuldades de aprendizagem: Dificuldade em ler, escrever ou fazer contas, ou má compreensão.
- 8. Problemas comportamentais: Inquietação, inquietação ou dificuldade para prestar atenção.
- 9. Medo de altura: Medo de altura ou de evitar o parquinho.