



Timothy Thomason, MD
Constance Zhou, MD

Instrucciones postoperatorias

Niño - Amigdalectomía y adenoides

- Tome las recetas con las instrucciones. Use el medicamento recetado para el dolor según las instrucciones cuando sea necesario. Puede usar Tylenol regular líquido o Motrin de los niños según las instrucciones de la botella. Sin embargo, el medicamento para el dolor recetados ha Tylenol en él también así que usted debe esperar hasta la siguiente dosis se debe evitar dar demasiado Tylenol. Si su niño tiene dolor significativo, incluso mientras está tomando el medicamento para el dolor recetados entonces usted puede alternar el medicamento con receta médica con niños Motrin (ibuprofeno) y escalonar la dosis de manera que la medicina del dolor se puede administrar cada 3 horas.
- Anime a su niño a beber mucho líquido para prevenir la deshidratación. Agua, leche, jugo o Gatorade son las adecuadas. alimentos blandos será menos doloroso de tragar inicialmente. Esto podría incluir una sopa, gelatina, salsa de manzana, etc Evite duros, crujientes y calientes o alimentos picantes porque estos vuelva a lastimar. Aparte de esto no hay restricciones en la dieta. Deje que su hijo coma lo que les gusta comer y lo que es el más cómodo para tragar.
- Evite las actividades intensas durante dos semanas.
- Permanecer en la ciudad por dos semanas si es posible.
- Evite el uso de pajitas o poner cualquier objeto en la boca que puede meter los sitios quirúrgicos.
- Los siguientes síntomas son normales después de esta cirugía:
 - o dolor de garganta y / o dolor de oído
 - o Fiebre
 - El mal aliento o película o amarillo o de color crema en la garganta cuando las amígdalas se.
 - El ronquido o A veces es mucho mejor, incluso en la primera noche, pero no pueden realmente mejorar hasta que sane la garganta y disminuye la inflamación.
- Llame al número Dr. Thomason de la oficina (972) 253-4250 si su hijo experimenta alguno de los siguientes:
 - o sangrado de la nariz o la boca o vómitos con sangre. Si esto ocurre traer a su hijo al Centro Médico Las Colinas Sala de Emergencias (ubicado en la esquina de MacArthur y Hwy 161). Asegúrese de notificar a la Dra. Thomason en su camino.
 - Los signos de deshidratación o como una boca seca, disminución de la orina, e irritabilidad.
 - o vómito que dura más de 8 horas.
 - o Incapacidad o para ingerir líquidos.
 - o Dificultad para respirar.



Timothy Thomason, MD
Constance Zhou, MD

o Excesiva somnolencia o letargo, esto puede ser una señal de que el medicamento para el dolor debe ser disminuido.

- Llame al número Dr. Thomason o Dr. Zhou de la oficina (972) 253-4280 si usted tiene cualquier otra pregunta o preocupación que no se tratan en esta página.