

Cuota No:

Galpón No:

Período:

Fecha de
entrada :

Litera seca, sin moho, plumas ni excremento de aves silvestres, sin productos nocivos y sin bordes cortantes.
Litera de los pollos cambiada antes de la separación de los pavo N.A.

Calidad de los polluelos	A la llegada		Después de 3-4 días	
	Aceptable	Inaceptable	Aceptable	Inaceptable
Alerta y vigoroso				
Saludable				
Aspecto uniforme				
Hidratación				

Sección PSAF: Puntos críticos a dominar (medicación preventiva y curativa)

Rodee la clase de alimento y el período de retiro del medicamento (si aplicable) directamente en los recibos de entrega del alimento.

Antes de la entrega del alimento sin período de retiro, silo golpeado y vaciado.

Si silo único: vacío o parte baja del cono N.A.

¿Los pollos han estado enfermos y han sido tratados con algún medicamento?

sí no Si sí, completar la FIT y el Reg de la medicación.

En caso afirmativo Silo o líneas de agua vaciadas después del tratamiento.

Fecha de paso al alimento sin período de retiro* : _____ ou Programa alimenticio sin período de retiro

*Fecha que corresponde a la columna Fecha del último tratamiento en FIT y que sirve para calcular la Fecha de comercialización (cálculo: fecha de paso + período de retirada del medicamento + 1 día)

Registro del dosificador de medicamento

Requisito del PSAF: Calibración del medicamento antes de cada adición de medicamento.

	FETCHA	Calibración √	Método de calibración *	Enjuague √	Diferencias observadas Sí/ No	En caso afirmativo, medidas correctivas (ej.: Reparación, compra)
1					SÍ NO	
2					SÍ NO	

* 1: 100 = 100 ml de agua bombeada por el dosificador de medicamento corresponden a 10 litros de agua recogida.

1 : 128 = 1 onza de agua bombeada por el dosificador de medicamento corresponde a 1 galón de agua recogida.

Section PST

Compruebe a diario:

Confort térmico de los pavos

Agua y alimento a voluntad

Calidad del agua y del alimento adecuado

Calidad y confort adecuado de la litera (humedad)

Estado de salud (signos clínicos: aumento de la mortalidad, respiración ruidosa, consumo, excrementos, cojera, plumaje, lesiones)

Temperatura adecuada

Ventilación adecuada

Pavos observados al menos 2 veces/día

Humedad adecuada (50-70%)

Amoniaco (máx 25 ppm)

Programa luminoso

Deberán registrarse todas las diferencias, razones y medidas correctivas (p. ej., última columna de la tarjeta de mortalidad).

Confirmo que las exigencias del Programa de Cuidado de las manadas (PST) y del Programa de Salubridad en la Granja (PSAF) han sido comprobadas diariamente:

Firma : _____ Fetcha _____

Registro de visitantes

Fetcha	Nombre	¿Ha estado el visitante en contacto con aves de corral en las 24 horas anteriores a la visita?	
		SÍ	NO
		SÍ	NO
		SÍ	NO
		SÍ	NO