



BIOSÉCURITÉ : LISTE DE VÉRIFICATION POUR LA FORMATION DU PERSONNEL

En tout temps, il est important d'adapter nos actions pour empêcher l'introduction des maladies par la porte d'entrée du poulailler. **Quoi de mieux qu'une rencontre avec votre famille et vos employé(es) pour leur expliquer l'importance que vous accordez à la biosécurité?** **Pour ne rien oublier, cochez les 5 points à vérifier avec eux.**

■ Discutez des principaux enjeux de biosécurité

Trois enjeux ont été observés dans les fermes de poulets/dindons infectées par la grippe aviaire :



Contamination de l'environnement



Proximité d'un plan d'eau




Bris de biosécurité à l'entrée du poulailler

■ Expliquez les moyens pris pour préserver la santé de vos volailles

Observez la conception de l'entrée du poulailler qui sépare physiquement l'espace extérieur de l'espace intérieur.

Entrée de poulailler à 2 zones



Source : EQCMA

***Banc** avec muret jusqu'au sol ou autre délimitation physique complète
PAC : point d'accès contrôlé **ZAC** : zone d'accès contrôlé **ZAR** : zone d'accès restreint



Visionnez les 2 vidéos sur l'entrée du poulailler ensemble

<https://evqdirect.ca/influenza-aviaire>





Pour 5 minutes ou 2 heures dans le poulailler, suivez ces mêmes étapes.

■ Pratiquez-vous à entrer et à sortir

1. Entrez dans le poulailler et accrochez vos vêtements d'extérieur
2. Assoyez-vous sur le banc et retirez vos chaussures d'extérieur sans toucher le plancher
3. Enfilez les chaussures dédiées au poulailler sans toucher le plancher de l'espace intérieur avec vos bas
4. Lavez/désinfectez vos mains
5. Enfilez vos vêtements dédiés au poulailler

■ Revoyez les autres mesures à prendre pour éviter la contamination



Une cour propre

Entretenez le chemin de ferme et la cour. Des surfaces nivelées, sans flaque d'eau ni boue, réduisent le risque d'introduction des maladies. Désinfectez les roues des véhicules à l'entrée et à la sortie des fermes d'une zone de contrôle primaire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sera beaucoup plus facile et efficace.



Une entrée ultra propre

Utilisez un banc allant jusqu'au sol pour empêcher la matière organique de l'espace extérieur de contaminer le plancher de l'espace intérieur. Balayez souvent les planchers avec un balai dédié à chaque espace. Désinfectez ensuite les planchers des espaces avec un pulvérisateur.



Un nouveau départ entre les élevages

Lavez et désinfectez le poulailler incluant l'entrée et les passages. Préchauffez le poulailler pendant 3 jours à 30 °C, juste avant l'arrivée des poussins/dindonneaux, pour détruire le virus de la grippe aviaire.

■ Partagez nos infos sur la grippe aviaire à tout votre personnel



- **Surveillez vos courriels** car l'infolettre NOUVAiles Express est une mine d'informations
- **Visitez le site des EVQ** au <https://evqdirect.ca/influenza-aviaire>
- **Visitez le site de l'EQCMA** au <http://www.eqcma.ca/>

Contactez l'équipe des auditeurs

à l'adresse : audits.evq@upa.qc.ca