

Risques d'introduction de la maladie



La principale **menace** d'introduction du virus dans les bâtiments est par **les fientes** contaminées d'oiseaux porteurs ou infectés par la maladie.

Les éléments majeurs à **contrôler** pour éviter d'introduire la grippe aviaire dans les poulaillers sont:

1. Les **changements de bottes** systématique par tous
2. Visites essentielles seulement
3. Désinfection **du plancher de l'entrée quotidiennement**
4. Le lavage et désinfection des **pneus de tracteur qui vide le fumier**
5. Le lavage et désinfection des pneus de tracteur avant d'entrer dans le poulailler pour épandre la ripe
6. Nettoyage fréquent de la **base des silos et nivelage des flaques d'eau** afin de ne pas attirer les oiseaux sauvages

Nous vous invitons à organiser une réunion d'équipe avec la famille et les employés sur l'application rigoureuse des mesures de biosécurité essentielles.

GRIPPE AVIAIRE

(influenza aviaire IA)



Attention
où vous mettez
les pieds!

Lorsque vous entrez
dans le poulailler,
**changez
vos bottes.**



Pour vous tenir informer

NOUVAiles
express



L'infolettre

Pas encore abonné? Envoyez-nous un
courriel à volailles@upa.qc.ca

Les Éleveurs de volailles
du Québec

Accueil Convention et règlements Programmes à la ferme Nous joindre

GRIPPE AVIAIRE

(influenza aviaire IA)



Attention
où vous mettez
les pieds!

Lorsque vous entrez
dans le poulailler,
**changez
vos bottes.**



Portail pour les
éleveurs evqdirect.ca

Vous avez une question? Contactez les Éleveurs de volailles du Québec au 514 556-1679.
Pour rejoindre:

- Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA): 1 88-volaille
- (1 888 652-4553)
- ACIA: 1 866 806-4115