


Tratamientos

<i>Información del ensayo</i>			
Superficie de ensayo: 1 ha			
Tratamientos			
Tratamientos	Producto	Dosis	Momento aplicación
T1: Manejo estándar			
T2: BIOFORCE	Bio-Force	2,0 l/ha 2,0 l/ha	1 ° Plena flor 2° 7 días después


Resultados

Cuaja de frutos




La tendencia de la figura indica que ambos tratamientos reportan una cantidad de frutos cuajados bastante similar.

Rendimiento




El rendimiento promedio de las plantas tratadas con Bio-Force es un 14,3 % mayor al rendimiento de las plantas bajo manejo estándar.

Calibre




La fruta procedente del tratamiento Bio-Force se extiende a calibres superiores, ya que el 72,3% de la fruta tratada con el bioestimulante tiene un calibre igual o superior a los 13 mm; comparado con el 3,7% alcanzado por el tratamiento manejo estándar.

Cuaja de frutos




La tendencia de la figura indica que ambos tratamientos reportan una cantidad de frutos cuajados bastante similar.

Rendimiento



El rendimiento promedio de las plantas tratadas con Bio-Force es un 14,3 % mayor al rendimiento de las plantas bajo manejo estándar.

Calibre



La fruta procedente del tratamiento Bio-Force se extiende a calibres superiores, ya que el 72,3% de la fruta tratada con el bioestimulante tiene un calibre igual o superior a los 13 mm; comparado con el 3,7% alcanzado por el tratamiento manejo estándar.