


Tratamientos

<i>Información del ensayo</i>			
Tratamientos			
Tratamientos	Producto	Dosis	Momento aplicación
T1: Manejo estándar			
T2: BIOFORCE	Bio-Force	2,0 l/ha 2,0 l/ha	20-30% flor abierta 80% de flor abierta

Resultados

Calibre




La fruta procedente del tratamiento con Bio-Force se extiende a calibres más grandes, con un 40% de fruta clasificada como "AA (73- <80 mm)"; comparado con el 20% alcanzado por el tratamiento manejo estándar.

Firmeza




La muestra cosechada de ambos tratamientos se encuentra dentro de un intervalo de valores de firmeza bastante similar. Siendo para el tratamiento manejo estándar entre 4,6 y 7,3 Kg/cm² y para el tratamiento Bio-Force entre 4,7 y 7,0 Kg/cm²

Contenido de Sólidos Solubles




El tratamiento manejo estándar reporta una mayor proporción de fruta (90%) con un contenido de sólidos solubles bajo, menor o igual a 14°B; en comparación a la fruta del tratamiento con Bio-Force (70%).

Calibre



La fruta procedente del tratamiento con Bio-Force se extiende a calibres más grandes, con un 40% de fruta clasificada como “AA (73- <80 mm)”; comparado con el 20% alcanzado por el tratamiento manejo estándar.


Firmeza



La muestra cosechada de ambos tratamientos se encuentra dentro de un intervalo de valores de firmeza bastante similar.

Siendo para el tratamiento manejo estándar entre 4,6 y 7,3 Kg/cm² y para el tratamiento Bio-Force entre 4,7 y 7,0 Kg/cm²

Contenido de S ó lidos Solubles



El tratamiento manejo estándar reporta una mayor proporción de fruta (90%) con un contenido de solidos solubles bajo, menor o igual a 14°B; en comparación a la fruta del tratamiento con Bio-Force (70%).