

# Tratamientos

## Información del ensayo

Superficie de ensayo: 3 ha

**Mojamiento:** 100 l/ha\*


\* Aplicación con electroestática

## Tratamientos


Tratamientos	Dosis	Momento aplicación
T1: Biozyme TF	2,5 l/ha	1° Baya de 14 -16 mm
	2,5 l/ha	2° 7 días después
T2: Bio-Force	2,5 l/ha	1° Baya de 14 -16 mm
	2,5 l/ha	2° 7 días después

# Resultados

## Precocidad de cosecha




## Rendimiento




El rendimiento promedio de las plantas tratadas con Bio-Force es un 10,9% mayor que el reportado por las plantas tratadas con Biozyme TF.

## Calibre




El 58,8% de la fruta tratada con Bio-Force está clasificada con calibre XL y XXL; mientras que solamente el 38,3% de la fruta tratada con Biozyme TF alcanza un calibre XL.

# Precocidad de cosecha




# Rendimiento



El rendimiento promedio de las plantas tratadas con Bio-Force es un 10,9% mayor que el reportado por las plantas tratadas con Biozyme TF.

# Calibre



El 58,8% de la fruta tratada con Bio-Force esta clasificada con calibre XL y XXL; mientras que solamente el 38,3% de la fruta tratada con Biozyme TF alcanzo un calibre XL.