Tratamientos

Información del ensayo	
Superficie de ensayo: 1 ha	**Mojamiento:** 70 l/ha * Aplicación con electroestática junto a surfactante siliconado

Tratamientos		
Tratamientos	**Dosis**	**Momento aplicación**
T1: Manejo estándar (Splendor)	1 mg/ha	Post shatter
T2: BIOFORCE	3,0 l/ha	Post shatter

Resultados

Peso de la fruta



La fruta cosechada de ambos tratamientos presenta un intervalo de peso de racimos bastante similar.
El tratamiento manejo estándar reporta racimos entre los 255 a 1.240 gr y el tratamiento Bio-Force entre 260 a 1.250 gr.

Calibre



La fruta procedente de plantas bajo manejo estándar (Splendor) se extiende a calibres más grandes, el 75,4% de los racimos con calibres iguales o superiores a los 21 mm.

La fruta proveniente de plantas tratadas con Bio-Force se concentra en calibres medianos, con un 94% de racimos con calibres entre los 19 y los 22 mm.

Contenido de S ó lidos Solubles



La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles un 4,9% superior al valor reportado por la fruta bajo manejo estándar.

Peso de la fruta



La fruta cosechada de ambos tratamientos presenta un intervalo de peso de racimos bastante similar.

El tratamiento manejo estándar reporta racimos entre los 255 a 1.240 gr y el tratamiento Bio-Force entre 260 a 1.250 gr.

Calibre



La fruta procedente de plantas bajo manejo estándar (Splendor) se extiende a calibres más grandes, el 75,4% de los racimos con calibres iguales o superiores a los 21 mm.

La fruta proveniente de plantas tratadas con Bio-Force se concentra en calibres medianos, con un 94% de racimos con calibres entre los 19 y los 22 mm.

Contenido de S ó lidos Solubles



La fruta tratada con Bio-Force reporta un contenido de sólidos solubles un 4,9% superior al valor reportado por la fruta bajo manejo estándar.