

POSOLOGÍA RECOMENDADA

A.- Enfermedades Infecto-Contagiosas

↖ Herpes Zoster	Esquema I: 1 U c/48 hrs. hasta completar 3 U Esquema II: 1 U c/24 hrs. hasta completar 3 U Posteriormente 1 U c/48 hasta completar 2 U
↖ VHS Virus Herpes Simplex tipo 1 y 2, Herpes Genital	1 U c/8 días, hasta completar 5 U Posteriormente 1 U c/15 días hasta completar 5 U
↖ Queratitis herpética en fase aguda, Gingivostomatitis herpética y demás afecciones orales	1 U c/48 hrs. hasta completar 3 U
↖ Queratitis herpética recidivante	1 U c/8 días hasta completar 5 U
↖ Varicela grave	1 U c/24 hrs. hasta completar 2 U 1 U c/48 hrs. hasta completar 3 U
↖ Sarampión grave	1 U c/24 hrs. hasta completar 5 U 1 U c/48 hrs. hasta completar 5 U
↖ Paperas	1 U c/24 hrs. hasta completar 3 U 1 U c/48 hrs. hasta completar 3 U
↖ Papilomatosis laríngea	1 U c/72 hrs. hasta completar 3 U 1 U c/8 días de 7 a 15 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Neuritis posherpética	1 U c/24 hrs. hasta completar 5 U 2 U c/semana hasta completar 8 U 1 U c/semana de 4 a 12 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Mononucleosis infecciosa (fase aguda)	1 U c/48 hrs. hasta completar 3 U
↖ (fase crónica)	1 U c/48 hrs. hasta completar 5 U Repetir si es necesario
↖ Citomegalovirus (CMV)	1 U c/4 días hasta completar 5 U
↖ Síndrome de fatiga crónica	1 U c/8 días hasta completar 15 a 20 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Hepatitis viral	1 U c/48 hrs. de 10 a 15 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Hepatitis fulminante	1 U c/4 hrs. hasta completar 30 U
↖ Dengue	1 U c/48 hrs. hasta remisión del cuadro
↖ Verrugas vulgares multitratadas	1 U c/8 días de 5 a 10 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Tuberculosis	1 U c/8 días hasta completar 10 U
↖ Sinusitis crónica	1 U c/8 días de 5 a 10 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Infecciones respiratorias de repetición	1 U c/8 días de 5 a 10 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Infecciones urinarias de difícil manejo	1 U c/4 días de 5 a 10 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Síndrome diarreico de difícil manejo	1 U c/8 días hasta completar 5 U
↖ Sepsis	2 U al inicio y 1 U c/12 hrs. hasta completar 20 U
↖ DIABETES:	
↖ Paciente multiinfectado descompensado	1 U c/24 hrs. hasta completar 10 U
↖ Pié diabético	1 U c/8 días de 5 a 10 U (dependiendo respuesta del paciente)
↖ Osteomielitis crónica	1 U c/4 días de 10 a 15 U (dependiendo respuesta del paciente) 1 U c/8 días hasta completar 5 U

*U= Unidad

↘ Candidiasis	1 U c/4 días hasta completar 5 U
↘ Otras micosis oportunistas	1 U c/8 días de 5 a 10 U (dependiendo respuesta del paciente)
↘ Micosis profunda	1 U c/8 días de 5 a 10 U (dependiendo respuesta del paciente)
↘ SIDA	
Cuadros activos por agentes oportunistas	1 U c/4 hrs. hasta remisión del cuadro
Profiláctico	1 U c/8 días, indefinidamente
Seropositivo asintomático	1 U c/15-30 días indefinidamente
↘ Leishmaniasis	1 U c/6 días de 20 a 30 U (dependiendo respuesta del paciente)
↘ Toxoplasmosis	1 U c/8 días hasta completar 15 U

B.- Enfermedades con pérdida de la regulación de la Respuesta Inmune

↘ Asma Bronquial	
Esquema I	1 U c/8 días hasta completar 10 U
Esquema II	1 U c/24 hrs. hasta completar 5 U y continuar con: 1 U c/8 días hasta completar 5 U
↘ Psoriasis multitratada	1 U c/8 días hasta completar 20 U
↘ Inmunodeficiencias de la RIC	1 U c/8 días de 10 a 20 U (dependiendo respuesta del paciente)
↘ Dermatitis Atópica	1 U c/8 días hasta completar 10 U
↘ Esclerosis Sistémica progresiva	1 U c/48 hrs. hasta completar 10 U Posteriormente 2 U c/8 días completar 10 U Posteriormente 1 U c/30 días indefinidamente
↘ Lupus Eritematoso Sistémico	1 U c/8 días indefinido (dependiendo respuesta del paciente)

C.- Neoplasias

↘ En pacientes con químico y radioterapia posteriormente valorar la aplicación de:	1 U c/8 días hasta el término de los tratamientos 1 U c/15-30 días, indefinidamente
↘ Pacientes prequirúrgicos	3 U pre-cirugía y 3 U post-cirugía
↘ Cirugía de alto riesgo (pacientes con fracturas expuestas, pacientes infectados, inmunosuprimidos)	3 U pre-cirugía y 3 U post-cirugía 1 c/24 hrs. hasta completar 5 U
↘ Profilaxis en pacientes inmunocomprometidos (cáncer, trasplantados, SIDA, personas sometidas a tratamiento inmunosupresor)	1 U c/8 días por tiempo indefinido o hasta que se restablezca su sistema inmune

Es importante mencionar que **Rotcaf ap^{FT}** (Extracto Dializado de Proteínas) es una terapia complementaria al tratamiento convencional u ortodoxo. La experiencia del médico en el manejo de las diferentes patologías aquí descritas, será un aspecto vital para el análisis de las dosis-respuesta que observe en sus pacientes, de tal forma que los esquemas anteriores propuestos podrán ser modificados a juicio del clínico.