



Semaine : N°15 (Du 05 Avril 2026 au 11 Avril 2026)

Date de publication : 13 Avril 2026

Ce Bulletin est édité par la section de la maladie à déclaration obligatoire du service d'alerte et analyse de risque de l'INSPD
Tel : (253) 21 35 03 38 BP : 438 Email : inspdsurvepi@gmail.com Site : INSPDJ.NET

Points Saillants :

- **1 878** cas de Syndrome grippal ;
- **855** cas de Diarrhée aqueuse aigüe ;
- **515** cas du Paludisme ;
- **116** cas Traumatisme (AVP) ;
- **66** cas de Malnutrition aigüe sévères ;
- **56** cas de Gale ;
- **40** cas IRAS ;
- **32** cas Brucellose ;
- **23** Dengue ;
- **8** cas de violences basées sur le genre ;
- **1** cas Suspects de Rougeole ;
- **1** cas Leishmaniose ;

I Couvertures de données

Tableau 1 Complétude et la promptitude de la semaine 15

Structure sanitaire	Nombre des rapports Attendus	Nombre de rapport reçus pour la semaine	Promptitude	Complétude	
Djibouti-ville	Ras-Dika/Boualos (Publique)	10	9	90%	90%
	Balbala (publique)	9	9	100%	100%
	Parapubliques	12	12	100%	100%
	Privées	4	3	100%	75%
Régions sanitaires	Ali-Sabieh	9	9	100%	100%
	ARTA	10	10	100%	100%
	Dikhil	9	9	100%	100%
	Obock	7	7	100%	100%
	Tadjourah	12	12	100%	100%
TOTAL Djibouti Pays	84	81	96%	96%	

Au terme de la semaine numéro 15 de l'année 2026, sur les 84 rapports attendus **81** ont été reçus soit un taux de complétude et de promptitude de **96%**.

II Surveillance des maladies évitable par la vaccination

Tableau 2 Situation de la notification des maladies prioritaires et évitable par la vaccination sous surveillance épidémiologique de la 15ème semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Rougeole		(PFA)		Méningite		Fièvre jaune		Tétanos	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALI-SABIEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIKHIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBOCK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TADJOURAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Au cours de la semaine 15 de l'année 2026, **1 cas** suspect de rougeole a été notifié. Au total, **21 cas** suspects de rougeole ont été enregistrés durant la semaine 01 au 15 de l'année 2026.

Pour les autres MEV aucun cas n'a été signalé pour cette semaine.




Fig.1 Evolution hebdomadaire des cas suspects et des cas positifs de la semaine 01_2026 a la semaine 15_2026




Fig. 2 Répartition des cas suspects de Rougeole par régions de la S1 a la semaine 15_2026




Fig. 3 Répartition des cas Rougeole par tranche d'âge et sexe de la Semaine 1 à la semaine 15_2026

III Surveillance syndromique

Tableau 3 Situation de la notification de surveillance syndromique de 15^{ème} semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Diarrhées aqueuses aigues		Diarrhées Sanglantes		Syndrome grippal	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	592	0	9	0	1297	0
ARTA	50	0	0	0	70	0
ALI-SABIEH	42	0	0	0	26	0
DIKHIL	101	0	39	0	15	0
OBOCK	54	0	2	0	174	0
TADJOURAH	16	0	1	0	296	0

Situation de la diarrhées aqueuses aigues

A l'issue de la semaine 15 on a notifié, **855** nouveaux cas de diarrhée aqueuse aiguë contre **491** par rapport à la semaine précédente, soit une hausse de **74%**.

Le total cumulé des S1 à S15 est de **10 550** cas.




Fig.4 Evolution Hebdomadaire des cas de diarrhées aqueuses aigues




Fig.5 Répartition des cas de diarrhées aqueuses aigues par régions sanitaire pour la S15_2026

Situation de Syndrome grippal

Au cours de la semaine 15, **1 878** nouveaux cas de syndrome grippal ont été déclarés, Contre **1 522** cas la semaine passée, soit une hausse de **23%**.

Et le total cumulé du S1 à S15 est de **29 152** cas.




Fig.6 Evolution hebdomadaire des cas de syndrome grippal




Fig.7 Répartition des cas de Syndrome grippal par Régions pour la S15-2026

IV Situation des autres maladies à déclaration obligatoire

Tableau 4 Notification de l'essentiel des maladies à déclaration obligatoire sous surveillance de la 15^{ème} semaine de l'année 2026

Structures Sanitaires	Malnutrition aigüe sévère		Brucellose humaine		Traumatisme (AVP)		Gale		Paludisme	
	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès	cas	Décès
DJIBOUTI-VILLE	30	0	13	0	102	0	38	0	503	0
ARTA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALI-SABIEH	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0
DIKHIL	16	0	0	0	3	0	14	0	1	0
OBOCK	10	0	3	0	5	0	4	0	2	0
TADJOURAH	1	0	16	0	5	0	0	0	9	0

Situation du paludisme

Durant la semaine 15. **515 nouveaux cas** de paludisme ont été signalés, contre **345 cas** la semaine précédente, soit une hausse de **49%**.

Et le total cumulé du S1 à S15 est de **5 390 cas**.




Fig.8 Evolution hebdomadaire des cas du paludisme




Fig.9 Répartition des cas paludisme par régions pour la S15_2026

situation du Malnutrition et Gale




Fig.10 Evolution hebdomadaire des cas du Malnutrition




Fig.11 Evolution hebdomadaire des cas du Gale

Pour prévenir les flambé de cas des maladies à transmission vectorielle à savoir le Paludisme, la Dengue, le Chikungunya, fièvre Jaune, le Zika, Fièvre de la vallée du Rift et la Leishmaniose etc. Le laboratoire d'Entomologie et Parasitologie de l'Institut National de Santé Publique de Djibouti, conscient des enjeux liés aux espèces vectrices de ces maladies, s'engage à redynamiser le système de surveillance entomologique en collaboration avec le pôle de veille sanitaire de l'institut National de Santé Publique de Djibouti. Ce système continu du début de l'hivernage jusqu'au 31 Mai, constituera la cartographie des différentes espèces de moustiques présentes dans chaque site de surveillance et permettra de documenter de façon continue et systématique la diversité spécifique culicidienne, afin d'évaluer le statut de leur résistance aux insecticides utilisés dans la lutte antivectorielle, de détecter de façon précoce les agents pathogènes à transmission vectorielle et de cartographier la répartition des espèces vectrices à Djibouti

Synthèse des résultats

Les données sont cumulées de la semaine du **05 Avril au 09 Avril 2026**.

Les variables principales observées sont :

- ✓ Abondance et le comportement trophique de la diversité des espèces selon l'emplacement dans la commune de Boulaos, (capture par pièges et activité de piqûre,).
- ✓ Évolution journalière des nombres des collectées par sites et par quartiers.




Fig.12 Nombre d'individus des moustiques et phlébotomes collecté dans la commune de Boulaos (du 05 Avril au 09 Avril 2026).

Cette figure présente la distribution des principales espèces d'insectes hématophages vecteurs des diverses maladies collectées dans les sites sentinelle dans la commune de Boulaos.

Culex quinquefasciatus : C'est le vecteur le plus abondant dans la commune sur toutes les sites sentinelles avec $n=1870$ *Culex quinquefasciatus* dans l'ensemble des captures à l'intérieur et à l'extérieur des habitations pendant les 4 nuits successives dans la commune de Boulaos. Et en 2ème position c'est le genre/espèce, *Phlebotomus spp* avec $n= 101$ pendant les quatre nuits successives de la surveillance dans la commune, cette semaine on observe une de taux de proportion élevé, ceci s'explique au changement climatique (qui peut influencer la répartition, la survie et la dynamique des vecteurs). Ces deux taxons sont représentés en majoritairement dans la commune, ils sont des vecteurs responsables respectivement des maladies graves comme la Filariose lymphatique et Virus du Nil occidental (Pour le genre *Culex*) et Leishmaniose (du genre *Phlebotomus*).

Culex sitiens : ont été capture 2 sites tel que jardin Ambouli et Q3 avec un taux de proportion assez faible, leur surveillance est très importante comme ils transmettent les maladies tels que Le virus de la fièvre de la vallée du Rift, virus du Nil occidental (West Nile).

Aedes aegypti ont été collecté dans la majorité des sites dont Q3, Q6, Q4, Einguella, Arhiba, et Jardin Ambouli qui représentent un taux de proportion élevé, malgré leur activité comportementale diurne, leur nombre reste quantifiable au près des habitations (un vecteur domestique, Urbain et anthropophile) la surveillance continue Aedes aegypti est indispensable pour prévenir les épidémies de la Dengue.

Anophèles stephensi ont été capturé 2 sites ,Q3 et Jardin Ambouli avec une densité faible dans cette semaine mais toujours nécessite une surveillance spécifique bien approprié de ce vecteur redoutable pour bien lutte afin d'éviter épidémie du paludisme.




Fig.13 comportement des espèces dans la commune du bouloas (du 05 Avril au 09 avril 2026).

Durant cette semaine, toutes les vecteurs leur comportement sont plus **Exophile** et **Exophage** (genres/espèces : *Culex (sitiens et quinquefasciatus)*, *Anophèles (stephensi)*, *Aedes aegypti*, *Phlèbotomus spp.* Et dans ce période de pic de transmission les divers vecteurs pathogènes, la surveillance continue des vecteurs est la clé pour prévenir les épidémies, et leur lutte contre ces divers vecteurs doit être une lutte ciblée en fonction de leur comportement trophique des spécimens.



Fig.14 Distribution des espèces dans les quartiers de la commune de Boulaos (du 05 Avril au 09 avril 2026).

Cette cartographie des espèces indique que dans la commune de Boulaos les vecteurs pathogènes sont bien répartis dans l'ensemble selon leur aire de répartition. Les *Culex quinquefasciatus* et *phlèbotomus spp.*, sont les plus répartis dans tous les sites.

VI Violences Basées sur le Genre (VBG)




Fig. 15 Evolution des cas VBG au cours de la semaine épidémiologique N° 01_2026 au 15_2026

Au cours de la semaine épidémiologique numéro 15 de l'année 2026, **08 nouveaux cas** de VBG ont été rapportés. Au total, **184 cas** de violences basées sur le genre ont été enregistrés de la semaine 01 à la semaine 15 pour l'année 2026.

Tableau 5 Répartition des cas VBG par Tranche d'âge et Sexe

Type VBG	0-11 ans		12-23 ans		24-35 ans		36-47 ans		48-59 ans		60 ans et Plus		Total	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Agression physique	0	1	0	16	0	29	0	13	0	4	0	1	0	64
Agression sexuelle	3	2	2	5	1	3	0	1	0	0	0	0	6	11
Mariage précoce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutilation génitale féminine	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Pratique traditionnelle préjudic...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tentative de viol	2	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	6
Viol avec pénétration	4	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11
Violence domestique	0	0	0	2	0	7	1	8	0	1	0	0	1	18
Violence économique	0	0	0	3	0	10	1	6	1	2	0	0	2	21
Violence psychologique	0	0	0	1	2	7	0	4	1	1	0	0	3	13
Violence sexuelle	0	10	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	18
Total	9	19	2	45	4	59	2	33	2	8	0	1	19	165

Parmi les **84 cas** de VBG rapportés de la semaine 1 à la semaine 15 de l'année 2026, **89%** concernaient des femmes et **11%** concernait des enfants de moins de 11 ans.




Fig. 16 Proportions des types de violence les plus fréquents pour l'année 2026

D'après la figure 16, l'agression physique était la forme de violence la plus courante avec **34,78%**, suivie de la violence économique **11,96%**.

VII Évènement Majeur Internationaux

Régionale :

RDC : Depuis la dernière mise à jour (13 mars 2026), le ministère de la Santé a signalé 2 969 nouveaux cas suspects et 22 nouveaux décès (taux de létalité : 0,74 %) de rougeole dans 26 provinces. Depuis le début de l'année, 31 850 nouveaux cas suspects et 322 décès (taux de létalité : 1,01 %) de rougeole ont été signalés dans l'ensemble des 26 provinces de la RDC. Il s'agit d'une épidémie prolongée qui a débuté en janvier 2022. Par rapport aux semaines épidémiologiques 1 à 10 de 2025, un total de 11 474 cas de rougeole et 152 décès (taux de létalité : 1,32 %) ont été signalés en RDC, ce qui représente une augmentation de 178 % des cas et de 112 % des décès sur la même période. En 2018, la couverture vaccinale nationale contre la rougeole chez les enfants de moins de 5 ans en RDC était de 57 %.. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

Nigeria : Depuis la dernière mise à jour (5 mars 2025), le CDC nigérian a signalé quatre nouveaux cas (dont un confirmé en laboratoire) et aucuns décès liés à la mpox, dans cinq États. Cette année, un total de 164 cas (dont 13 confirmés en laboratoire) et aucuns décès liés à la mpox ont été recensés au Nigéria. Le Nigéria est une zone d'endémie pour la mpox. Depuis 2017, un total de 7 704 cas, dont 1 723 confirmés en laboratoire, et 23 décès (taux de létalité : 1,3 %) liés à la mpox ont été signalés au Nigéria. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

Burundi : Depuis la dernière mise à jour (13 mars 2026), le ministère de la Santé a signalé 19 nouveaux cas confirmés de choléra et aucun nouveau décès dans plusieurs provinces. Cela représente une baisse moyenne de 22 % du nombre de nouveaux cas au cours des quatre dernières semaines. Cette année, un total de 531 cas confirmés de choléra et deux décès (taux de mortalité : 0,38 %) ont été signalés dans quatre des dix-huit provinces du Burundi. Les femmes représentaient 50,8 % des cas et les enfants de moins de 5 ans, 17,4 %. Par rapport à la même période en 2025 (semaines épidémiologiques 1 à 10), un total de 83 cas confirmés de choléra et aucun décès avaient été signalés au Burundi, ce qui représente une multiplication par cinq du nombre de cas et par deux du nombre de décès. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

Libéria : Au cours de la 10e semaine épidémiologique, l'Institut national de santé publique du Libéria a signalé 389 nouveaux cas suspects et deux nouveaux décès (taux de létalité : 0,51 %) de rougeole dans 13 comtés. Cette année, un total de 2 317 cas (138 confirmés ; 2 179 suspects) et huit décès (taux de létalité : 0,35 %) de rougeole ont été signalés au Libéria. Depuis le début de l'épidémie (décembre 2021), un total de 18 187 cas confirmés et 106 décès ont été signalés dans les 16 comtés du Libéria. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

Pays Transfrontalier

Éthiopie : Le 11 mars 2026, un glissement de terrain s'est produit dans la zone de Gamo, dans la région du sud de l'Éthiopie. Ce glissement de terrain a été déclenché par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région ces derniers jours. On dénombre 128 décès et 10 606 personnes déplacées dans la région. Les quatre districts les plus touchés dans la zone de Gamo sont Gacho Baba, Kamba et Bonke. Ces glissements de terrain font craindre une recrudescence des cas de paludisme et d'éventuelles épidémies de choléra en raison de la dégradation des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Les glissements de terrain sont fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies. En 2024, un glissement de terrain dans la zone de Gofa a fait 249 morts, 15 100 déplacés et 38 blessés. (Source : [Africa CDC Weekly](#))

VIII Situation épidémiologique de la semaine 15_2026 par région

Tableau N°6 Notification de l'ensemble des maladies à déclaration obligatoire pour la 15^{ème} semaine de l'année 2026

Maladies	Djibouti-ville		Ali-sabieh		ARTA		Dikhil		Obock		Tadjourah		Total	
	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès	Cas	décès
Choléra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chikungunya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diarrhées Sanglantes	9	0	0	0	0	0	39	0	2	0	1	0	51	0
Diarrhées Aqueuses aigue	592	0	42	0	50	0	101	0	54	0	16	0	855	0
Paralyse Flasque Aigue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syndrome grippal	1297	0	26	0	70	0	15	0	174	0	296	0	1878	0
Tétanos Néonatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paludisme	503	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	0	515	0
Rougeole	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Méningite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dengue	21	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	23	0
Malnutrition aigüe Sévère	30	0	7	0	2	0	16	0	10	0	1	0	66	0
Fièvres Hémorragiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lèpre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos Adulte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hépatites Virales	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
SRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAS	10	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	40	0
Fièvres Typhoïdes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fièvre Jaune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leishmaniose	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Brucellose	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	16	0	32	0
Trachome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rage Humaine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gale	38	0	0	0	0	0	14	0	4	0	0	0	56	0
Tuberculose Nouveaux cas	47	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	49	0
VIH Nouveaux cas	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
IST nouveau	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	8	0
Diabète nouveau cas	7	0	0	0	0	0	5	0	1	0	4	0	17	0
Hypertension nouveau cas	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	17	0
Traumatisme (AVP)	102	0	1	0	0	0	3	0	5	0	5	0	116	0
Décès Maternels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Décès Néonataux	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Evènements inconnus / Emergents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Seuil des maladies sous surveillance

Maladie	Seuil d'Alerte
1. Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans	Dédoublement des cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines
2. Diarrhée sanglante	Dédoublement de cas d'une semaine à l'autre par rapport aux semaines précédentes (pendant 3 semaines)
3. Choléra	1 cas déshydrations grave ou 1 décès suite à une diarrhée aqueuse.
4. Paludisme	Dédoublement des cas de suspect de dengue d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines ;
5. Dengue	Dédoublement des cas de paludisme d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines
6. Rougeole	La survenue d'une grappe de 5 cas suspect dans le mois dans d'une zone de Centre de Sante.
7. Méningite	La survenue de 3 cas suspect pour 100 000 habitants
8. Fièvres hémorragiques virales	La survenue d'un cas suspect ou 1 décès dans une zone de formation sanitaire.

NB :

Le seuil d'alerte est atteint lorsqu'on observe le dédoublement des cas d'une semaine à l'autre pendant 2 semaines.

Le seuil épidémique lorsque le dédoublement des cas est observé d'une semaine à l'autre pendant 3 semaines.