

Guía de medicamentos para la diabetes (insulina/tabletas) para pruebas ambulatorias

Controle su nivel de azúcar en la sangre con frecuencia (al menos cada 4 horas). Dado que estará en ayunas, su nivel de azúcar en la sangre puede bajar más rápido de lo normal. Si tiene síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre, trátelo con tabletas de glucosa O 6 onzas de jugo claro o bebida carbonatada (Coca-Cola, Sprite, jugo de manzana) y llame a la oficina.

Diabéticos tipo 1 con **bomba de insulina**. Póngase en contacto con su endocrinólogo para obtener más instrucciones sobre la bomba.

Diabéticos tipo 2: siga la guía de medicamentos para la diabetes a continuación mientras se prepara para su procedimiento.

SI TOMAS:			
Inhibidor de SGLT2: (ya sea solo o combinado con otro medicamento para la diabetes) Invokana, Farxiga, Jardiance, Invokamet, Xigduo, Synjardy, Glyxambi, Suglat, Steglatro, Segluromet, Steglujan, Qtern, Deberza Phentermine		Suspenda estos medicamentos 4 días antes de su procedimiento. Si hay una elevación continua en los niveles de glucosa, debe comunicarse con el médico que lo recetó para obtener orientación.	
Agonistas de GLP-1: Ozempic/Wegovy/Rybelsus (oral)/Semaglutida, Trulicity/Dulaglutide, Victoza/Saxenda/Liraglutida, Mounjaro/Zepbound/Tirzepatide, Adlynxin/Lixisentide, Bydureon/Byetta/Exenatide, Tanzeum/Albiglutide,		Suspenda la medicación antes del procedimiento según las siguientes pautas: **Si su procedimiento se realizará en nuestro Centro de Endoscopia Summit: • Los medicamentos orales se suspenden 4 días antes del procedimiento • Las inyecciones semanales se suspenden 7 días antes del procedimiento • Las inyecciones diarias se suspenden 4 días antes del procedimiento **Si su procedimiento se realizará en Piedmont Fayette Hospital: • Todos los medicamentos de GLP-1 Agonists se suspenden 7 DÍAS antes del procedimiento	
EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO			
SI TOMAS:	MAÑANA	ALMUERZO/CENA	HORA DE ACOSTARSE
Agonistas GLP-1 (Enumerados anteriormente) Procedimientos de EGD SOLAMENTE	Dieta de líquidos claros	Dieta de líquidos claros	Dieta de líquidos claros
Metformina	NO TOMAR	NO TOMAR	NO TOMAR
Medicamentos orales para la diabetes (además de los inhibidores de SGLT2 mencionados anteriormente y la metformina)	Tradjenta: Toma tu dosis habitual Glipizida, Prandin: tomar 1/2 de su dosis habitual		Título: Toma tu dosis habitual Glipizida, Prandin: Tome la mitad de su dosis habitual.

Insulina de acción prolongada: Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba	Tomar 1/2 de su dosis habitual	Tomar 1/2 de su dosis habitual
Insulina de acción intermedia: NPH, Humulin N, Novolin N	Tomar 1/2 de su dosis habitual	Tomar 1/2 de su dosis habitual
Insulina de acción rápida/corta: Humalog, Novolog, Regular, Novolin R	Tomar 1/2 de su dosis habitual	Tomar 1/2 de su dosis habitual
Insulina premezclada: Humulin 70/30, Novolin 70/30, Humulin 50/50, Humlog 75/25	Tomar 1/2 de su dosis habitual	Tomar 1/2 de su dosis habitual
EL DÍA DE SU PROCEDIMIENTO		
GLP-1	Nada por la boca	Después del procedimiento, coma y tome la dosis habitual de medicamentos según lo programado
Metformina	NO TOMAR	Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual.
Medicamentos orales para la diabetes (además de los inhibidores de SGLT2 mencionados anteriormente)	NO TOMAR	Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual.
Insulina de acción prolongada: Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba	Si el nivel de azúcar en la sangre es superior a 100; Tomar 1/2 dosis habitual Si el nivel de azúcar en la sangre está por debajo de 100: NO TOME	Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual.
Insulina de acción intermedia: NPH, Humulin N, Novolin N	Si el nivel de azúcar en la sangre es superior a 100: tomar la mitad de la dosis habitual Si el nivel de azúcar en la sangre está por debajo de 100: NO TOME	Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual.
Insulina de acción rápida/corta: Humalog, Novolog, Regular, Novolin R	NO TOMAR	Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual.
Insulina premezclada: Humulin 70/30, Novolin 70/30, Humulin 50/50, Humlog 75/25	Si el nivel de azúcar en la sangre es superior a 100: tomar la mitad de la dosis habitual Si el nivel de azúcar en la sangre está por debajo de 100: NO TOME	Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual.

SI TOMA: DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO	
Inhibidor de SGLT2 (ya sea solo o combinado con otro medicamento para la diabetes) Invokana, Farxiga, Jardiance, Invokamet, Xigduo, Synjardy, Glyxambi, Suglat, Steglatro, Segluromet, Steglujan, Qtern, Deberza, Phentermine	Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual.

Sugerencia útil:

Está bien tomar líquidos que contengan azúcar si se ha recetado una dieta de líquidos claros.

Ejemplo de dieta: Puede sustituir líquidos claros equivalentes 8 onzas de refresco dietético, 8 onzas de gelatina regular (sin rojo ni morado), 1 paleta helada regular (sin rojo ni morado), 8 onzas de jugo de manzana, caldo