

Información sobre procedimientos generales

Colyte/Nulytely/Golytely/Gavilyte

Por favor, lea estas instrucciones dos semanas antes de su procedimiento

Haga arreglos para que un conductor venga con usted y permanezca en el área de espera durante su prueba. Puede que no tomes un taxi. Tu conductor debe llevarte a casa.

Método de preparación laxante

* Siga estas instrucciones. **NO siga las instrucciones dentro o dentro de la caja de su kit de preparación.**

Para **Colyte/Nulytely/Golytely/Gavilyte Prep Kits** tendrá que comprar:

1. Su kit de preparación asignado (Colyte, Nulytely, Golytely o Gavilyte) Su proveedor le dará un Receta.
2. Limpiar bebidas/productos líquidos (SIN rojo o púrpura)

Instrucciones generales

2 semanas antes del procedimiento

-Dejar de tomar todos los productos herbarios

1 semana antes del procedimiento

-Deje de tomar aspirina, AINE y cualquier productos que contienen aspirina como Aleve, Ibuprofeno, etc. Usted puede tomar Tylenol (paracetamol)

-Dejar de tomar anticoagulantes **3, 4 o 5 días** antes del procedimiento o según lo aprobado por su médico prescriptor.

-Detener las vitaminas múltiples, vitamina E, hierro, Suplementos de aceite de pescado, frutos secos y semillas.

Días antes de su procedimiento

- Artículos de compra mencionados anteriormente.
- Leer a través de estas instrucciones
- Esperar una llamada del departamento de anestesia para discutir su historia clínica.

**Si tiene Diabetes, lea y siga las instrucciones especiales para pacientes con Diabetes
¿Preguntas?*

Por favor, vea primero las preguntas más frecuentes. Si aún tiene preguntas, llame al 770-719-3240.

Día antes del procedimiento

Fecha: _____

INSTRUCCIONES DE DIETA

Solo **puede** tener **LÍQUIDOS CLAROS** todo el día antes de su procedimiento. **NO SE** deben comer ALIMENTOS SÓLIDOS durante todo el día.

Comenzarás la dieta CLEAR LIQUID cuando despiertes. **NO consuma** bebidas alcohólicas al menos **24 horas antes de su procedimiento.**

Ejemplo de líquidos claros jugos de frutas tensados (manzana, uva blanca, arándano blanco), Lima, Limonada, Café/Té (Sin crema, incluyendo cremas sin diario), caldo o caldo transparente, postres de gelatina sin fruta añadida ni cobertura batida.

EVITE líquidos ROJOS y PÚRPURAS, incluido el tinte alimentario.

EVITE LA LECHE Y las bebidas alcohólicas.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE

- **MAÑANA:** Prepare la solución de preparación siguiendo las instrucciones del paquete. Usted puede utilizar el sabor de cereza ofrecido, ya que no hay tinte rojo en él. Solución de preparación de refrigerado.

-**TARDE (Entre las 3 p. m. y las 5 p. m.)** Beba 64 onzas de la solución. Debe consumir las 64 onzas para que la preparación funcione correctamente.

Continúe bebiendo líquidos transparentes hasta la hora de acostarse. ***Cuanto más hidratado esté, mejores serán los resultados de preparación.**

*A medida que avanza por la noche, su área anal puede irritarse debido a las evacuaciones intestinales frecuentes. Puede aplicar ungüento de vaselina o A & D para ayudar a aliviar las molestias.

Día del Procedimiento

Fecha: _____

Es posible que no tenga tabaco sin humo (inmersión, masticar, etc.) o marihuana en este día.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE

- **6 horas ANTES DE SALIR para el procedimiento** beber las 64 onzas restantes de solución durante 2 horas hasta que se consuma **TODA** la solución.

- Beba 16 oz. de un líquido transparente de su elección durante los próximos 15 minutos.

- Una vez que haya consumido los últimos 16 oz. de líquido transparente, **debe tener NADA por vía oral 4 horas antes de su procedimiento.** *Esto significa QUE NO hay agua, virutas de hielo, goma de mascar, caramelos, gotas para la tos, etc. Cualquier contenido en el estómago podría aparecer, meterse en los pulmones mientras está bajo anestesia.*

INSTRUCCIONES GENERALES

- Usted puede cepillarse los dientes y gárgaras antes de su prueba.

- **NO** use Loción CORPORAL NI JOYAS CORPORALES. Por favor, retire todos los piercings (lengua, mejilla, nariz, etc.) antes de su llegada.

- **USTED DEBE** tener un conductor que permanezca en el campus del hospital mientras se realiza su procedimiento.

- **No seguir estas instrucciones puede hacer que su procedimiento se retrase o cancele.**