

Guía del medicamento para la diabetes (insulina/tabletas) para pruebas ambulatorias

Controle su nivel de azúcar en la sangre con frecuencia (al menos cada 4 horas). Dado que va a ayunar, su nivel de azúcar en la sangre puede bajar más rápido de lo normal. Si tiene síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre, trátelo con tabletas de glucosa O 6 onzas de jugo claro o bebida carbonatada (Coca-Cola, sprite, jugo de manzana) y llame a la oficina 678-817-6505. Diabéticos tipo 1 con bomba de insulina. Póngase en contacto con su endocrinólogo para obtener más instrucciones sobre la bomba. Diabéticos tipo 2: siga la guía del medicamento para la diabetes a continuación mientras se prepara para su procedimiento.

| | | | |
|--|---|---|---|
| SI TOMA | | | |
| Inhibidor de SGLT2 (ya sea solo o combinado con otro medicamento para la diabetes) Invokana, Farxiga, Jardiance, Invokamet, Xigduo, Synjardy, Glyxambi, Suglat, Steglatro, Segluromet, Steglujan, Qtern, Deberza | Suspenda estos medicamentos 4 días antes de su procedimiento. Si hay una elevación continua en los niveles de glucosa, debe comunicarse con el médico que prescribe para obtener orientación. | | |
| EL DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO | | | |
| SI TOMA | Por la mañana | Almuerzo-cena | Hora de acostarse |
| Metformina | NO TOMAR | NO TOMAR | NO TOMAR |
| Medicamentos orales para la diabetes (además de los inhibidores de SGLT2 mencionados anteriormente y metformina) | Tradjenta: Tome su dosis habitual Glipizide, Prandin: tome 1/2 dosis habitual | Tradjenta: Tome su dosis habitual Glipizide, Prandin: Tome 1/2 dosis habitual. | |
| Insulina de acción prolongada: Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba | Tome 1/2 de su dosis habitual | | Tome 1/2 de su dosis habitual |
| Insulina de acción intermedia: NPH, Humulin N, Novolin N | Tome 1/2 de su dosis habitual | | Tome 1/2 de su dosis habitual |
| Insulina de acción rápida / corta: Humalog, Novolog, Regular, Novolin R | Tome 1/2 de su dosis habitual | Tome 1/2 de su dosis habitual | |
| Insulina premezclada: Humulin 70/30, Novolin 70/30, Humulin 50/50, Humalog 75/25 | Tome 1/2 de su dosis habitual | Tome 1/2 de su dosis habitual | |
| EL DÍA DE SU PROCEDIMIENTO | | | |
| Metformina | NO TOMAR | NO TOMAR | Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual. |
| Medicamentos orales para la diabetes (además de los inhibidores de SGLT2 mencionados anteriormente) | NO TOMAR | Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual. | |
| Insulina de acción prolongada: Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba | Si el azúcar en la sangre es superior a 100; Tomar 1/2 dosis habitual Si el nivel de azúcar en la sangre es inferior a 100: NO TOMAR | | Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual. |
| Insulina de acción intermedia: NPH, Humulin N, Novolin N | Si el nivel de azúcar en la sangre es superior a 100: tomar 1/2 dosis habitual Si el azúcar en la sangre es inferior a 100: NO TOMAR | | Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual. |
| Insulina de acción rápida / corta: Humalog, Novolog, Regular, Novolin R | NO TOMAR | Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual. | |
| Insulina premezclada: Humulin 70/30, Novolin 70/30, Humulin 50/50, Humalog 75/25 | Si el azúcar en la sangre es superior a 100: tomar 1/2 dosis habitual Si el azúcar en la sangre es inferior a 100: NO TOMAR | Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual. | |
| Si toma: DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO | | | |
| Inhibidor de SGLT2 (ya sea solo o combinado con otro medicamento para la diabetes) Invokana, Farxiga, Jardiance, Invokamet, Xigduo, Synjardy, Glyxambi, Suglat, Steglatro, Segluromet, Steglujan, Qtern, Deberza | Después del procedimiento, coma y tome su dosis habitual. | | |