

Información sobre procedimientos generales

Por favor, lea estas instrucciones dos semanas antes de su procedimiento

Haga arreglos para que un conductor venga con usted y permanezca en el área de espera durante su prueba. Puede que no tomes un taxi. Tu conductor debe llevarte a casa.

Método de preparación laxante

* Siga estas instrucciones. **NO siga las instrucciones dentro o dentro de la caja de su kit de preparación.**

Para plenvu prep split dosis tendrá que comprar:

1. Kit plenvu-prep (se requiere receta médica)
2. Bebidas claro sin rojo púrpura

Instrucciones generales

2 semanas antes del procedimiento

-Dejar de tomar todos los productos herbarios

1 semana antes del procedimiento

- Deje de tomar aspirina, AINE y cualquier producto que contienen aspirina como Aleve, Ibuprofeno, etc. Usted puede tomar Tylenol (paracetamol)
- Dejar de tomar anticoagulantes **3, 4 o 5 días** antes del procedimiento o según lo aprobado por su médico prescriptor.
- Dejar de tomar las vitaminas múltiples, vitamina E, hierro, Suplementos de aceite de pescado, frutos secos y semillas.

Días antes de su procedimiento

- Artículos de compra mencionados anteriormente.
- Leer a través de estas instrucciones
- Esperar una llamada del departamento de anestesia para discutir su historia clínica.

**Si tiene Diabetes, lea y siga las instrucciones especiales para pacientes con Diabetes*

¿Preguntas?

Por favor, vea primero las preguntas más frecuentes. Si aún tiene preguntas, llame al 770-719-3240.

Día antes del procedimiento

Fecha: _____

INSTRUCCIONES DE DIETA

Solo puede tener LÍQUIDOS CLAROS todo el día antes de su procedimiento. **NO SE** deben comer ALIMENTOS SÓLIDOS durante todo el día.

Ejemplo de líquidos claros jugos de frutas tensados (manzana, uva blanca, arándano blanco), Lima, Limonada, Café/Té (Sin crema, incluyendo cremas sin diario), caldo o caldo transparente, postres de gelatina sin fruta añadida ni cobertura batida.

EVITE líquidos ROJOS y PÚRPURAS, incluido el tinte alimentario.

EVITE LA LECHE Y las bebidas alcohólicas.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE

- **5 pm:** Utilice el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la bolsa Dose 1 con al menos 16 oz de agua agitando o usando una cuchara hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar hasta 2 a 3 minutos. Tome su tiempo- termine lentamente la dosis en 30 minutos. Beba **TODA** la solución.

-Rellene el recipiente con al menos 16 oz de líquido transparente. Una vez más, tómese su tiempo y termine lentamente todo en 30 minutos.

-Continúe bebiendo líquidos transparentes hasta la hora de acostarse. ***Cuanto más hidratado esté, mejores serán los resultados de preparación.**

Día del Procedimiento

Fecha: _____

Es posible que no tenga tabaco sin humo (inmersión, masticar, etc.) o marihuana en este día.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN LAXANTE

- **6 horas ANTES DE SALIR para el procedimiento:**

Utilice el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la Dosis 2 (Bolsa A y Bolsa B) con al menos 16 oz de agua agitando o usando una cuchara hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar hasta 2 a 3 minutos. Tome su tiempo- termine lentamente la dosis en 30 minutos. Beba **TODA** la solución.

- **Rellene inmediatamente** el recipiente con al menos 16 onzas de líquido transparente. Una vez más, tómese su tiempo y termine lentamente todo en 30 minutos.

- **No ponga nada más en la boca** excepto un pequeño sorbo de agua con el corazón, la presión arterial o los medicamentos para convulsiones.

- **Usted debe tener NADA en la boca 4 horas antes de su procedimiento.** *Esto significa QUE NO agua, virutas de hielo, goma de mascar, caramelos, gotas para la tos, etc.*

Cualquier contenido en el estómago podría subir, entrar en los pulmones mientras bajo anestesia.

INSTRUCCIONES GENERALES

- Usted puede cepillarse los dientes y gárgaras antes de su prueba.

- NO use LOCIÓN CORPORAL NI JOYAS CORPORALES. Por favor, retire todos los piercings (lengua, mejilla, nariz, etc.) antes de su llegada.

- **USTED DEBE** tener un conductor que permanezca en el campus del hospital mientras se realiza su procedimiento.

- No seguir estas instrucciones puede hacer que su procedimiento se retrase o cancele.